

Die Wanzen des steirischen Ennsgebietes

Von Johann Moosbrugger, Feldkirch (Vorarlberg).

Vorwort.

In den Jahren 1905 bis 1931 hatte ich meinen Wohnsitz im steirischen Ennsgebiet, und zwar zunächst im Selztal, ab 1914 in Bärndorf bei Rottenmann. In diesen Jahren sammelte ich eifrig Käfer und Wanzen. Die Käferfunde werden gegenwärtig in den „Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft“ veröffentlicht. Über die im Gebiete aufgefundenen Wanzen soll in dieser Arbeit berichtet werden, denn das Verzeichnis von G. Strobl muß heute wohl als veraltet und sehr lückenhaft gelten.

Ich wähle hierbei die Reihenfolge des Oshani-Kataloges mit den Namenskorrekturen des Kataloges von Stickel.

Bei dieser Gelegenheit sei in erster Linie des Herrn Sanitätsrates Dr. Karl Singer (Aschaffenburg) ehrend gedacht. Derselbe hat nicht nur durch mehrere Wochen mit mir im Gebiete gesammelt und mir wertvolle Sammelanweisungen gegeben, sondern auch alle mir zweifelhaften Formen verlässlich bestimmt und mich in jeder Weise gefördert. Ihm bin ich vor allem zu größtem Dank verpflichtet. Herr Eduard Wagner (Hamburg) hat die Gattung *Cremnocephalus* klargestellt. Außerdem hat Herr Dr. C. Feige (Eisleben) wiederholt mit mir in der Gegend gesammelt.

Arten- und Fundortliste.

Thyreocoris scarabaeoides L. Im Grase häufig. Selzthal, Bärndorf.

Sehirus luctuosus M. R. Bärndorf.

morio L. Im Grase häufig. Bärndorf.

bicolor L. Wie vorige. Bärndorf, Steinach.

dubius Scop. Kaiserau, Flitzenalm, Tamischbachturm.

biguttatus L. Ebenfalls im Grase. Bärndorf, Steinammandl.

**Legnotus limbosus* Geoffr. St. Michael ob Leoben.¹⁾

picipes Fall. Pürgg.

**Coptosoma scutellatum* Geoffr. Leoben.

Odontoscelis fulginosa L. f. *carbonaria* Zett. 1 St. vom Sengengebirge, 1 St. Kaiserau 15. 7. 39.

Eurygaster maura L. An sonnigen Hängen im Grase häufig. Bärndorf, Selztal.

testudinaria Geoffr. Bärndorf, Selztal.

Sciocoris umbrinus Wolff. Auf Grasplätzen. Kaiserau, Bärndorf.

**cursitans* F. Mautern.

1) * vor den Namen bedeuten, daß die betreffenden Arten nur aus den dem Ennstal benachbarten Gegenden vorliegen, nicht aber aus dem Ennsgebiete selbst.

- * *Aelia acuminata* L. Kraubath (Juni).
- Neottiglossa pusilla* Gmel. In Gebirgswäldern im Grase der Holzschläge. Bärndorf, Kaiserau.
- Eusarcoris aeneus* Scop. Selztal, Bärndorf.
- Stagonomus pusillus* H. S. Mit Vorliebe an *Verbascum*. Bärndorf, Steinach.
- Rubiconia intermedia*. Häufig im Grase der Holzschläge. Bärndorf.
- Peribalus vernalis* Wlff. Wörschach, Bärndorf, Gesäuse.
sphacelatus F. Wie vorige.
- Carpocoris pudicus* Poda. Allenthalben gemein.
melanocerus M. R. In Holzschlägen auf verschiedenen Kräutern, besonders an Tollkirsche.
- Dolycoris baccarum* M. R. Überall gemein. Bärndorf.
- Palomena prasina* L. Bärndorf, Wörschach.
viridissima Poda. Überall gemein. Bärndorf.
- Chlorochroa pinicola* M. R. An *Juniperus* u. *Pinus*. Bärndorf, Wörschach.
- Pentatoma rufipes* L. Auf verschiedenem Gesträuch gemein.
- Eurydema dominulus* Scop. Häufig auf Dolden.
feberi Fieb. 1 St. an der Enns bei Selztal, meist aber subalpin, an *Biscutella laevigata* L., auch hochalpin unter Steinen. Kaiserau, Hochmölbling.
oleracea L. Gemein, besonders auf Kohl samt f. *annulata* Fall.
- Acanthosoma haemorrhoidale* L. 1 St. an *Sorbus* in Bärndorf, 1 totes Ex. am Gipfel der Hochheide (2363 m).
- Elasmucha ferrugata* F. 1 St. am Grimmbach auf Gesträuch (24. 8.).
feberi Jak. Nicht selten auf Birken im Juli und August. Selztal, Bärndorf.
grisea L. Mit der vorigen, aber viel zahlreicher.
- Elasmostethus interstinctus* L. Häufig auf Gesträuch und Laubbäumen, Bärndorf.
minor Horv. An *Lonicera xylost.* Wörschach, Strechau.
- Pieromerus bidens* L. Auf verschiedenem Gesträuch und Kräutern. Selztal, Bärndorf, Mitterndorf.
- Troilus luridus* F. Wie vorige. Bärndorf, Gesäuse
- Rhacognathus punctatus* L. Selten. Selztal, Bärndorf.
- Zicrona coerulea* L. Selztal, Bärndorf, Sparafeld.
- Coreus scapha* F. Nicht selten im Grase. Bärndorf, Wörschach.
- Mesocerus marginatus* L. Auf Gras u. Gesträuch gemein. Selztal, Bärndorf.
- Arenocoris spinipes* Fall. 1 St. in Pürgg, 1 St. in Mautern.
- Coriomeris denticulatus* Scop. Häufig an trockenen Hängen im Grase. Bärndorf.

- Coriscus calcaratus* L. 1 Larve am 23. 7. 30 in Bärndorf.
- Corizus hyoscyami* L. Häufig im Grase u. auf Gesträuch. Bärndorf, Pürgg, Gesäuse.
- Rhopalus subrufus* Gmel. Wie vorige Art.
parumpunctatus Schill. Wie vorige Art.
maculatus Fieb. Häufig. Bärndorf, Steinach.
- Stictopleurus punctatonervosus* Goeze. Häufig im Grase. Bärndorf.
abutibon Rossi. Wie vorige Art.
crassicornis L. Wie vorige Art.
- Myrmus miriformis* Fall. Im Grase der Holzschläge, meist kurzflügelig. Bärndorf bis 1300 m, Selztal.
- Aradus depressus* F. Besonders an Birkenstöcken unter Rinde. Bärndorf.
crenatus Say (= *dilatatus* Duf.). Nach Strobl im Gesäuse.
corticalis L. Oft zahlreich an Baumschwämmen der Fichtenstöcke. Bärndorf.
planus Fieb. Selztal.
betulae L. Nach Strobl im Gesäuse.
lugubris Fall. Gesäuse, Wörschach.
betulinus Fall. Aus einem morschen Balken auf der Singdorfer Alm (1500 m).
- Aneurus avenius* Duf. Von dünnen Haselnußstöcken abgeklopft. Bärndorf.
- Tropidothorax leucopterus* Goeze. An *Vincetoxicum*-Stengeln in Pürgg. Im Mai—Juni einzeln Imagines, Ende August zahlreiche Larven und frisch entwickelte Imagines.
- Spilostethus equestris* L. Nicht selten im Grase der Holzschläge. Bärndorf, Pürgg.
saxatilis Scop. Selztal, Windischgarsten.
- Arocatus roeseli* Schill. 1 St. von Herrn Singer in Trieben von Grauerle geklopft (6. 8. 30).
- Nysius jacobaeae* Schill. Gemein im Tale wie auch sub- und hochalpin. In hohen Lagen nur kurzflügelige Stücke gefunden. Meist an *Calluna*.
- Nysius thymi* Wlff. Häufig. Bärndorf.
cymoides Spin. Auf Nachtkerze. Bärndorf (10. 7. 1939).
senecionis Schill. An *Senecio* gemein. Bärndorf.
helveticus H. S. Bärndorf.
- Cymus clavicolus* Fall. Bärndorf, Gaishorn, Kaiserau, Hochheide.
glandicolor Hahn. Auf feuchten Wiesen gemein. Bärndorf, Selztal, Liezen.
obliquus Horv. An Waldbinse. Bärndorf, Kalblinggatterl.
- Ischnorhynchus resedae* Pz. Massenhaft an Birken den ganzen Sommer hindurch. Bärndorf.
- **Heterogaster affinis* H. S. 1 St. in Mautern.
 **artemisiae* Schill. 1 St. in Kraubath.
urticae F. An *Urtica urens* in Bärndorf.

- **Platyplax salviae* Schill. 1 St. in St. Michael ob Leoben an *Salvia pratensis*.
- **Macroplax preysleri* Fieb. In Mautern.
- Oxycarenus modestus* Fall. Nicht häufig an Grauerle. Bärndorf.
- Ligyrocoris silvestris* L. Nach Strobl in Admont im Moor.
- Pachybrachius fracticollis* Schell. Im Moor unter Heu. Bärndorf, Gaishorn.
luridus Hhn. Bärndorf.
- Macrodema micropterum* Curt. Bärndorf, Pürgg, Hochheide; unter Grünerlenlaub.
- Rhyparochromus chiragra* F. Bärndorf, Kaiserau.
- Lasiosomus enervis* H. S. Unter Grasbüschen und am Gras auf Holzschlägen. Bärndorf.
- Acompus rufipes* Wlff. In kurz- u. langflüg. Stücken häufig im Grase. Bärndorf, Arling.
- Stygnocoris rusticus* Fall. An trockenen Stellen unter Pflanzen. Bärndorf.
fuliginus Geoffr. Wie vorige Art.
pygmaeus Shlb. Ebenso.
peditris Fall. Ebenso.
- Trapezonotus arenarius* L. Unter Laub u. Steinen. Bärndorf, Arling, Tamischbachturm.
anorus Flor. Nach Strobl bei Admont.
dispar Stål. Nach Strobl bei Admont und am Scheiblingstein.
- Raglius pini* L. Gemein, Bärndorf.
phoeniceus Rosse. Unter Steinen. Je 1 St. von Pürgg und Windischgarsten.
alboacuminatus Goeze. Unter Baumrinden im Herbst. Bärndorf.
- Gastrodes grossipes* De G. Auf Lärchen häufig. Bärndorf.
abietum Bergr. An Fichten und Föhren. Bärndorf, Kalblinggatterl, Scheiplalm.
- Drymus sylvaticus* F. In Laub und Moos gemein. Bärndorf, Kalblinggatterl.
brunneus Sahlb. In Laub und Moos. Bärndorf.
piceus Flor. Im dichten Schatten junger Föhren im Moos. Bärndorf. (August—Oktober.)
pilicornis Mls. In *Thymus*-Rasen nicht selten. Bärndorf.
- Eremocoris abietis* L. Bärndorf. Auf Laub.
plebejus Fall. In Laub und Moos. Bärndorf.
- Scolopostethus thomsoni* Reut. An Brennesseln gemein. Bärndorf.
decoratus Hhn. Selztal, Bärndorf. Unter Steinen.
- Taphropeltus contractus* H. S. In Laub und Moos. Selztal, Bärndorf.

- Berytus clavipes* Fab. Häufig unter *Calluna*. Selztal, Bärndorf, Kaiserau.
minor H. S. Wie vorige Art.
signoreti Fieb. Bärndorf, Kalblinggatterl.
montivagus Mey. 1 St. von Bärndorf.
crassipes H. Sch. 1 St. von Bärndorf an *Circaea alpina* (Juni bis Sept.).
- Metatropis rufescens* H. S. Mehrmals in Bärndorf an *Circaea alpina* (Juni—Sept.).
- Gampsocoris punctipes* Germ. Anfang Mai an *Pulmonaria offic.* Sept.—Okt. an *Stachys alpina*. Bärndorf.
- Piesma maculata* Lap. Sehr häufig, besonders auf *Chenopodium*. Bärndorf, Wörschach.
- Campylostira verna* Fall. Unter Steinen und Rasen. Bärndorf.
- Acalypta musci* Schrk. Bärndorf, Kaiserau, Hochmölbling.
carinata Pz. f. *angustula* Horv. Bärndorf.
nigrina Fall. Bärndorf, Kaiserau, Hochheide.
parvula Fall. Bärndorf, Pürgg.
- Dictyonota tricornis* Schrk. Bärndorf, Grieskogel.
- Derephysia foliacea* Fall. Von *Thymus* abgestreift. Bärndorf.
- Lasiacantha capucina* Germ. Unter *Thymus* häufig. Bärndorf, Pürgg.
- Tingis reticulata* H. S. Bärndorf, Liezen, Kalblinggatterl.
cardui L. An Disteln gemein. Bärndorf, Windischgarsten, Kaiserau.
pilosa Humm. An *Galeopsis tetrahit*. Bärndorf.
- Catoplatus fabricii* Stål. Häufig. Bärndorf, Wörschach, Windischgarsten.
- Copium teucryi* Host. Landl bei Hieflau.
- Physatocheila quadrimaculata* Wlff. Zahlreich auf Grauerlen. Bärndorf, Selztal.
- Oncobila simplex* K. Nach Strobl bei Admont.
- Monanthia symphyti* Vall. An *Symphytum offic.* gemein. Bärndorf, Selztal.
humuli Fab. Selztal.
lupuli Fab. H. S. An *Myosotis*. Bärndorf, Kalblinggatterl.
echii Schrk. An *Echium* zahlreich. Bärndorf.
- Serentia laeta* Fall. Häufig im Grase. Bärndorf.
ruficornis Germ. Nach Strobl im Admonter Moor.
- Hebrus pusillus* Fall. Bärndorf, Wörschach, Windischgarsten.
ruficeps Thoms. Bärndorf; nicht selten.
- Phymata crassipes* F. Landl, Kraubath.
- Cimex lectularius* L. Bärndorf.
- Empicoris vagabunda* L. Auf Fichten. Bärndorf.
culiciformis Deg. An Hollunder und in einer leeren Bienenhütte. Bärndorf.

- Pygolampis bidentata* Goeze. An sonnigen Hängen unter Thymian. Im Frühjahr und Herbst Larven, im Juli Imagines. Bärndorf.
- Rhinocoris iracundus* Poda. Auf Gesträuch, besonders in Holzschlägen. Bärndorf, Wörschach.
annulatus L. Häufiger als die vorgenannte Art. Bärndorf, Wörschach, Windischgarsten.
- Coranus subapterus* Deg. Auf Moorwiesen unter Heu. Bärndorf.
- Nabis myrmecoides* Costa. Im Grase gemein. Bärndorf, Pürgg.
apterus F. Bärndorf.
limbatus Dhlb. Besonders in Holzschlägen. Kurz- und langflügelig. Bärndorf, Pürgg, Hochheide.
flavomarginatus Sultz. Im Grase. Bärndorf, Kalblinggatterl. Kurzflügelig.
ferus L. Bärndorf, Pürgg.
rugosus L. Die häufigste Art. Bärndorf, Pürgg, Gesäuse.
brevis Sultz. Nach Strobl in Admont. Bei Hohentauern bis 1600 m.
- Lycocoris campestris* F. Im Heu der Wiesen häufig. Bärndorf.
- Xylocoris galactinus* Fieb. In den schimmelnden Teilen der Felddüngerhaufen. Bärndorf.
formicetorum Boh. In Nestern von *Formica rufa*. Bärndorf, Kaiserau.
cursor Fall. Unter Rinden. Bärndorf, Selztal.
- Dufouriellus ater* Duf. Auf *Sambucus niger*. Bärndorf.
- Temnostethus pusillus* H. S. Besonders an Zwetschkenbäumen häufig. Bärndorf.
f. gracilis Horv. Bärndorf, Rottenmann.
- Elatophilus stigmatellus* Zett. 3 St. von Föhren abgeklopft (27. 6. 1931). Bärndorf.
nigricornis Zett. Von Föhren abgeklopft. Bärndorf, Selztal.
- Anthocoris amplicollis* Horv. Auf Esche. Bärndorf.
f. xanthopus Horv. Ebenso.
pilosus Jak. Von *Echium* u. *Artemisia camp.* Bärndorf, Selztal.
confusus Reut. An Esche, Weide und Kirschbaum. Bärndorf.
f. funesta Horv. Ebenso.
nemoralis Fab. Auf Laubbäumen.
minki Dohrn. Samt *f. simulans* Reut. Auf Eschen mit Blattläusen. Bärndorf (Juli—August).
gallarum-ulmi Deg. Häufig an Ulmen. Bärndorf, Selztal.
nemorum L. Überall gemein. Bärndorf, Selztal, Pürgg.
limbatus Fieb. Auf Weiden. Bärndorf.
- Tetraphleps bicuspis* H. S. Auf Nadelholz gemein. Bärndorf, Kalblinggatterl, Scheiplalm.
- Acompocoris pygmaeus* Fall. Wie vorige. Bärndorf, Kaiserau, Hochheide.
alpinus Reut. Auf Nadelhölzern. Kaiserau, Hochheide.

- Orius niger* Wlff. Auf Laubgebüsch. Bärndorf.
majusculus Reut. Bärndorf, Gaishorn.
minutus L. Auf verschiedenen Pflanzen. Bärndorf.
- Microphya psetaphiformis* Curt. An Hollunder und Zwetschken,
 ♂ selten. Bärndorf.
elegantula Baer. Von Fichten geklopft, ♂ selten. Bärndorf.
- Myrmedobia tenella* Zett. Auf Nadelholz häufig. Bärndorf.
- Pitbanus maerkeli* H. Sch. Unter abgemähtem Gras. Bärndorf,
 Kaiserau (Juli).
- Pantilius tunicatus* F. Auf Gesträuch häufig. Bärndorf (Sept. bis
 Okt.).
- Phytocoris tiliae* F. 1 St. auf Haselnuß (28. 7.). Bärndorf.
longipennis Flor. Auf Laubholz häufig. Bärndorf.
populi L. Bärndorf, Hochheide.
dimidiatus Kirschb. Auf Apfelbäumen häufig. Bärndorf,
 Kaiserau.
ulmi L. Häufig auf versch. Pflanzen. Bärndorf, Selztal.
varipes Boh. Strechau, Pürgg.
- Adelphocoris seticornis* F. Bes. auf Kleefeldern häufig. Bärndorf.
lineolatus Goeze. Pürgg. Im Grase.
- Calocoris lineolatus* Costa. In den Zentralalpen von 1700—2000 m
 im Grase. Scheiplalm, Hochheide.
ochromelas Gmel. Häufig auf Eichen. Bärndorf.
sexguttatus F. Auf Kräutern im Walde. Selztal, Kaiserau,
 Kalblinggatterl.
biclavatus H. Sch. Häufig. Bärndorf, Gesäuse.
fulvomaculatus Deg. Häufig. Bärndorf, Windischgarsten,
 Gesäuse.
affinis H. Sch. Im Grase. gemein. Bärndorf, Kaiserau.
alpestris Mey. D. An verschied. Pflanzen, bes. an *Senecio*
Fuchsi. Kalblinggatterl, Gesäuse, Scheiplsee.
norvegicus Gmel. Auf Getreidefeldern. Bärndorf, Selztal.
- Homodemus M-flavum* Goeze. Im Grase häufig. Bärndorf, Kalb-
 linggatterl, Gesäuse. Scheint an Kalk gebunden zu sein.
- Pycnopterna striata* L. Auf Gesträuch nicht selten, jedoch nur
 f. *unipustulata* Stich.
- Actinonotus pulcher* H. S. Kalblinggatterl, 15. 6. 22 (leg. Dr. Feige).
- Stenotus binotatus* F. Im Grase im Selztaler Torfstich (Juli).
- Dichrooscytus rufipennis* Fall. Auf Föhren. Bärndorf, Selztal.
intermedius Reut. Auf Fichten u. Föhren. Bärndorf, Kalbling-
 gatterl, Scheiplalm.
- Lygus pabulinus* L. Im Grase häufig. Bärndorf, Gesäuse, Kalbling-
 gatterl.
cervinus H. Sch. Auf Linden und Weiden. Bärndorf.
rubricatus Fall. Auf Fichten häufig. Bärndorf, Gesäuse,
 Hochheide.

- Lygus atomarius* Mey. D. Auf Fichten. Bärndorf.
pratensis L. In verschied. Abänderungen gemein. Bärndorf, Kalblinggatterl, Voralpe.
limbatus Fall. Auf Weiden. Bärndorf, Selztal.
rhamnicola Reut. 1 St. von Faulbaum. Selztal.
spinolae Mey. D. 1 St. von Wörschach. Nach Strobl auch um Admont.
lucorum Mey. D. Häufig. Bärndorf.
contaminatus Fall. Häufig. Bärndorf, Kaiserau.
viridis Fall. Auf Bergahorn. Bärndorf.
campestris L. Auf Dolden gemein. Bärndorf.
kalmi L. Wie vorige. Bärndorf, Kalblinggatterl.
montanus Schill. An *Rumex*. Bärndorf, Kalblinggatterl, Hochheide, 2000 m (Juli—Sept.).
rubicundus Fall. An Weiden (Mai—Sept.). Bärndorf, Selztal.
Plesiocoris rugicollis Fall. Zahlreich an Purpurweide. Bärndorf, Kaiserau.
Camptozygum pinastri Fall. Auf Föhren häufig. Bärndorf.
pumilio Reut. In versch. Farbänderungen. Kalblinggatterl, Scheiplalm.
Poeciloscytus unifasciatus F. An Labkraut häufig. Bärndorf, Pürgg.
Polymerus holosericeus Hahn. Paß Stein.
Charagochilus gyllenhali Fall. An Labkraut häufig. Bärndorf, Pürgg, Kaiserau, Gesäuse.
Liocoris tripustulatus F. An Brennesseln. Bärndorf, Kaiserau.
Camptobrochis lutescens Schill. Bärndorf.
punctulatus Fall. Bärndorf.
Deraeocoris annulipes H. Sch. Besonders an Lärchen. Bärndorf, Kaiserau, Hochheide.
**scutellaris* F. f. *morio* Boh. 1 St. von Kammern.
trifasciatus L. Auf Eiche und anderen Laubbäumen. Bärndorf.
f. *annulata* Germ. Wie vorige.
olivaceus F. Wie vorige.
ruber L. samt f. *danica* F. u. *segusina* Müll. Auf verschiedenen Pflanzen. Bärndorf, Selztal.
Capsus ater L. samt f. *tyrannus* L. u. *semiflava* L. Bärndorf, Flitzental.
Allceotomus gothicus Fall. Auf Nadelholz häufig. Bärndorf.
Stenodema calcarata Fall. Bärndorf.
virens L. Bärndorf, Kaiserau, Hochheide.
algotiense Schmidt. Kalblinggatterl.
sericans Fieb. Gesäuse, Kaiserau, Hochheide.
holsatum F. Gemein im Grase. Bärndorf, Kalblinggatterl, Hochheide.
Notostira erratica L. Bärndorf, Kalblinggatterl.
f. gen. *tricostata* Costa. Bärndorf.
Megaloceraea linearis Fuessl. Bärndorf, Selztal (Juli).

- Trigonotylus ruficornis* Fall. Selztal, Bärndorf, Gaishorn.
Miris dolobratus L. Im Grase häufig. Bärndorf, Kaiserau; langflügelig.
 ferrugatus Fall. Bärndorf, Hochheide.
Monalocoris filicis L. Auf Farnkraut häufig. Bärndorf.
Bryocoris pteridis Fall. Ebenso. Bärndorf, Selztal, Hochheide.
Macrolophus nubilus H. Sch. An versch. Waldkräutern. Bärndorf, Kaiserau.
Dicyphus pallidus H. Sch. An *Stachys*-Arten häufig. Bärndorf, Kaiserau.
 constrictus Boh. An *Stachys sylvatica* an schattigen Waldplätzen. Kaiserau, Wald.
 errans Wlff. An *Senecio* gemein. Bärndorf. Nur langflügelig.
 stachydis Reut. Auf Tollkirsche und anderen Kräutern, Bärndorf, Kaiserau.
 globulifer Fall. An *Stachys sylv.* Bärndorf.
Campyloneura virgula H. Sch. Bärndorf, Selztal.
Pilophorus clavatus L. Selztal, Bärndorf; häufig.
 confusus Kb. Auf Weiden nicht selten; Selztal.
 cinnamopterus Kb. Bärndorf.
 perplexus Scott. Bärndorf.
Cremnocephalus albolineatus Reut. Auf Fichten häufig. Bärndorf, Kalblinggatterl, Hochheide.
 f. *umbratilis* Fieb. Bärndorf.
 alpinus Wagn. Kalblinggatterl.
Cyllocoris histronicus L. Auf Eichen häufig. Bärndorf.
 flavoquadrinaculatus Deg. Auf Eiche häufig. Bärndorf.
Aetorrhinus angulatus Fall. Häufig auf Laubholz. Bärndorf, Kalblinggatterl.
Globiceps sphegiformis Rossi. Auf Haselnußsträuchern im Mai. Bärndorf.
 cruciatus Reut. Im Grase häufig. Bärndorf, Kaiserau, Wörschach.
 flavomaculatus F. Ebenso. Bärndorf, Kaiserau.
 dispar Boh. Wiederholt vom Grase der Holzschläge gestreift von 900 m bis zur oberen Waldgrenze. ♂ stets langflügelig, ♀ in 2 Ex langflügelig, sonst stets kurzflügelig. Bärndorf, Kalblinggatterl, Hochheide, Wald. (August bis Sept.) Kaiserau 15. 7. 39.
 juniperi Reut. Hochalpin im Grase. ♂ stets langflügelig, ♀ kurzflügelig. Singsdorfer Alm, Scheiplalm, Kalblinggatterl. 27. 8. 1930.
Mecomma ambulans Fall. Auf schattigen Grasplätzen. ♀ selten langflügelig, ♂ stets.
Orthotylus obscurus Reut. 1 St. von Bärndorf.
 fuscescens Kb. Im Juni auf Föhren. Bärndorf, Kaiserau.

- Orthotylus marginalis* Reut. Auf *Salix* häufig. Bärndorf, Gesäuse.
interpositus Schmidt. Bärndorf.
nassatus F. Im August auf Linden. Bärndorf.
prasinus Fall. Auf Haselnuß häufig. Bärndorf, Admont.
diaphanus Kb. Auf *Salix*. Bärndorf (August).
flavosparsus Sahlb. Auf *Chenopod. agreste* häufig. Bärndorf.
ericetorum Fall. Auf *Calluna* häufig. Bärndorf.
- Pseudoloxops coccineus* Mey. Auf Eschen nicht selten. Bärndorf
(Juli—Sept.).
- Heterocordylus genistae* Scop. An sonnigen Waldrändern auf *Genista tinctoria* häufig. Bärndorf.
- Malacocoris chlorizans* Pz. Auf Haselnuß. Bärndorf, Kaiserau.
- Dimorphocoris schmidti* Fieb. Zahlreich im Juli und August im
Sonnenschein an Silberhafer. Kalblinggatterl (1700 m),
Seckauer Alpen.
- Orthocephalus brevis* Pz. An feuchten Stellen im Grase. Bärndorf.
**mutabilis* Fall. 1 ♀ von Kraubath.
saltator Hhn. Im Juni und Juli im Grase. Bärndorf.
- Piezocranum simulans* Horv. 13. 7. 1931 1 Pärchen beim Kalk-
ofen (Kaiserau) gekötschert, 16. 7. 1 ♀ in Edlach im
Holzschlag gekötschert.
- Strongylocoris leucocephalus* L. Häufig im Grase. Bärndorf, Selz-
tal, Hochheide.
- Halticus apterus* L. Häufig auf Wiesen, nur kurzflügelig. Bärndorf.
- Lopus decolor* Fall. Im Juli 1930 zahlreich im Grase eines Holz-
schlages. Bärndorf.
- Hoplomachus thunbergi* Fall. Auf sonnigen Grasplätzen. Bärndorf.
- Macrotylus quadrilineatus* Schrk. Sehr zahlreich an *Salvia glutinosa*.
Bärndorf, Kaiserau (August—Oktober).
solitarius Mey. D. Häufig an *Stachys*-Arten. Bärndorf, Kalb-
linggatterl.
- Harpocera thoracica* Fall. Im Mai auf Eichen. Bärndorf.
- Byrsoptera rufifrons* Fall. Häufig im Grase. Bärndorf.
- Phylus melanocephalus* L. Auf Hollunder und Eiche. Bärndorf.
coryli L. Auf Haselnuß häufig. Bärndorf.
plagiatus H. Sch. Auf Grauerlen häufig (Juni—August) mit
und ohne schwarze Zeichnung der Oberseite. Bärndorf,
Gesäuse, Kaiserau.
- Plesiodema pinetellum* Zett. Auf Föhren. Bärndorf, Scheiplalm.
- Psallus kolenatii* Flor. Selten auf Föhren im Juni—Juli. Bärndorf,
Kaiserau.
ambiguus Fall. Auf Gesträuch. Selztal, Bärndorf, Kaiserau.
betuleti Fall. Bärndorf.
obscurus Fall. Auf Föhren häufig. Bärndorf.
vittatus Fieb. Zahlreich auf Lärchen in höheren Lagen. Bärn-
dorf, Scheiplalm, Singsdorfer Alm, Globuken.

- Psallus variabilis* Fall. Auf Gesträuch u. Bäumen gemein. Bärndorf.
simillimus Kb. Nach Strobl auf Erle im Triebental (19. 8.).
scholtzi Fieb. Auf Grauerlen Ende Juli bis September häufig.
 Bärndorf, Trieben, Kaiserau, Selztal.
lepidus Fieb. Hauptsächlich auf Eschen bei Blattläusen. Bärndorf.
falleni Reut. Auf Birken im August 1930. Bärndorf.
varians H. Sch. 1 St. von Bärndorf.
diminutus Kb. Auf Eiche. Bärndorf (Juni—August).
luridus Reut. Auf Lärchen nicht selten. Bärndorf.
piceae Reut. Von 1200 m aufwärts auf Fichten im August bis Sept. Kaiserau, Kalblinggatterl, Scheiplalm, Singendorfer Alm.
roseus Fab. Auf Weiden (Juli—Sept.) häufig. Bärndorf.
vitellinus Schltz. Auf Fichten und Lärchen häufig. Bärndorf.
salicellus Mey. Selten. Bärndorf.
- Atractotomus mali* Mey. D. Auf Obstbäumen nicht häufig, auch auf Weißdorn. Bärndorf.
magnicornis Fall. Auf Nadelhölzern häufig. Bärndorf, Kaiserau.
- Criocoris nigripes* Fieb. Zahlreich im Juni an *Galium cruciatum*. Bärndorf.
crassicornis Hhn. An *Galium* gemein. Bärndorf, Pürgg.
- Plagiognathus alpinus* Reut. An Bachminzen Juli—August. Bärndorf, Selztal, Hochheide.
chrysanthemii Wlff. Im Grase gemein bis 1700 m. Bärndorf, Kalblinggatterl.
fulvipennis Kb. Kraubath. Nach Strobl um Admont.
arbustorum F. Gemein. Bärndorf, Kalblinggatterl, Scheiplalm.
albipennis Fall. An *Artemisia*, besond. Wermut. Bärndorf, Selztal, Trieben.
- Chlamydatus pulicarius* Fall. Häufig im Grase. Bärndorf.
evanesceus Boh. Im Rasen von *Sedum acre* in Anzahl. Pürgg (August).
- Microsynamma nigrifulus* Tett. 1 St. in Bärndorf, 1 St. im Gesäuse.
bohemani Fall. Auf *Salix* nicht selten. Bärndorf.
- Campylomma verbasci* Mey. D. In Rottenmann auf Königskerze.
 **Sthenarus modestus* Mey. 1 St. in Kraubath.
roseri H. Sch. Auf *Salix purpurea* stellenw. häufig. Bärndorf.
- Ceratocombus coleoptratus* Zett. Im dichten Schatten junger Föhren aus der Nadelstreu und unter Büschen von *Juniperus sabina*. Bärndorf, Pürgg.

- Pachycolus rufescens* Sahlb. 1 St. bei Hochwasser an der Palten angeschwemmt. Bärndorf (Juli).
- Gerris rufoscutellata* Latr. Admont (Strobl).
costai H. Sch. Häufig sub- und hochalpin auf Wassertümpeln. Kalblinggatterl, Hochheide, Scheiplalm.
- Lacustris* L. Gemein. Bärndorf, Selztal, Stainach, Kaiserau.
lateralis schumm. Nach Strobl bei Admont; Bärndorf.
odontogaster Schml. Selztal.
- Velia currens* F. In Wassergraben. Bärndorf.
- Microvelia schneideri* Schltz. Bärndorf.
- Salda litoralis* L. Nach Strobl am Hochschwung.
- Saldula orthochila*. Nach Strobl im Enns- und Paltental an Lärchen.
saltatoria L. Die häufigste Art. Bärndorf, Kaiserau.
scotica Curt. Nach Strobl im Gesäuse an der Enns u. a. Lichtmeßbach.
melanoscela Fieb. Nach Strobl bei Admont, a. d. Enns.
pallipes Fab. 1 St. in Gaishorn. Nach Strobl auch an Bächen im Gesäuse und bei Hohentauern.
- Chartoscirta cincta* H. Sch. An Gebirgsbächen. Bärndorf.
- Naucoris cimicoides* L. In einem Tümpel bei Selztal.
- Nepa cinerea* L. In Wassergräben des Moores, nicht häufig. Bärndorf, Selztal.
- Notonecta glauca* L. Zugleich mit *Naucoris*.
lutea Muell. Ebenso.
- Sigara striata* L. In Bärndorf. Im Altwasser der Palten.
sahlbergi Fieb. Bärndorf, Gaishorn, Selztal, Wörschach.
fossarum Leach. Bärndorf, Gaishorn.
nigrolineata Fieb. Selztal.
praeusta Fieb. Im ehemaligen Gaishorner See.
carinata Sahlb. Scheiplalm. 5. 7. 1939. Nach Strobl auch am Reitersee.
germari Fieb. Im ehemaligen Gaishorner See.
- Cimatia coleoptrata* F. In einem Wassertümpel nächst der Haltestelle Trautenfels (August).
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zentralblatt für das Gesamtgebiet der Entomologie, Klagenfurt](#)

Jahr/Year: 1945

Band/Volume: [1_1](#)

Autor(en)/Author(s): Moosbrugger Johann

Artikel/Article: [Die Wanzen des steirischen Ennsgebietes. 16-27](#)