

	Gravosa	Dalmatien	Adriat. Inseln	Südl. Herzegowina	Bosnien und Herzegowina
Papilionidae	4	5*	3	5	5
Pieridae	12	13*	9	13	13
Nymphalidae	10	33*	13	26	42
Satyridae	12	25*	13	23	36
Libytheidae	1	1	1	1	1
Erycinidae	—	1	—	1	1
Lycaenidae	16	39*	15	35	43
Hesperiidae	7	19*	8	18	19
Sphingidae	9	17	9	11	18
Notodontidae	4	12	1	17	16
Thaumetopoeidae	2	2	1	2	2
Lymantriidae	3	7	3	3	11
Lasiocampidae	5	10	7	10	12
Endromididae	—	—	—	—	1
Lemoniidae	1	1	—	—	2
Saturniidae	2	3	2	4	3
Drepanidae	2	3	—	2	3
Thyrididae	1	1	—	1	1
Noctuidae	149	235	103	226	316
Cymathophoridae	1	2	—	2	4
Brephidae	—	—	—	—	1
Geometridae	106	212	54	174	284
Nolidae	3	8	3	7	2
Cymbidae	3	4	—	—	3
Synthomidae	2	3	1	2	2
Arctiidae	6	32	10	27	40
Heterogyinidae	—	—	—	—	1
Zygaenidae	4	21	6	18	20
Cochlididae	—	1	—	—	1
Psychidae	5	16	9	11	13
Sesiidae	3	27	—	14	17
Cossidae	4	4	1	3	4
Hepialidae	—	3	—	1	6
	377	760	272	657	943

*) Eine genaue Aufteilung auf die einzelnen Familien ist aus den „Studien“, welchen diese Zahlen entnommen sind, nicht ersichtlich.

(Fortsetzung folgt.)

Berichtigung.

Im Artikel „*Pieris napi* L. ab. nov. *Wolenskyi*“ von Dir. Jos. Frz. Berger muß es im Absatz 4 heißen:

„Dieses Stück gehört zur Sommergeneration *napaeae* Esp. und ist außerdem ein Uebergang zur Form *subtalba* Schima.“