

Entomologisches aus Oberösterreich.

Von Dr. Leopold Müller.

(Fortsetzung).

Lygris reticulata F. Alpen- und Mühlviertel. Warscheneck, Filzmoos.
Lygris populata L. Dachstein bis Ochsenwieshöhe; Priel, Polsteralm und Schutzhaus; Warscheneck, Zellerhütte, bis Dümmlerhütte, untere Wurzenalm, Huttererböden; Pyhrgas, Gatterl. Vom Priel und Warscheneck auch *musauaria* Frr.

Larentia fulvata Forst. Warscheneck, Tomerl- und Wurzenalm; Pyhrgas, Hofalm.

Larentia ocellata L. Warscheneck, untere Wurzenalm.

Larentia variata Schiff. Dachstein, Schafekalm 1200, m (St.); Warscheneck, Dümmlerhütte bis Purgstall, dort auch *stragulata* Hb.; Pyhrgas, Hofalm.

Larentia cognata Thnb. Subalpin, bloß Alpen. Warscheneck, Dümmlerhütte, Brunsteinersee. Sonst nur noch Obertraun und Gradenalm.

Larentia siterata Huf. Warscheneck, Dümmlerhütte.

Larentia miata L. Warscheneck, Dümmlerhütte, Brunsteinersee.

Larentia truncata Huf. Dachstein, Simonyhüttenweg, Gjaidalm; Warscheneck bis Speikwiese und Filzmoos; Boßruck, Mausmairalm; Pyhrgas, Hofalm.

Larentia immanata Hw. Alpen, Mühlviertel und Lambach. Dachstein, Schafekalm; Warscheneck bis Lannafeld und Purgstall, Huttererböden; Pyhrgas, Hofalm.*)

Larentia munitata Hb. Bloß Alpen. Dachstein bis Ochsenwieshöhe; Priel, Schutzhaus; Warscheneck bis Dümmlerhütte, Filzmoos bis Purgstall; Pyhrgas, Hofalm. Sonst noch Kasberg, Obertraun.

Larentia aptata Hb. Alpin**). Dachstein, Gosausee; Warscheneck, bis Dümmlerhütte, bis Brunsteinersee und Hals; Boßruck, Mausmairalm; Pyhrgas, Hofalm und Gatterl. Sonst auch Höllengebirge, Traunstein usw. und in den Tälern.

Larentia viridaria F. Warscheneck, untere Wurzenalm.

Larentia turbata Hb. Bloß alpin. Dachstein, Simonyhütte, Schafekalm; Priel, Schutzhaus; Warscheneck, Dümmlerhütte, vom Filzmoos bis zum Brunsteinersee, Purgstall und Stubwies; Pyhrgas, Hofalm.

Larentia kollariaria H. S. Alpen und Mühlviertel, auch Hausruck. Warscheneck, Dümmlerhütte, Filzmoos bis Purgstall; Pyhrgas, Hofalm.

Larentia aqueata Hb. Bloß Alpen. Dachstein, Gosausee, Gjaidstein; Priel, Schutzhaus; Warscheneck, Zellerhütte, bis Lannafeld, bis Brunsteinersee und Stubwies; Boßruck, Mausmairalm; Pyhrgas, Hofalm.

Larentia salicata Hb. Alpen und Mühlviertel. Dachstein, Gosausee; Priel, Schutzhaus; Warscheneck, bis Lannafeld, Filzmoos bis Purgstall und Gamskaar, Huttererböden; Pyhrgas, Hofalm und Gatterl.

Larentia fluctuata L. Priel, Schutzhaus; Warscheneck, Dümmlerhütte, Filzmoos, Pyhrgas, Hofalm.

Larentia parallelolineata Retz. Priel, Schutzhaus; Warscheneck, untere Wurzenalm, Huttererböden.

Larentia incurvata Hb. Alpen, Mühlviertel, Hausruck. Warscheneck, Dümmlerhütte, Filzmoos bis Purgstall.

Larentia montanata Schiff. Dachstein, Gjaidplateau, Schafekalm und Krippenalm, auch *constricta* Stgr.; Priel, Schutzhaus; Warscheneck bis Lannafeld, untere Wurzenalm bis Purgstall und Gamskaar; Boßruck, Mausmairalm; Pyhrgas, Hof- und Govilalm.

Larentia suffumata Hb. Dachstein, Schafekalm; Warscheneck, Filzmoos bis Purgstall.

*) *Larentia taeniata* Stph. Angeblich Priel, Schutzhaus; sonst von tieferen Lagen mehrfach bekannt; Alpen- und Mühlviertel. Steyerling, Spital a. P., Steyrbrück (Straße nach Hinterstoder), Gradenalm; Pöstlingberg, Kleinzell.

**) Angeblich auch Pöstlingberg und Lambach.

Larentia ferrugata Cl. Dachstein, Zwieselalm, Gosausee; Warscheneck, untere Wurzenalm bis Brunsteinersee; Pyhrgas, Hofalm. — *Unidentaria* Hw. scheint nicht bloß im Hochgebirge, sondern im Berglande überhaupt zu fehlen; während *ferrugata* vom Hölleengebirge, Kasberg, Kremsmauer, Schoberstein usw. verzeichnet ist, fehlt jede Erwähnung der *unidentaria*; letztere ist bloß aus Tälern bekannt. Dieser auffallende Unterschied spricht eher gegen die Zusammenziehung zu einer gemeinsamen Art.

Larentia spadicearia Bkh. Alpen und Mühlkreis. Dachstein. Zwieselalm, Gosausee; Warscheneck, Filzmoos; Pyhrgas, Hofalm. Auch sonst von Bergen, z. B. Kasberg und Kremsmauer sowie Tälern; das Vorkommen stimmt mit jenem der *ferrugata* überein.

Larentia designata Rott. Hauptsächlich Alpen, aber auch Mühlviertel, Braunau, Hausruck. Warscheneck, Filzmoos bis Purgstall; Pyhrgas, Hofalm.

Larentia autumnata Bkh. Alpen und Mühlviertel. Priel, Schutzhaus; Warscheneck, Dümmlerhütte.

Larentia caesiata Lang. Alpen- und Mühlviertel.*) (in letzterem anscheinend eine andere Rasse). Dachstein bis Wildkaar, bis zum Gjaidplateau; Priel, bis Schutzhaus; Warscheneck, Zellerhütte, bis Speikwiese, bis Purgstall, Huttererböden; Boßruck, Mausmairalm; Pyhrgas, Hofalm. Wohl überall auch *annosata* Zell, und *glaciata* Germ.; am Dachstein auch *calcarata*, *mediodivisa* und *hauderi* Stauder (St.).

Larentia flavicinctata Hb. Wohl bloß alpin.**). Dachstein, Gjaidalm; Priel, Schutzhaus; Warscheneck, Dümmlerhütte, Boßruck, Mausmairalm; Pyhrgas, Hofalm.***)

Larentia cyanata Hb. Wohl bloß alpin. Dachstein, Gjaidplateau; Priel, Schutzhaus; Warscheneck, Zellerhütte, Dümmlerhütte, Filzmoos. — Am Priel und Warscheneck auch *flavomixta* Hirschke.

Larentia tophaceata Hb. Überwiegend alpin, aber auch bei Linz und Lambach. Dachstein, Gosausee, Weg zur Simonyhütte, Gjaidplateau; Priel, Schutzhaus; Warscheneck, Dümmlerhütte, Filzmoos.

Larentia verberata Sc. Wohl bloß alpin***). Dachstein, Steiglpawweg, Tiergarten; Priel, Schutzhaus; Warscheneck, Zellerhütte, bis Dümmlerhütte, Filzmoos, Huttererböden; Boßruck, Mausmairalm; Pyhrgas, Govilalm, dort auch *bassiana* Feisth. (Reiss.).

Larentia nebulata Frr. Subalpin. Dachstein, Gosausee aufwärts, Simonyhütte; Priel, Polsteralm, Schutzhaus; Warscheneck, Dümmlerhütte, Filzmoos bis Purgstall; Pyhrgas, Hofalm.

Larentia incultraria H. S. Bloß alpin, Dachstein, Gosausee aufwärts, Simonyhütte, Gjaidalm; Priel, Polsteralm, Schutzhaus; Warscheneck, Brunsteinersee, Purgstall; Pyhrgas, Hofalm. Ausnahmsweise auch im Tale.

Larentia scripturata Hb. Alpen und Mühlviertel, Dachstein, Gosausee, Krippenalm, Gjaidplateau; Priel, Schutzhaus; Warscheneck, untere Wurzenalm; Pyhrgas, Hofalm.

Larentia galiata Hb. Warscheneck bis Filzmoos, Boßruck, Mausmairalm.

Larentia alaudaria Frr. Bloß Alpen. Warscheneck, Roßleitnerreit, untere Wurzenalm bis Brunsteinersee; Pyhrgas, Hofalm.

Larentia albicillata L. Warscheneck, beide Wurzenalmen.

Larentia procellata F. Warscheneck, Lannafeld (M).

Larentia lugubrata Stgr. Pyhrgas, Hofalm.

Larentia hastata L. meist *subhastata* Nolk. Dachstein, Gosausee, Simonyhütte; Hirschau- und Schafeckalm; Priel, Schutzhaus; Warscheneck, Dümmlerhütte, Filzmoos bis Purgstall; Boßruck, Mausmairalm; Pyhrgas, Hofalm. — *subhastata* Nolk scheint in den Mühlviertlermooren zu fehlen und dort durch *moestata* Nolk ersetzt zu sein, die ihrerseits wieder im Alpengebiete fehlt.

(Fortsetzung folgt.)

*) Angeblich auch vom Innviertel (Himsl 95).

**) Angeblich auch von Neuhaus a. d. Donau.

***) *Larentia infidaria* Lah. Alpen und Mühlviertel; vom Hochgebirge bisher nicht bekannt geworden

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Österreichischen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1925

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Müller Leopold

Artikel/Article: [Entomologisches aus Oberösterreich. Fortsetzung. 120-121](#)