

Verzeichnis der von Herrn Rudolf Oldenburg in Kamerun gesammelten Schmetterlinge.

Von Heinrich Neustetter, Wien.

(Fortsetzung).

Pieriden.

Leptosia medusa Cramer, Pap. Exot. 2, p. 86, t. 150, f. F (1777).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 387.

Seitz, II., p. 31, t. 10 a.

Nur 1 ♀ von Ngambe.

Lept. alcesta Cramer, Pap. Exot. 4, p. 175, t. 379, f. A. (1781).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 387.

Seitz, II., p. 31, t. 10 a.

1 ♀ von Ngambe.

Mylothris spica Möschl, Verh. z. b. Ges. Wien 33, p. 277 (1883).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 393.

Seitz, II., p. 33, t. 10 d.

Einige ♂♂ von Ngambe, welche in der Größe sehr verschieden sind.

Appias rhodope F. Syst. Ent. p. 473 (1775).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 398.

Seitz, II., p. 37, t. 11 d ♂, e ♀.

2 ♂♂ von Ngambe, mit sehr schmaler schwarzer Saumbinde der Vorderflügel, ein ebensolches Stück besitze ich auch von Liberia. Die Farbe des Wurzelflecks der Vorderflügel ist nicht so dunkel goldgelb wie bei Südkameruner Exemplaren, sondern hell goldgelb, nur wenig dunkler als bei *A. perlucens* Btlr. Diese Form ist neu und mag den Namen var. *tenuifasciata* m. führen.

App. epaphia Cramer, Pap. Exot. 3, p. 26, t. 207 f. D. E. (1779).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 399.

Seitz, II., p. 38, t. 11 f.

1 ♂ von Ngambe.

Pieris subeida Feld. Reise Novar. Lep. 2, p. 174 (1865).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 408.

Seitz II., p. 42, t. 13 c.

1 ♂ von Ngambe. Diese Art scheint bisher noch nicht in Kamerun gefunden worden zu sein. Schultze führt nur var. *Schweinfurthi* Schultze (Ent. Rundsch., 31. Jahrg., Nr. 3, p. 13 f) und Schultze Ergebn. der Zweiten Deutschen Zentr. Afr. Exped. 1910, 1911, pag. 545, t. XXVII, fig. 4 a ♂, 4 b ♀) vom franz. Kongo auf. In meiner Sammlung besitze ich auch Stücke vom N.W.-Ufer des Tanganjika-Sees und von Uganda.

Pier. calypso Drury III. Exot. Ins. 2, p. 30 t, 17, f. 3, 4 (1773).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 409.

Seitz II., p. 42, t. 13 d.

Einige ♂♂ von Ngambe, darunter 1 ♂ der Form *dentigera* Btlr.

Pier. theora Dbl. An. Nat. H. (1), 17, p. 25 (1864).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 411.

Seitz II, p. 44, t. 13 e.

1 ♂ von Fokubar, 1 ♂ von Ngambe.

Pier. Theuszi Dewitz, Ent. Nachr. 15, p. 107, t. 2, f. 6—9 (1889).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 410.

Seitz II, p. 44, t. 14 a.

Je 1 ♂ von Fokubar und Ngambe.

Pier. solilucis var. *subornata* Schultze, Ent. Rundsch., 31. Jahrg.,

Nr. 12, pag. 70, Schultze Ergebn. d. Zweiten Deutsch.

Zentr. Afr. Exped. 1910—1911, t. XXVI, Fig. 3, ♂.

4 ♂♂ von Ngambe gehören zu dieser schönen, großen Form.

Eronia pharis Bd. Spec. Gen. Lep. 1, p. 443 (1836).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 447.

Seitz II, p. 62, t. 21 c.

1 ♂ von Ngambe.

Eronia argia Fabr. Ent. syst., p. 470 (1775).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 446.

Seitz II, p. 62, t. 21 c, d.

und ab. ♀ *idotea* Bd. Spec. Gen. Lep. 1, p. 441 (1836).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 446.

Seitz II, p. 62, t. 21 d.

1 ♂, 1 ♀ von Ngambe, letzteres zur ab. *idotea* gehörig.

Catopsilia florella F. Syst. Ent. p. 479 (1775).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 449.

Seitz II, p. 63.

1 ♂, 1 ♀ von Ngambe.

Terias brenda Doubl. u. Hew. Gen. D. Lep., p. 79, t. 9, f. 6 (1847)

Auriv. Rhop. Aeth. p. 451.

Seitz II, p. 64, t. 22 c.

Eine größere Anzahl ♂♂ von Ngambe.

Ter. senegalensis Bd. Spec. Gen. Lep. 1, p. 672 (1836).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 451.

Seitz II, p. 64, t. 22 c.

2 ♂♂ von Ngambe.

Ter. brigitta var. (aest.) *zoë* Hopff. Monatsb. Akad. Wiss. Berlin 1855, pag. 640 (1855).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 453.

Seitz II, p. 65, t. 22 f.

1 ♂ von Ngambe.

Danaididae.

Danaida chrysippus L. Syst. Nat. ed. 10, p. 471 (1758).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 32.

Seitz II, p. 71,

und var. *alcippus* Cram. Pap. Exot. 2, p. 45, t. 127, f. E. F. (1777)

Auriv. Rhop. Aeth. p. 32.

Seitz II, p. 72.

Beide Formen liegen in einigen Stücken von Ngambe vor.

Dan. petiverana Dbl. Hew. Gen. D. Lep. t. 12, f. 1 (1847).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 33.

Seitz II, p. 72, t. 23 a.

Diese Art wurde in großer Anzahl in Ngambe erbeutet.

Dan. Morgenii Honnrat, Berl. E. Z. 36, p. 436, t. 15, f. 5 (1892).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 33.

Seitz II, p. 72, t. 23 a.

Mehrere ♂♂ von Ngambe und Ngatti.

Amauris niavius L. Syst. Nat. ed. 10, p. 470 (1758).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 37.

Seitz II, p. 74, t. 23 d.

2 ♂♂ von Ngambe.

Amauris hecate Butl. Proc. Zool. Soc. (1866) p. 44.

Auriv. Rhop. Aeth. p. 39.

Seitz II, p. 75, t. 24 b.

2 ♂♂ von Ngambe.

Satyridae.

Elymnopsis bambakoo Westw. Gen. D. Lep. pag. 405, note, t. 68, f. 3 (1851),

Auriv. Rhop. Aeth. p. 45.

Seitz II, p. 82, t. 26 a.

Einige ♂♂, von Fokubar, Gorori und Ngambe.

Mycalesis milyas Hew. Exot. Butt. Mycalesis, t. 6, f. 34 (1864).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 55.

Seitz II, p. 92 t. 27 g.

3 ♂ von Ngambe.

Mycalesis golo Auriv. Ent. Tidskr. 14, p. 267, fig. 2 (1893).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 55,

Seitz II, p. 91, t. 27 e.

Ein ♂ von Ngambe.

(Fortsetzung folgt.)

TAUSCHTAG!

Der Verein der „Naturbeobachter und Sammler“ die „Entomologische Tischgesellschaft Rudolfsheim-Fünfhaus“ sowie die „Entomologische Tischgesellschaft Hieronymus“ veranstalten am

Sonntag, den 21. November 1926

ab 9 Uhr vormittags im Vereinslokal

Wien, XII., Steinbauergasse 36

(Kinderheim) ihren

3. gemeinsamen Tauschtag

Um rege Beteiligung bitten die Vereinsleitungen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Österreichischen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Neustetter Heinrich Michael

Artikel/Article: [Verzeichnis der von Herrn Rudolf Oldenburg in Kamerun gesammelten Schmetterlinge. Fortsetzung. 106-108](#)