

den gerne schon in diesen Aufsatz mit einbezogen, doch ist dies daran gescheitert, daß ich trotz aller Bemühungen, wie Insertion in den Zeitschriften etc. kein weiteres Material erhalten konnte.

Am Schlusse meiner Ausführungen angelangt, freut es mich, außer allen bereits in Texte genannten Herren für ihre freundliche Mitwirkung noch ganz besonders Herrn Hofrat Dr. Rebel dafür herzlichst danken zu können, daß er mir seinerzeit in der Bereitstellung der auf *Polyploca diluta* F. bezüglichen Literatur hilfreich an die Hand ging.

Es liegt eine Reihe von Cotypen der f. nov. *hartwiegi* vor, die sich in folgenden Sammlungen befinden:

♂ Nr. 1—7 in coll. Reisser, Nr. 8—10 in der Sammlung des Naturhistorischen Museums, Nr. 11 in coll. Dr. Hartweg, Braunschweig, Nr. 12 in coll. Busse, ebendort, Nr. 13 in der Landesammlung des Braunschweiger Entomologenvereines, Nr. 14, 15 in coll. Bubacek, Nr. 16 in coll. Gschwandner, Nr. 17—20 in coll. Ing. Kautz, Nr. 21 in coll. J. Kitt, Nr. 22, 23 in coll. Dr. M. Kitt, Nr. 24, 25 in coll. Preißbecker, Nr. 26 in coll. Ronnicke, Graz, Nr. 27—29 in coll. Dr. Schawerda, Nr. 30—32 in coll. Dr. Schima. Weitere Cotypen befinden sich noch in meinem Besitz.

♀ Nr. 1, 2 und 5 in coll. Reisser, Nr. 3 im Naturhistorischen Museum, Nr. 4 in coll. Ronnicke.

Verzeichnis der von Herrn Rudolf Oldenburg in Kamerun gesammelten Schmetterlinge.

Von Heinrich Neustetter, Wien.

(Fortsetzung.)

Nymphalidae.

- Charaxes jasius* var. *epijasius* Reiche in Ferret u. Galin. Voy. Abyss. Ent. p. 469, t. 32, f. 1, 2 (1849).
Auriv. Rhop. Aeth., p. 232.
Seitz II, p. 126, t. 30 a.
Schultze, Archiv f. Biont. IV, Heft 1, p. 101.
1 ♂ von Banjo.
- Char. etesipe* Godt. Enc. Meth. 9, p. 355 (1823).
Auriv. Rhop. Aeth., p. 234.
Seitz II, p. 128, t. 30 c.
Schultze, Archiv f. Biont. IV, p. 99.
Je 1 ♂ von Gorori und Ngambe.
- Char. lactinctus* Karsch. Ent. Nachr. 18, p. 113 (1892).
Auriv. Rhop. Aeth., p. 234.
Seitz II, p. 130, t. 30 d.
Schultze, Archiv. f. Biont. IV, p. 107.
2 ♂♂ dieser seltenen Art von Banjo.
- Char. cynthia* Butl. Proc. Zool. Soc. (1865), p. 626, t. 36, f. 3 (1866).
Auriv. Rhop. Aeth., p. 235.

- Seitz II, p. 130, t. 31 a.
Schultze, Archiv f. Biont. IV, p. 108.
2 ♂♂ von Gorori, 1 ♂ von Ngambe.
- Char. tiritates* Cram. Pap. Exot. 2, p. 100, t. 161, f. A, B. ♂ (1777).
Auriv. Rhop. Aeth., p. 239.
Seitz II, p. 132, t. 31 b.
Schultze, Archiv f. Biont. IV, p. 111.
2 ♂♂ von Ngambe.
- Char. numenes* Hew. Exot. Butterfl. Charaxes, t. 2, f. 9—11 (1859).
Auriv. Rhop. Aeth., p. 240.
Seitz II, p. 132, f. 31 c.
Schultze, Archiv f. Biont. IV, p. 112.
3 ♂♂ von Ngambe, 1 ♂ von Gorori hat nur wenige verloschene, blaue Flecken der Flügeloberseite.
- Char. ameliae* Doumet, Rev. Zool. (2) 13, p. 171, t. 5, f. 1 ♂ (1861).
Auriv. Rhop. Aeth., p. 240.
Seitz II, p. 133, t. 31 b.
Schultze, Archiv f. Biont. IV, p. 113.
1 ♂ von Gorori, 1 ♂ von Ngambe.
- Char. etheocles* Cram. Pap. Exot. 2, p. 34, t. 119, f. D. E. (1777).
Auriv. Rhop. Aeth., p. 237.
Seitz II, p. 135, t. 33 b.
Schultze, Archiv f. Biont. IV, p. 116.
Einige ♂♂ von Ngambe und 1 ♂ von Gorori, letzteres der Form *Hollandi* Butl. angehörend.
- Char. fulvescens* Auriv. Ent. Tidskr. 12, p. 216 (1891).
Auriv. Rhop. Aeth., p. 241.
Seitz II, p. 139, t. 32 d.
Schultze, Archiv f. Biont. IV, p. 119.
1 ♀ von Ngambe.
- Char. lichas* Doubl. u. Hew. Gen. D. Lep., t. 49, f. 3 ♂ (1850).
Auriv. Rhop. Aeth., p. 242.
Seitz II, p. 139.
Schultze, Archiv f. Biont. IV, p. 120.
1 ♂ von Ngambe.
- Char. eupale* Drury, III. Exot. Ins. 3, p. 7, t. 6, f. 3 (1782).
Auriv. Rhop. Aeth., p. 245.
Seitz II, p. 140, t. 32 c.
Schultze, Archiv f. Biont. IV, p. 122.
1 ♂ von Ngambe.
- Cymothoé theobene* Dbl. Hew. Gen. D. Lep., p. 288, t. 40, f. 3 (1850).
Auriv. Rhop. Aeth., p. 211.
Seitz II, p. 144, t. 34 d.
Mehrere ♂♂ von Fokubar und Ngambe.
- Cym. Reinholdi* Plötz, S. E. Z. 41, p. 194 (1880).
Auriv. Rhop. Aeth., p. 211, T. 4, F. 6, 7.
Seitz II, p. 145.
1 ♂ von Gorori.

- Cym. Beckeri* H. Sch., Außereurop. Schm. Tagf. f. 81 (1850).
 Auriv. Rhop. Aeth., p. 212.
 Seitz II, p. 145, t. 34 c.
 Mehrere ♂♂ und 1 ♀ von Ngambe.
- Cym. egesta* v. *confusa* Auriv. Oefvers. Vet.-Akad. Förhandl. 44,
 p. 310 (1887).
 Auriv. Rhop. Aeth., p. 211.
 Seitz II, p. 146, t. 34 a, b. 36 a.
 1 ♂, 1 ♀ von Ngambe.
- Cym. lurida* v. *Colmanti* Aur. Ent. Tidskr. 19, p. 180, f. 6 (1898).
 Auriv. Rhop. Aeth., p. 212.
 Seitz II, p. 147.
 1 ♂, 2 ♀♀ von Gorori. Das ♂ paßt am besten zu *Colmanti*,
 die beiden ♀ sind dunkelbraun, größer als die typische
lurida, die weiße Ouerbinde der Vorderflügel etwas
 schmaler, die Hinterflügel am Saum leicht rotbraun auf-
 gehellt.
- Cym. herminia* Smith, An. N. H. (5), 19, p. 63 (1887).
 Auriv. Rhop. Aeth., p. 213.
 Seitz II, p. 149, t. 35 a.
 2 ♂♂ von Ngambe. Dieselben stimmen gut mit solchen aus
 Süd-Kamerun und dem Kongo-Gebiet (Beni) überein.
 Dagegen möchte ich ein in meiner Sammlung befindliches
 Stück aus Liberia erwähnen, welches eine sehr eintönig
 gezeichnete, matte und fast gar nicht schwarz schattierte
 Unterseite zeigt.
- Cym. caenis* Drury, Ill. Exot. Ins. 2, p. 33, t. 19, f. 1, 2 (1773).
 Auriv. Rhop. Aeth., p. 214.
 Seitz II, p. 151, t. 35 c.
 1 gutes und mehrere abgeflogene ♂♂ von Fokubar.
- Cym. aramis* Hew. var. *excelsa* Neust. D. E. Z. Iris Dresden 1912,
 p. 174.
 Seitz II, p. 153, t. 36 c als *coccinata*.
 2 ♂♂ von Gorori gehören zu dieser von mir beschriebenen
 Form.
- Cym. coccinata* Hew. Exot. Butt. Harma, t. 6, f. 24, 25 (1874).
 Auriv. Rhop. Aeth., p. 216.
 Seitz II, p. 153.
 Neust. D. E. Z. Iris 1912, p. 175.
 Nur 1 ♂ von Ngambe.
- Cym. sangaris* God. Enc. Meth. 9, p. 384 (1823).
 Auriv. Rhop. Aeth., p. 216.
 Seitz II, p. 153.
 Neust. D. E. Z. Iris 1912, p. 179.
 2 ♂♂ von Gorori und Ngambe.
- Diostogyna tadema* Hew. Exot. Butt. Aterica u. Harma, f. 10—12,
 Auriv. Rhop. Aeth., p. 203. [(1866).
 Seitz II, p. 165, t. 38 a.
 1 ♂ von Gorori.

Euryphene tentyris Hew. var. *Seeldrayersi*, Aur. Rhop. Aeth. p. 201.
Seitz II, p. 171.

Nur 1 ♂ dieser seltenen Form von Fokubar.

Euryph. absolon F., Ent. Syst. 3. 1, p. 56 (1793).

Auriv. Rhop. Aeth., p. 201.

Seitz II, p. 172, t. 41 d, f.

1 ♂, 1 ♀ von Ngambe.

Euryph. plistonax Hew., Exot. Bütt. Euryphene, t. 9, f. 38, 39 (1874).

Auriv. Rhop. Aeth., p. 198.

Seitz II, p. 177, t. 40 c.

5 ♂♂ von Ngambe.

Euryph. flaminia Stgr., D. E. Z. Iris 4, p. 110, t. 1, f. 4 (1891).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 199.

Seitz II, p. 176, t. 40 e.

1 ♂ von Ngambe.

Euphraeda Wardi Druce, Cist. Ent. I, p. 286 (1874).

Auriv. Rhop. Aeth., p. 191.

Seitz II, p. 183, t. 44 d.

1 ♀ von Ngambe.

Euph. spatiosa Mab., Bull. Soc. Zool. Fr. I, p. 278 (1877).

Auriv. Rhop. Aeth. p. 191.

Seitz II, p. 183.

Zwei große ♀♀ von Gorori und Ngambe.

Euph. medon L., Cent. Ins., p. 19 (1763).

Auriv. Rhop. Aeth., p. 190.

Seitz II, p. 184, t. 45 a.

Einige ♂♂ und 1 ♀ von Fokubar und Ngambe.

Euphaedra peculiaris Lathy, Trans. Ent. Soc. Lond. 1906, p. 5.

Seitz II, p. 183.

Ein ♂♀ von Fokubar.

Pecularis steht dem *medon* sehr nahe und dürfte nur eine Form davon sein, die ♂♂ variieren sehr und sind oft kaum von *medon* zu unterscheiden, nur die schwarzen Flecken in der Zelle der Vorderflügel sind kleiner. Die ♀♀ dagegen sind sehr konstant, die gelbe Subapikalbinde der Vorderflügel immer schmaler als bei *medon*. Die Hinterflügel einfarbig braun, ohne jede Spur von blauer oder weißlicher Aufhellung.

Euph. themis Hbn., Exot. Schmett. 1, t. 60 (1806—1816).

Auriv. Rhop. Aeth., p. 188.

Seitz II, p. 183, t. 43 c.

Ein ♂ von Ngambe.

Euph. inamum (Butl.) var. *intermedia* Rbl. Wiss. Ergebn. d. Exp.

R. Grauer nach Zentralafrika (Ann. des k. k. Naturhist. Hofmuseums Wien 1914, p. 43—44).

1 ♂ von Ngambe stimmt mit den Stücken im Wr. Hofmuseum.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Österreichischen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1927

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Neustetter Heinrich Michael

Artikel/Article: [Verzeichnis der von Herrn Rudolf Oldenburg in Kamerun gesammelten Schmetterlinge. Fortsetzung. 27-30](#)