

## Gon. cleopatra f. ♀ citrina Shelj. auch in Dalmatien.

Von O. Holik, Prag.

In den Mitteilungen der Münchner Entomolog. Gesellschaft (1925) beschreibt Sheljuzhko *Gon. cleopatra* f. ♀ *citrina*. Mir liegt zwar die Originalbeschreibung nicht vor, denn ich entnehme in diesem Falle meine Kenntnis den „Novitates macrolepidopterologicae“ Bd. II, aber der Name ist deutlich genug, um erkennen zu lassen, daß es sich um das gelbe Weib von *G. cleopatra* L. handelt. Als Heimat dieser neuen Form wird Afrika, Nordmorea angegeben. Es dürfte von Interesse sein, daß diese Form auch in Dalmatien, und zwar stellenweise scheinbar nicht allzu selten vorkommt. Ich erhielt von Herrn Hentschel (Eger) ein von ihm im Jahre 1924 auf der Insel Lakroma gefangenes Exemplar, im Jahre 1926 fing ich dortselbst ein Stück und ein zweites sah ich in unerreichbarer Nähe fliegen, ein viertes Exemplar vom selben Fundort erbeutete der mittlerweile verstorbene Sammler Schönfeld. Schwingenschuß und Wagner erwähnen die Form nicht in ihrem Aufsatz „Beitrag zur Macrolepidopteren-Fauna Süddalmatiens, insbesondere der Umgebung Gravosas“ (Zeitschrift d. Öst. Ent.-Ver. 1925, p. 71). Deshalb kann diese Notiz als Ergänzung zu obigem Artikel gelten. Im Gegensatz zu der von den oben erwähnten Autoren ausgesprochenen Vermutung, die Art komme bei Gravosa nur auf der Insel Lakroma, nicht aber auf dem Festlande vor, kann ich berichten, daß ich sie bei Ragusa mehrfach in der Nähe des Hotels Odak beobachtete, ebenso auch bei Kupari. Wenn im ersten Fall wegen der Nähe Lakromas an verflogene Stücke gedacht werden könnte, kommt diese Annahme bei dem Vorkommen bei Kupari doch nicht in Betracht. Die Art muß dort heimisch sein.

## Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopteren-Fauna Mährens.

Von Oberst Siegmund Hein, Linz.

(Fortsetzung.)

- \*214. *B. perla* F. (1600.) Häufig bei Domstadt; an den steinernen Eisenbahndämmen und Durchlässen; desgleichen Kitt in Anzahl.
- 215. *Diloba caeruleocephala* L. (1610.) Mehrfach aus Raupen, welche bei Schrein gesammelt wurden.
- \*216. *Hadena porphyrea* Esp. (1661.) Olmütz, am Köder nicht häufig, in Anzahl Kitt am Köder.
- 217. *H. sordida* Bkh. (1679.) Einige Stücke bei Olmütz von Ende V und ganzen VI.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Österreichischen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Holik Otto Karl

Artikel/Article: [Gon. cleopatra f. citrina Shelj. auch in Dalmatien. 22](#)