

Syntomidae.

523. *Syntomis phegea* L. (4146.) Nur einmal ein Stück bei Mariental gefangen; Kitt auch nur einzeln. Flugzeit Juli bis August: scheint recht spärlich im Auftreten zu sein.

Arctiidae.

- *524. *Spilosoma mendica* Cl. (4158.) Bloss in Schmeil einmal ein ♀ gefunden, Mitte Juni; Kitt die Raupe.
525. *Sp. lubricipeda* L. (4159.) Von Olmütz ein Stück aus einer Raupe.
526. *Sp. menthastri* Esp. (4163.) Olmütz Licht und sonst, Kitt Raupe.
- *527. *Sp. urticae* Esp. (4164.) Sehr spärlich bei Olmütz.
- *528. *Phragmatobia fuliginosa* L. (4168.) Häufig wie überall; auch Kitt, Licht.
529. *Parasemia phantaginis* L. (4177.) Bei Schmeil sehr häufig; die Männchen der Stammart höchst selten; nur 2 Stück gesehen und gefangen, sonst ausschließlich nur die Form.
530. — ab. ♂ *hospita* Schiff. (4177a.) Auch bei der Zucht konnte ich nur diese ♂-Form erzielen, kein ♂ der Stammform. Jedenfalls sehr auffällig. (Fortsetzung folgt.)

Versuch einer faunistischen Bearbeitung der Makrolepidopteren des südlichsten Böhmens.

Von L. Batá, Budweis.

(Fortsetzung.)

- Diacrisia sannio* L. Ueberall.
- Hyphoraia aulica* L. Nur auf dem Torfmoor in wenigen Stücken gefunden.
- Arctia* Schrk. Ueberall: *caja* L. — Lokal: *hebe* L. Auf dem Berge Kluk, laut verlässlicher Mitteilung.
- Callimorpha* Latr. Ueberall und sehr häufig: *dominula* L. — Lokal: *quadripunctaria* Pod. Hosin bei Budweis, in einigen Stücken festgestellt (Kub).
- Hipocrita jacobaeae* L. Fast überall, besonders als Raupe.
- Dasychira* Stph. Ueberall: *fascelina* L., *pudibunda* L. — Einzeln: *abietis* Schiff. 1 Stück im J. 1915 (Zav.)
- Hypogymna morio* L. Vor Jahren hatte Kaudelka viele Raupen in der Nähe der Stadt ausgesetzt. Es wurden später einige Falter gefangen, die wohl dieser künstlich eingebürgerten Brut abstammen. Aber auch auf dem Torfmoor wurde 1 Stück erbeutet (Cermák), wahrscheinlich aus dem nahen Oesterreich zugewandert.
- Orgyia* O. Ueberall: *antiqua* L. — Lokal: *gonostigma* F., öfters als Raupe im Maltschtal gefunden.
- Arctornis L nigrum* Müll. Im September 1927 wurden einige Raupen in den Buchenwäldern bei Hluboka geklopft (Kub).

- Lymantria* Hb. Ueberall: *monacha* L., periodisch als Schädling auftretend, melanotische Formen, nicht selten, oft vorherrschend. — Lokal und einzeln: *dispar* L., nur stellenweise, war jedoch vor Jahren häufiger (Kaud).
- Porthesia similis* Fueßl. Ueberall.
- Euproctis chryorrhoea* L. Ueberall als Schädling.
- Stilpnotia salicis* L. Stellenweise als Schädling.
- Malacosoma neustria* L. Wie die vorige Art.
- Trichiura crataegi* L. Die recht variablen Raupen werden im ganzen Gebiete vereinzelt gefunden, der Falter erscheint auch am Licht.
- Poecilocampa populi* L. Ueberall, nicht häufig.
- Eriogaster* Germ. Ueberall: *lanestris* L. Einzeln: *catax* L., bisher nur in Oberhaid sichergestellt (Ku).
- Lasiocampa* Schrnk. Ueberall: *quercus* L., *trifolii* Esp.
- Macrothylacia rubi* L. Ueberall.
- Cosmotriche potatoaria* L. Ueberall, doch nicht immer zahlreich.
- Selenephra* ab. *lobulina* Esp. Lokal in Fichtenwäldern.
- Epicnaptera tremulifolia* Wird nur spärlich, jedoch fast im ganzen Gebiete gefunden.
- Gastropacha quercifolia* L. Ueberall aber nirgends in Menge. Ich fand Raupen öfter auch an *Populus tremula*.
- Odonestis pruni* L. Ueberall, männliche Falter erscheinen gerne am Licht.
- Dendrolimus pini* L. Ueberall in Kieferwäldern, massenhaftes Vorkommen selten.
- Lemonia* Hb. Lokal: *dumi* L. nicht selten in der Budweiser Ebene auf Wiesen. Einzeln: *taraxaci* Esp., bisher nur in Oberhaid festgestellt.
- Drepana* Schrnk. Ueberall: *falcataria* L., *lacertinaria* L. Lokal: *binaria* Hufn., in Eichenbeständen, *cultraria* F. Einzeln: *curvatula* Bkh. Nach älteren Angaben 1 Stück (Richter).
- Cilix glauca* Sc. Ueberall, doch nicht häufig.
- Endromis versicolora* L. Im ganzen Gebiete nicht zahlreich.
- Saturnia* Schrnk. Ueberall: *pavonia* L. Einzeln: *pyri* L. 1 ♀ mitten in Budweis 1916. Wohl nur ein zufälliger Fund, die Art ist hier kaum heimisch.
- Cerura* Schrnk. Ueberall: *bifida* Hb. Einzeln: *bicuspis* Bkh., bisher nur 2 Stück am Licht in Budweis (Cifka, Zav.).
- (Fortsetzung folgt.)

Monatsversammlung!

Die nächste Monatsversammlung findet am **2. Oktober 1929** statt.
Zahlreiches Erscheinen erwünscht.

Die Herren Vereinsmitglieder werden ersucht, die noch ausstehenden Mitgliedsbeiträge ehestens einzuzahlen.

Die Vereinsleitung.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Österreichischen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Bata Leontin

Artikel/Article: [Versuch einer faunistischen Bearbeitung der Makrolepidopteren des südlichsten Böhmens. Fortsetzung. 91-92](#)