

Tephroclystia nageli Skala und Lythria purpuraria L. in Mähren.

Von Hugo Skala, Altenfelden.

Von *Tephr. nageli*, siehe E. Z. Frankfurt, 42. J., S. 318 lagen mir 2 gleichzeitig gefangene Stücke vor, von welchen ich das bessere an Herrn Prof. Dr. Rebel zur Begutachtung einsandte. Geringere Größe, auffallend andere Färbung und spätere Flugzeit — Juli, während ich *strobilata* stets nur im Mai, Juni dort antraf — sind drei Gründe, welche die Aufstellung der eigenen Art immerhin rechtfertigen dürften.

Das Vorkommen von *Lythria purpuraria* L. bezweifelt Hein in seinem Beitrage, Z. d. öst. E.-V. Wien 1929, S. 46 ganz zu Unrecht. 1912 war mir die Trennung in 2 Arten, *purpurata* L. und *purpuraria* L., genau so unbekannt wie den meisten Lepidopterologen. Doch schon im Beitrag Z. d. öst. E.-V. Wien 1923 wurden die Angaben Zernys und Kitts nachgewiesen, was Hein übersehen hat. *Purpuraria* wurde dabei nicht eingezogen, weil kein Anlaß dazu vorhanden war. Meine Sammlungstiere befinden sich im Landesmuseum zu Linz und sind dort leicht zugänglich. Es sind *purpuraria*, ebenso wie ein mir von Ferdinandsruhe übermitteltes Stück. Ein Falter von Jaikowitz wurde überdies von Prof. Dr. Rebel im Jahre 1927 als *purpuraria* bestimmt. Die Art bleibt also für Mähren aufrecht, trotzdem ich für die Richtigkeit der meisten sonstigen Angaben genau so wenig eintreten kann, wie irgendjemand für das Gegenteil. Hein hat bei seinen verdienstvollen und interessanten Beitrag die seit 1912 erschienene Literatur auch sonst außeracht gelassen.

Literaturreferat.

Die Schmetterlinge Südbayerns. I. Teil, 3. Heft von Ludwig Osthelder, Beilage zum 19. Jahrgang der Mitteilg. der Münchener Entomologischen Gesellschaft.

Heft 3 bringt die Geometriden in ebenso mustergiltiger Art wie die bisher erschienenen zwei Hefte. Neu aufgestellte Formen sind:

Geometra papilionaria L. *obsoleta*, pag. 379.

Acidalia trilineata Sc. *pseudolutearia*, 383.

„ *similata* Thng. *flava*, 384.

„ *virgularia* Hb. *undulata*, 386.

Ortholita limitata Sc. *insignata*, 398.

Lobophora sertata Hb. *nigrofasciata* und *obscurata*, 406.

Larentia variata Schiff. *tenuifasciata*, 419.

„ *juniperata* L. *caeca* Feustel, 422.

„ *montanata* Schiff. *nigrofasciata* und *divisa*, 434.

„ *pomoeriaria* Ev. *divisa*, 438.

„ *caesiata* Lang. *clarior*, 442.

„ *flavicinctata* Hb. *divisa*, 443.

„ *nobiliaria* H. S. *flavata*, 445.

„ *verberata* Sc. *fuscofasciata*, 446.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Österreichischen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Skala Hugo Otto Victor

Artikel/Article: [Tephroclystia nageli Skala und Lythria purpuraria L. in Mähren.](#)
[115](#)