

Falter aus dem oberen Mühlviertel.

Von Hugo Skala, Altenfelden.

(Fortsetzung.)

- Lar. infidaria* Lah. 1 St. 12. VII. L.
Lar. autumnalis Ström. Je 1 St. 31. V. und 10. VI. L.
Lar. badiata Hb. 1 St. 8. V. L.
Lar. nigrofasciaria Goeze. 1 St. 20. V. L.
Teph. laquearia H.S. Einzeln Engled, Altenfelden zw. 15. VI. und 13. VIII. am L. nicht selten in sehr veränderlichen Stücken (det. Reb.).
Teph. abietaria Goeze. 1 gr. St. 17. VII. im Panholz.
Teph. venosata F. 1 St. 3. VII. L.
Teph. extravarsaria H.S. Mehrf. zw. 18. VI. und 24. VII. am L. (det. Reb.).
Teph. selinata H.S. 1 St. 10. VI. am Licht (det. Reb.). Für das Land meines Wissens neu.
Teph. isogrammaria H.S. 6 St. im VI am L. (det. Reb.).
Teph. exigua Hb. 1 St. 9. VI. am L.
Teph. sobrinata Hb. Je 1 St. 12. VII. u. 21. VIII. am L. (det. Reb.).
Chlor. rectangulata ab. *cydoniata* Bkh., ab. *subaerata* Hb. einz. unter der häuf. Art.
Coll. sparsata Tr. 1 St. 11. VII. am L.
Abr. marginata ab. *nigrofasciata* Schöyen. 2 St. im V am L.
Our. sambucaria L. 1 St. 18. VII. L.
Eur. dolabraria L. E. V, VI mehrfach, bes. am L.
Hyb. marginaria Bkh. Einz. im V, also recht spät im Panholz.
Boa. cinctaria Schiff. V am L. nicht selten, darunter je 1 ab. *luciliata* Fuchs und *consimilaria* Dup.
Pach. hippocastanaria Hb. 1 St. 29. V. L.
Thamn. wauaria L. im VII 3 St. am L.
Thamn. brunneata Thnbg. 1 St. 12. VII. am L.
Phas. clathrata L. 1 St. vom 22. VII. gehört schon zur ab. *nocturnata* Fuchs.

Nolidae.

- Nola cucullatella* L. VII wenige Tiere am L.
Nola confusalis H.S. Je 1 St. 8. V. u. 3. VII. am L.

Cymbidae.

- Sarr. degenerana* Hb. Je 1 St. 7. V. und 26. VIII. am L.

Arctiidae.

- Rhyp. purpurata* L. 1 Raupe 20. IX. im Panholz.
Cyb. mesomella ab. *flava* Preiss. einzeln unter der Art.

Sesiidae.

- Troch. apiformis* Cl. Ein Junge brachte mir 1 St. von Pürnstein, gef. 12. VII.
Ses. tipuliformis Cl. Alte Fraßgänge in ausgehackten Johannisbeersträuchern. selten.

Elachistidae.

- Schreckenst. festaliella* Hb. (3405) Höferleiten 20. V. 1923 (det. Mitt.), auch Mayrhof, 31. V. 1928.
Eperm. illigerella Hb. (3406) Altenfelden 1 St. 8. VI. 1929 L. (det. Mitt.).
Scyth. cuspidella Schiff. (3487) Neufelden. 27. V. 1923, Höferleiten im VI. 1929 einzeln.
Catapl. fulviguttella Z. (3547) Engled 29. VI. 1927.
Cosm. eximia Hw. (3557) Höferleiten mehrere Minen (det. Her.).

(Fortsetzung folgt.)

Literaturreferat.

Die Großschmetterlinge der Erde. Dr. Adalbert Seitz, Alfred Kernen Verlag, Stuttgart. Supplement Lfg. 19 und 20, pag. 265—296 mit 2 Tafeln.

Beide Lieferungen enthalten die Fortsetzung der Gattung *Lycaena*. *Lycaena abencerragus* Pier. ist eigene Art und könnte gewiß auch als solche

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Österreichischen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Skala Hugo Otto Victor

Artikel/Article: [Falter aus dem oberen Mühlviertel. Fortsetzung. 26](#)