

Beitrag zur Fauna Oberösterreichs.

Kefermarkt im östlichen Mühlviertel (3. Beitrag).

Von H. Foltin, Vöcklabruck, O.-Oe.

(Schluß).

Verzeichnis der im Jahre 1934 in Kefermarkt gefundenen neuen Arten:

Lycaena minimus Fueßl., *Zephyrus betulae* L., *Celerio galii* Rott., *Selenephera lunigera* v. *lobulina* Esp., *Acronycta tridens* Schiff. und *euphorbiae* F., *Agrotis candelarum* Hb., *stigmatica* Hb., *dahlia* Hb. und *corticea* Hb., *Mamestra aliena* Hb. (n. f. M.), *Dianthoecia filigramma* v. *xanthocyanea* Hb., *Hadena gemma* Tr., *Polia xanthomista* v. *nigrocincta* Tr. *Dryobota protea* Bkh. (n. f. M.), *Dipterygia scabriuscula* B., *Hydroecia micacea* Esp., *Luceria virens* L., *Calamia lutosa* Hb. (n. f. M.), *Caradrina ambigua* F., *Panolis griseovariegata* Goeze, *Xanthia gilvago* Esp. (n. f. M.), *Xylina ingraca* HS., *Calophasia lunula* Hufn., *Plusia moneta* F., *Herminia derivalis* Hb., *Acidalia rubiginata* Hufn., *Lygris testata* L., *Larentia stragulata* Hb. (n. f. M.) und *molluginata* Hb., *Tephroclystia indigata* Hb., *pimpinellata* Hb. und *distinctaria* HS., *Ennomis erosaria* Bkh., *Hybernia leucophaearia* Schiff., *Anisopteryx aescularia* Schiff., *Boarmia maculata* v. *bastelbergeri* Hirschke, *Hylophila prasinana* L., *Chloeophora bicolorana* Fueßl. (n. f. M.), *Sesia vespiformis* L.

Ueberdies bin ich in der Lage, aus dem Moorgebiete des nordöstlichen Mühlviertels bei Liebenau (Tanner-Moor) einige interessante Neufunde mitzuteilen, die ich nachstehend veröffentliche. Diese Funde stammen zum Großteil von dem in Liebenau sammlerisch tätigen Schulleiter i. R. Herrn F. Rauch. Besonders interessant sind die Funde von *Eubolia murinaria* F. (ein Stück kam mir in Neustift ans Licht) und *Perconia strigillaria* Hb., das ich am Rande des Tanner-Moores erbeutete. Außerdem gelang es mir einen neuen Flugplatz der *Larentia otregiata* Metcalfe festzustellen (Hirschau, nördlich von Liebenau), bisher war sie vom Tanner-Moor bekannt.

Der Stand für das ganze Mühlviertel erhöht sich nun durch diese Neufunde von 772 Arten auf 795 Arten. Hier sind die Neufunde, die im 2. Beitrag für Kefermarkt (Zeitschr. d. Oest. Ent.-Ver., 1934, Folge 4) verzeichnet sind, mit eingerechnet. Die Neufunde aus anderen Teilen des Mühlviertels durch andere Sammler sind nicht berücksichtigt.

Verzeichnis der Neufunde aus dem Moorgebiete:

Hesperia armoricanus Obth., *Pheosia dictaoides* Esp., *Stilpnotia salicis* L., *Selenephera lunigera* v. *lobulina* Esp. (F.¹⁾, *Lemonia taraxaci* Esp. (n. f. M.), *Panthea coenobita* Esp., *Agrotis obscura* Hb. (n. f. M.), *candelarum* Stgr. (n. f. M.) (F.), *latens* Hb. und *corticea* Hb., *Tapinostola fulva* Hb. (n. f. M.), *Hydroecia paludis* Tutt., *Caradrina morpheus* Hb., *Panolis griseovariegata* Goeze, *Xylina ingraca* HS., *Ortholitha cervinata* Schiff., *Larentia cognata* Thbg. (n. f. M.), *incursata* Hb., *autumnata* Bkh., *rivata* Hb., *ruberata* Frr. (n. f. M.) und *badiata* Hb., *Tephroclystia nanata* Hb. und *sobrinata* Hb., *Semiothisa notata* L., *Boarmia angularia* Thbg. (n. f. W.) (F.) und *jubata* Thbg. (F.), *Eubolia murinaria* F. (F.), *Perconia strigillaria* Hb. (F.) und *Spilosoma mendica* Cl.

¹⁾ Das Zeichen (F.) bedeutet: Vom Verfasser gefundene Art.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Österreichischen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Foltin Hans

Artikel/Article: [Beitrag zur Fauna Oberösterreichs. Kefermarkt im östlichen Mühlviertel \(3. Beitrag\). Schluß. 44](#)