©Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, Wien, download unter www.biologiezentrum.at

das äußerste Ende des Abdomens. Die Fransen beider Flügel sind weißlich. Die Unterseite beider Flügel erscheint stark geschwärzt. Der Vorderrand und der Außenrand beider Flügel sind ockergelblich. Flügelspitzenabstand beim ♂ 20, bei den ♀♀ 21 mm. *Crambus wolfschlägeri* hat — natürlich nur was die Farbe betrifft — eine gewisse Aehnlichkeit mit *Tortrix paleana icterana* Froel. Aber das Gelb der Vfl ist ein tieferes und mehr ockerfarbiges. Das Schwarz der Hfl ist intensiver als es z. B. *Tortrix viburnana* F. besitzt. Dieser Vergleich ist kein morphologischer. Er soll nur die Farbe besser beschreiben. Ein ♂ und zwei ♀. Ochrida (Petrina 1600 m) Mazedonien. Am 23. und 26. Juni 1935 von Herrn Roman Wolfschläger (Linz) erbeutet, dem diese neue Art gewidmet sei. Die erste Type in meiner Sammlung, die beiden anderen Exemplare in der Sammlung des Herrn Wolfschläger und im Wiener Museum.

Heterographis macedonica species nova.

Nach Zerny eine sichere *Heterographis*.

Die Vfl, Thorax, Kopf, Palpen und Fühler ganz licht strohgelb. Die Farbe ist z. B. der von *Anerastia ablutella* Z. ähnlich.

Der Vorderrand der Vfl und das Abdomen sind weißlich. Eine Zeichnung ist im Strohgelb der Vfl kaum sichtbar, höchstens die Spur einer praemarginalen Querlinie. Das einzige Exemplar (♂) ist fransenrein. Die Hfl sind weißlich mit einer schwachen bräunlichen Saumlinie. Die Adern derselben gegen den Rand zu licht bräunlich. Die Unterseite der Vfl gelblich, die der Hfl weiß. 17 mm Flügelspitzenabstand. Am 2. VI. 1935 von dem bekannten Linzer Entomologen in Ochrida erbeutet. In collectione mea.

Zu meinem Beitrag zur Mikrolepidopterenfauna Sardiniens.

Von Dr. Carl Schawerda, Wien.

In der Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen-Vereines, Wien, 21. Jahrgang 1936, p. 81, ist infolge eines Schreibfehlers unter den Scythrididen *Heinemannia festivella* Schiff. angeführt. Es handelt sich um die aus Sardinien bekannte *Heinemannia albidorsella* Stdgr.

In der Gruppe der Pyraliden vergaß ich die seinerzeit Herrn Osthelder bereits mitgeteilte Neubeschreibung der ganz verdunkelten, fast einförmig schwärzlichen Form von *Acrobasis bithynella* Z., die ich ab. nova *noctiptera* nannte. Es ist auf den Vfln die Zeichnung gar nicht oder kaum mehr zu erkennen.

Aritzo und Santa Teresa im September.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift des Österreichischen Entomologischen Vereins

Jahr/Year: 1937

Band/Volume: 22

Autor(en)/Author(s): Schawerda Karl [Carl]

Artikel/Article: Zu meinem Beitrag zur Mikrolepidopterenfauna Sardiniens. 56