

Griechische Lepidopteren VI.*)

Von Prof. Dr. H. Rebel, Wien.

Abermals hat Universitätsprofessor Dr. Franz Werner im Frühsommer 1938 eine zweimonatige Forschungsreise auf die griechischen Inseln unternommen und die von ihm gelegentlich auf dieser Reise gesammelten Lepidopteren dem Naturhistorischen Museum übergeben.

Weitaus das interessanteste faunistische Ergebnis dieser Reise war das Auffinden von *Epinephele telmessia* Z. auf der kleinen (bei der Insel Aegina gelegenen) Insel Angistri, was den westlichsten Fundort dieser bisher als ausgesprochen anatolisch angesehenen Art darstellt. Sie war bisher westlich von Nikaria und Karpathos nicht nachgewiesen. Fast macht es den Eindruck, daß *Ep. telmessia* von der größeren *Ep. jurtina* verdrängt wurde, und sich nur auf Angistri in einem kleinen Bestand erhalten hat. Jedenfalls ist der Fund zoogeographisch von großer Bedeutung.

Die bisherigen Reisen Prof. Werners nach Griechenland haben die früher bestandene Annahme, daß die griechischen Inseln eine reiche Lepidopterenfauna besäßen, widerlegt. Es handelt sich um insular verarmte Bestände, die aber doch ein großes faunistisches Interesse gerade durch ihre beschränkte Verbreitungsmöglichkeit besitzen.

Wien, im November 1938.

Lokalitätsverzeichnis.

Aedypsos (Euboea), 11. Juni.	Poros, Insel an der Ostküste von
Aegina, Insel, 27. Mai.	Morea, 29. Mai.
Angistri, kl. Ins. bei Aegina, 27. Mai.	Portarias bei Volos (Thessalien),
Chalkis (Euboea), 8. Juni.	20. Juni.
Epidaurus, in Argolis, 3. Juni.	Samos, Ins. südl. Aeg. Meer, anfangs
Hydra, Insel südlich von Aegina,	Juli.
29. Mai.	Skiathos, westl. Ins. der nördl. Spor-
Hymettos bei Athen, 23., 26. Mai.	raden, 14.—17. Juni.
Kymi (Euboea), 5. Juni.	Thasos, Ins. nördl. der Halbinsel
Makri bei Alexandropolis (Thrazien),	Chalkidike, 13., 14. Juli.
11. Juli.	Tinos, Ins. nördl. Kykladen, 1. Juli.
Metopi bei Angistri, 27. Mai.	Volos, Bucht und Stadt in Thessalien.
Mytilene, 13. Juni, 9. Juli.	Vathy, Hauptort auf Samos, 6. Juli.
	Wula, bei Athen, 27. Juni.

ARTENLISTE.

PAPILIONIDAE.

1. *Papilio podalirius* gen. aest. *zanclaeus* Z. Mytilene, 9. Juli ♂. Auch auf der Insel Thasos beobachtet (Wern.).
2. *Papilio machaon* L. Auf der Insel Tinos am 1. Juli beobachtet (Wern.).

PIERIDAE.

3. *Pieris rapae* L. Aedypsos auf Euboea 11. Juni, und Insel Skiathos, 17. Juni. Zwei der Sommerform angehörende ♀.

*) Vgl. Zeitschr. Österr. Ent. Ver. Jg. 19, p. 55; Jg. 22, p. 63, p. 93.

4. *Pieris daphidice* L. Ein frisches ♂ von Wula bei Athen am 27. Juni.

5. *Colias croceus* Fourc. Zwei ♀ von Chalkis auf Euboea 8. Juni und Portarias bei Volo 20. Juni.

6. *Gonepteryx cleopatra* L. Ein Pärchen von Skiathos am 17. Juni.

NYMPHALIDAE.

7. *Limenitis camilla* Schiff. Ein ♂ von Makri bei Alexandropolis in Thrazien am 11. Juli.

8. *Pyrameis cardui* L., ebendaher, Thasos, 14. Juli.

9. *Grapta egea* Cr. Portarias bei Volo, 20. Juni und Makri bei Alexandropolis 11. Juli, je ein ♂ der Sommerform.

9 bis. *Melitaea trivia syriaca* Rbl. Thasos, 14. Juli, 2 ♂.

SATYRIDAE.

10. *Melanargia larissa herta* HG. Drei frische ♂ von Hymettos bei Athen 26. Mai, Insel Aegina 27. Mai und Alte Burg in Boeotien, gegenüber Chalkis, 9. Juni. Alle drei Stücke sind sehr groß, jenes von Aegina erreicht bei 32 mm Vfl-Länge eine Spannweite von 53 mm. Die weiße Färbung und schwarze Zeichnung ist jene typischer *herta*.

11. *Satyrus anthelea amalthea* Friv. Ein frisches ♂ von Hymettos bei Athen 23. Mai.

12. *Satyrus semele* L. Ein defektes Pärchen. Das stark verästerte ♂ von der Insel Aegina 27. Mai, das ♀ von Hydra 29. Mai mit hellgelben Flecken der Vfl.

13. *Satyrus fatua fatua* Frr. Ein frisches ♂ von der Insel Samos, Vathy 6. Juli. Auch beobachtet auf Euboea und Thasos. (Wern.)

14. *Pararge aegeria vulgaris* Z. Kymi (Euboea) 5. Juni ein ♀, läßt sich von mitteleuropäischen Stücken nicht trennen.

15. *Pararge roxelana* Cr. Ein großes ♀ von Vathy auf Samos 6. Juli mit grauer Unterseite der Hfl.

16. *Pararge megaera lyssa* B. Aegina 27. Mai ein ♂. Verity stellte für die östliche Balkanform von *lyssa* den kaum haltbaren Namen *hemilyssa* auf.

17. *Epinephele jurtina* L. Ein ♂ von Portarias bei Volo 20. Juni, 4 ♀ von Kymi (Euboea) 5. Juni, Skiathos 15. und 18. Juni und Makri bei Alexandropolis (Thrazien), 11. Juli. Die beiden letzteren Stücke gehören schon zu *hispulla* Hb.

18. *Epinephele telmessia* Z. Ein einzelnes geflogenes, kleines ♀ (Vfl. 21, Exp. 42 mm) von der kleinen Insel Angistri (bei Aegina) 27. Mai, gehört auffallenderweise dieser Art an. — Die mattere Färbung, der etwas gestrecktere Flügelschnitt, und die vollständig zeichnungslose, einfärbig graubraune Hfloberseite sind etwas abweichende Merkmale. Das weiß gekernte Apikalaugende Vfl. ist sehr klein. Leider liegt kein ♂ von diesen so westlichen Fundorte vor. Die Art war westlich von Nikaria und Karpathos bisher nicht nachgewiesen.

19. *Epinephele lupinus* Costa. Ein ♂ von Chalkis auf Euboea am 8. Juni.

20. *Coenonympha pamphilus* L. Ein ♀ von Epidaurus, 3. Juni, gehört der Form *semimarginata* Rbl. an.

LYCAENIDAE.

21. *Thecla ilicis* Esp. Ein ♂ von Epidaurus 3. Juni und ein ♀ von Galata (gegenüber Poros) 29. Mai.

22. *Thecla spini* Schiff. Ein ♀ von Epidaurus 3. Juni.

23. *Callophrys rubi* L. Kymi auf Euboea, 5. Juni, ♀.

24. *Chrysophanus ottomanus* Lef. Ein frisches ♂ dieser schönen Art von Aedypsos auf Euboea am 11. Juni.

25. *Chrysophanus phlaeas eleus* F. Aedypsos auf Euboea 11. Juni und Wula bei Athen 27. Juni je ein frisches ♂.

26. *Tarucus telicanus* Lang. Ein geflogenes ♂ von Wula bei Athen, 27. Juni.

27. *Chilades trochylus* Frr. Limni, Euboea 10. Juni, ein ♀.

28. *Lycaena baton schiffermülleri* Hem. Ein stark geflogenes ♂ von Chalkis (Euboea) 8. Juni.

29. *Lycaena astrarche* Brgstr. Je ein ♂ von Aegina 27. Mai und Skiathos 14. Juni. Letzteres zeigt die roten Randflecken der Oberseite viel schwächer. Ein ♀ von Thasos, 14. Juli.

30. *Lycaena icarus* Rott. Ein sehr kleines, stark geflogenes ♀ von Galata (gegenüber Poros) 29. Mai, ein ♂ von Chalkis 8. Juni, zwei ♀ von Aedypsos (Euboea) 11. Juni, zwei ♂ von Skiathos 15.—17. Juni, und ein ♀ von Mytilene (Lesbos) 9. Juli.

31. *Lycaena cyllarus aeruginosa* Stgr. Ein stark geflogenes ♀ von Hymettos 4. Mai.

HESPERIIDAE.

32. *Carcharodus alceae* Esp. Ein Pärchen von Skiathos 15. bis 17. Juni 1938.

33. *Adopaea flava werneri* Rbl. Epidaurus 3. Juni ♂, Portarias 20. Juni ♀.

SPHINGIDAE.

34. *Acherontia atropos* L. Nach fr. Mitteilung Herrn Dr. Otto Wohlberedt's (Jena) erbeutete dieser am 22. Mai 1938 bei der Durchfahrt im Kanal von Korinth auf dem Verdeck des Schiffes ein sitzendes frisches Stück dieses Schwärmers. Die Flugzeit ist bemerkenswert.

LASIOCAMPIDAE.

35. *Malacosoma neustria* L. Ein ganz verflogenes ♀ von Vathy (Samos) im Juli.

NOCTUIDAE.

36. *Acontia lucida* Hufn. Mytilene 13. Juni ♂; ein zweites ♂ von Epidaurus vom 3. Juni gehört der sehr hellen ab. *insolatrix* Hb. an.

37. *Catocala eutychea* Fr. Vathy (Samos) in Anzahl anfangs Juli.

GEOMETRIDAE.

38. *Rhodostrophia calabraria* Z. Ein stark geflogenes ♀, ohne Mittelpunkte der Flügel, von Kymi (Euboea) 5. Juni.

39. *Rhodometra sacraria* L. Zwei ♂ von Metopi bei Angistri 27. Mai.

40. *Anaitis efformata* Gn. Ein ♂ von Metopi bei Angistri 27. Mai, zeigt fast eintönig grau gefärbte Vfl., mit nur ganz verloschener brauner Einmischung.

41. *Gnophos sartata* Tr. Vathy (Samos) 6. Juli. ♂.

ZYGAENIDAE.

42. *Zygaena punctum* Tr. Skiathos 14.—17. Juni einige Stücke, Mytilene ein verflogenes ♂. 18. Juni.

43. *Procris graeca* Jord. Zwei geflogene ♂ von Epidaurus 3. Juni (det. Dr. Zerny).

PSYCHIDAE.

44. *Amicta febretha* Boyer. Insel Tinos 1. Juli. Ein leer (geschlüpft) gefundener männlicher Sack hat nur 3 cm Länge, ist aber mit langen, weit vorstehenden dünnen Zweigstückchen belegt.

PYRALIDAE.

45. *Cryptoblabes gnidiella* Mill. Ein. schadhaftes Stück von Vathy, Juli.

46. *Aglossa rubralis* Hmps. Ein ♀, ebenda.

47. *Sylepta ruralis* Sc. Ein ♂, ebenda.

48. *Pyrausta fimbriatalis veneralis* Stgr. Ein ♂ von Angistri 27. Mai zeigt vor dem äußeren schwach gezackten Querstreifen der Vfl. noch zwei kurze rötlichbraune Vorderrandstriche.

Paradaria Htg. praeocc. = Hypodaria Htg.

(Mit 2 Textfiguren.)

Herr G. A. Bisset vom British Museum hatte die Liebenswürdigkeit mich auf eine Arbeit Kusnezov: List of Lepidoptera collected by L. S. Berg on the northern shores of the Aral Sea in the year 1906. Zeitschr. der Kais. Russ. Turkest. Geogr. Ges., in Naturw. Ergebn. der Aralsee-Exped., IV.; Petersburg 1908, pp. 103 bis 121, T. IV a. aufmerksam zu machen. Ich konnte mir diese nicht leicht erreichbare Arbeit Dank der Hilfe der Kgl. Ital. Geogr. Gesellschaft beschaffen, der ich, sowie auch Kollegen Bisset, meinen herzlichsten Dank ausspreche.



Fig. 1.

Zeichnungs-
schema von
Paradaria
tshetverikovi
Kusn.

In der genannten Arbeit wird vom Autor bereits ein Genus *Paradaria* geschaffen für dessen neue Art *tshetverikovi*. Des Interesses halber führe ich heute eine Kopie der Tafelfiguren dieser neuen Art bei, aus der ohne weiteres folgende generelle Unterschiede zwischen seinem Genus *Paradaria* und meinem nun in *Hypodaria* umzuändernden Genusnamen für die Art *myeloisiformis* Htg. hervorgehen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Österreichischen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1939

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): Rebel Hans

Artikel/Article: [Griechische Lepidopteren VI. 7-10](#)