©Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Süddalmatien) gefundenen Raupen erfolgt viel rascher; die Falter schlüpften bereits zwei Wochen nach Anlage des Kokons.

Der Kokon ist sehr zart, birnförmig, durch Gespinst an den Rändern leicht rauh erscheinend, schön hell rosa bis gelblich, später aber nachdunkelnd. Bei der Zucht wurden die Kokons mit Vorliebe an Blattresten angelegt.

(Schluß folgt.)

In der Welser Heide beobachtete Falter.

Von Hugo Skala, Haid bei Ansfelden.

(Fortsetzung.)

TORTRICIDAE.

Acalla Meyr.

an Ulmus häufig.
nastiana L. Die Räupchen Ende 7.
logiana Schiff. ab. *germarana* Froel. 3. 7. 1935 (best. Mitt.), ab. *erutana* H. S. 17. 6. 1935 e l. aus Viburnum lantana.
boscana F. ohne Datum.
schalleriana F. v. *comparana* Hb. 5. 7. 1935.
ferrugana Tr. 28. 9. 1935.
holmiana L. 26. 6. 1935 e l. aus *Chaenomeles japonica*.

Cacoecia Hb.

piceana L. die kotlosen Fleckminen 27. 3. 1936 hinter Nettingsdorf.
podana Sc. 21. 6. 1935.
rosana L. e l. 26. 6. aus Ligustrum vulgare, 4. 7. 1935 aus Rhamnus frangula.
sorbiana Hb. 16. 6. 1935 e. l. aus Quercus.
musculana Hb. 1. 7. 1935 (best. Mitt.).

Pandemis Hb.

corylana F. mehrfach im 7.
ribeana Hb. 24. 7. 1935 bei Pucking, ab. *cerasana* Hb. 1. 8. 1935.
heparana Schiff. 19. 6. 1935, ab. *vulpisana* H. S. (best. Mitt.) 7. 6. 1935.

Tortrix Meyr.

forskaleana L. 1 St. 18. 6. 1935 in Kremsdorf.
bergmanniana L. 28. 6. 1935.
conwayana F. mehrfach 6.—7.
viridana L. 1 St. 18. 6. 1935 in Kremsdorf.
rusticana Tr. 1. 7. 1935 (best. Mitt.).
diversana Hb. 27. 6. 1935 e l. aus Salix caprea (best. Mitt.).

Cnephasia Curt.

argentana Cl. 1. St. 17. 6. 1935.
chrysantheana Dp. die Minen besetzt am 29. 4. 1936 an Gartenerdbeeren.
wahlbomiana L. von Anf. 6. ab meist häufig, auch am Licht, die Raupe fand ich auch an Chrysanthemum indicum, Papaver rhoeas u. orientalis, Astrantia major u. Colchicum autumnale.
alticolana H. S. e l. 8. 6. 1935 aus Sanguisorba officinalis u. Anthyllis vulneraria.
virgaureana Tr. 12. 6. 1935 e l. aus Sedum maximum.
incertana Tr. e l. aus Plantago und and., v. *minorana* Tr. 1. 7. 1935 (best. Mitt.).

Conchylis Ld.

dubitana Hb. 18. 5. 1935.
pallidana Z. 1 St. 8. 6. 1935.
rupicola Curt. 21. 6. 1935 (best. Mitt.).
mussehliana Tr. 1 St. 8. 6. 1935 (best. Mitt.)
alcella Schulze 24. 5. 1935 ein Zwerg.
smeathmanniana F. 1 St. 11. 5. 1935.
ciliella Hb. 7. 7. 1935 (best. Mitt.).

Euxanthis Meyr.

hamana L. Im 6. häufig am Licht.
zoegana L. ebenso.

Hysterosia Stph.

inopiana Hw. 26. 6. u. 26. 7. 1935 am Licht.

Olethreutes Hb.

salicella L. 5. 7. 1935.
scriptana Hb. 1 St. 5. 7. 1935 (best. Mitt.).
variegana Hb. 12. 6. 1935.

©Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, Wien, download unter www.biologiezentrum.at

pruniana Hb. 21. 6. 1935 am Licht, auch später einzeln.
profundana F. 2 St. 1. 7., 1 St. 26. 7. 1935 am Licht.
arcuella Cl. Im 6. mehrfach.
striana Schiff. 10. 6. 1935.
micana Hb. 21. 6. 1935.
umbrosana Frr. 8. u. 18. 6. 1935.
urticana Hb. im Sommer nicht selten.
lacunana Dp. 5. 6. 1935.
cespitana Hb. 3. 7. 1935 (best. Mitt.).
achatana F. Ende 6.—7. mehrfach, auch am Licht.
ericetana Westw. 26. 6. 1935 an der Lampe.
antiquana Hb. ab 6. am Licht nicht selten.

Steganoptycha Stph.

nigromaculana Hw. 1 St. 17. 6. 1935.
oppressana Tr. ohne nähere Aufzeichnung.

Gypsonoma Meyr.

incarnana Hw. ab 7. 6. 1935 einigemale.
neglectana Dp. 5. 7. 1935.

Bactra Stph.

lanceolana Hb. 12. 6. 1935.

Semasia H. S.

hypericana Hb. 2 St. 8. 6. 1935.
aemulana Schlaeg. 1 St. 24. 7. 1935 am Licht (best. Mitt.).
incana Z. 2 St. 24. 5. 1935.
aspidiscana Hb. 1 St. 28. 6. 1935 am Licht.

Notocelia Meyr.

uddmanniana L. 20. 6. 1935.

Epiblema Hb.

graphana Tr. 1 St. 17. 6. 1935.
pusillana Peyr. 24. 5. 1935 (best. Mitt.).
tedella Cl. einzeln 30. 6. 1935 bei Kremsdorf.
proximana H. S. Die zusammengesponnenen minierten Tannennadeln aus der Tätigkeit des Vorjahres am 27. 3. 1936 hinter Nettingsdorf.
demarniana F. R. 11. 5. u. 12. 6. 1935.
ustulana Hb. einzeln im 7. 1935.
penkleriana F. R. 1 St. 30. 6. 1935 hinter Kremsdorf.
immundana F. R. e l. 7. 8. 1935.
similana Hb. 27. 6. 1935 am Licht.

Grapholitha Hein.

coronillana Z. je 1 St. 30. 6. u. 6. 7. 1935 bei Kremsdorf.

Pamene Hb.

splendidulana Gn. 1 St. 3. 7. 1935 (best. Mitt.).

Tmetocera Ld.

ocellana F. 28. 6. 1935 am Licht.

Carpocapsa Tr.

pomonella L. Ende 5. bis Ende 7. meist gemein.

Ancylis Hb.

diminutana Hw. 1 St. 9. 7. 1935.
mitterbacheriana Schiff. mehrfach im 8.

Dichrorampha Gn.

petiverella L. von 6. ab mehrfach bemerkt, auch noch 8. 1939.
alpinana Tr. 7. 7. 1935.
plumbagana Tr. 27. 7. 1935 am Licht (best. Mitt.).

Lipoptyche Ld.

saturnana Gn. 2 St. 3. 7. 1935 am Licht (best. Mitt.).
plumbana Sc. 1 St. 1. 7. 1935.

GLYPHIPTERYGIDAE.

Choreutis Hb.

myllerana F. 1 St. 26. 5. 1935.

Simaethis Leach.

pariana Cl. 1 St. 26. 6. 1936.
fabriciana L. 18. 7. 1935.

Glyphipteryx Hb.

thrasonella Sc. mehrfach ab 10. 6. 1935.
forsterella F. 1 St. 25. 5. 1935.
fischeriella Z. 1 St. 8. 6. 1935 (best. Mitt.).

(Schluß folgt.)

Eigentümer, Herausgeber u. Verleger: Wiener Entomologen-Verein in Wien. — Verantw. Schriftwalter: Hans Reisser, Wien, 1, Rathausstraße 11. — Druck: Julius Lichtner, Wien, 8./65, Strozzigasse 41.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift des Wiener Entomologen-Vereins

Jahr/Year:

Band/Volume: 25

Autor(en)/Author(s): Skala Hugo Otto Victor

Artikel/Article: In der Welser Heide beobachtete Falter. Fortsetzung. 179-180