

Verzeichnis der Schildlaus-Gattungen, 1. Nachtrag. (Homoptera Coccoidea.)

Von L. Lindinger, Hamburg.

(Schluß.)

Pseudoonidia Ckll. — *P. tricuspidata* Ldgr. 1939; Hamburg, bot. Garten, Dillenia indica.

Pseudaulacaspis MacGill. — *P. pentagona* (Targ.) MacGill. Ascona am Lago Maggiore, Ribes vulgaris (18. 2. 1920).

Pseudococcus Westw. — *P. citri* (Risso) Ckll. Hamburg, bot. Garten, Dasylium wheeleri (!! 4. 8. 1942). — *Ps. magnoliae* Hambleton 1935 = *Ceroputo magnoliae* (Hambl.).

Pseudodiaspis Ckll. — *P. bivalvata* (Goux 1937 als *Rhizaspidiotus*); Frankreich, Festuca ovina. — *P. canariensis* Ldgr. (syn. *Thymaspis fusca* Sulc 1934).

Pulvinaria Targ. — *P. aurantii* Ckll. muß in *P. aurantium* geändert werden, denn Citrus aurantium, nach der das Tier benannt ist, bedeutet Citrus (pomorum) aurantium (vgl. Ent. Anz. Wien 14, 1934, 62); das Wort aurantium ist also bereits der Wesfall der Mehrzahl von aurans. — *P. myrtilli* (Kalt.) = *Phyllostroma myrtilli* (Kalt.). — Unzulässig sind folgende Benennungen: *P. acericola* Shinji 1935 wegen *P. acericola* (Walsh et Ril, 1868) Ckll. 1896. *P. euonymi* Shinji 1935 wegen *P. euonymi* Goureaux 1869 (= *P. betulae*), *P. ornata* Frogg. 1921 wegen *P. ornata* Hemp. 1912 und *P. subterranea* Bodh. 1935 (nom. nud.) wegen *P. subterranea* Newst. 1917. — *P. betulae* (L.) Sign. Spanien: Puigcerda, Populus tremula (F. Diehl, Mai 1930), Würststadt, Vitis vinifera (Glaser, 1873). Budesheim bei Bingen, Vitis vinifera (Glaser, 1877). — *P. cestri* (Bché.) Sign. Frankfurt a. M., Palmengarten, Kamelia thea (A. Andres, 16. 5. 1919).

Pygidiaspis MacGill. 1921. — Leitart *P. cedri* (Green 1915 als *Aspidiotus*).

Pyrogymnaspis indica Ayyar 1919 ist Druck- oder Schreibfehler für *Porogymnaspis indica* „Green MS.“ Ayyar 1919 = *Aonidia loranthi* Green 1896.

Quercetococcus Ldgr. — Leitart *Q. pulvinatus* (Planch.) Ldgr., nicht *Quercetococcus*. — *Q. kuwanai* Ldgr. nom. nov. (für *Nidularia iaponica* Kuw. 1918; ungültig wegen *Eriococcus iaponicus* Kuw. 1902 = *Nidularia iaponica* [Kuw.] Ldgr. 1933).

Quernaspis Ferr. 1937 = *Fundaspis* MacGill. 1921.

Radiaspis Ferr. 1937. — Leitart *R. indica* (Marlatt 1908 als *Leucaspis*).

Rhizaspidiotus bivalvatus Goux 1937 = *Pseudodiaspis bivalvata*.

Ripersia Sign. — *R. parkeri* Balachw. 1936; südl. Frankreich. — *R. rehi* Ldgr. nom. nov. (syn. *R. oryzae* Green 1931 nec Kuw. 1907).

Rugaspidiotus MacGill. 1921. — Leitart *R. arizonicus* (Ckll. 1900 als *Diaspis*; syn. *Rugaspidis arizonica* MacGill. 1921).

Sclopetaspis MacGill. 1921. — Leitart *S. lanigera* (Newst. 1920 als *Chionaspis*).

Scythia Kir. 1938. — Leitart *S. cranium-equinum* Kir. 1938; Krim, Ukraine, Festuca ovina und Stipa.

Selenaspidus Ckll. — *S. euphorbiae* (Newst. 1912 als *Aspidiotus*) Schouteden 1914. — *S. euryae* (Takah. 1931 als *Aspidiotus*); Formosa, Eurya sp. — *S. ferox* Ldgr. (syn. *Pseudoonidia ferox perspinosa* Leon. 1914, *S. spinosus* Laing 1929). — *S. grigua* (Brain 1918 als *Aspidiotus*; syn. *Entaspidiotus grigus* MacGill.); grigua ist wohl Eigennamen. — *S. schultzei* (Newst. 1918 als *Aspidiotus*) Schouteden 1914 (syn. *Entaspidiotus schultzei* MacGill.).

Spinococcus marrubii Kir. 1931? = *Nidularia marrubii* (Kir.).

Stramenaspis Ferr. 1937. — Leitart *S. kelloggi* (Colem. 1903 als *Leucaspis*).

Synacanthococcus Morr. 1920, nicht *Synanthococcus*. Leitart *S. bispinosus* Morr. 1920.

Talla Heyden 1860. — *T. kuwanai* (Kanda 1932 als *Kermes kuwanae*); Japan. *Quercus myrsinifolia*. — *T. quercus* (L.) Heyden, Herzberg, Südharz (Schäffer, Juli 1899). Steinau, Kr. Schlüchtern, zu Hunderten am Stamm einer alten, absterbenden Eiche unterhalb des Basaltsäulenbruches auf dem Ohl (!! Juni 1906). Aus Amerika wird von der Art behauptet: „reported from nearly all parts of the United States“ (Doane, van Dyke, Chamberlin and Burke, Forest insects. New York and London 1936, 383); mir ist keine einzige Angabe von dorthier zu Gesicht gekommen. — *T. roboris* (Geoff.) Ldgr. Dämmkrug bei Königsberg in Ostpreußen, *Quercus* sp. (G. Künow, Juli 1873). Portugal: Cova da Piedade, *Ulmus glabra* (Seabra 1920). — *T. tropicalis* (Takah. 1936 als *Kermes*); Formosa, *Quercus* sp.

Targionia regnieri Rungs 1933 = *Aspidiotus mairei* Balachw. 1928 (teste Rungs 1935).

Tenuiaspis MacGill. 1921. — Leitart *T. minuta* (Green 1896 als *Chionaspis*).

Thymaspis Šulc 1934 = *Pseudodiaspis* Ckll. *Th. fusca* Šulc 1934 = *Pseudodiaspis canariensis* Ldgr.

Triaspidis MacGill. 1921. — Leitart *T. bicornis* (Green et Lidg. 1900 als *Mytilaspis*; syn. *Lepidosaphes bicornis* var. *alba* Laing 1929).

Tylococcus Newst. — *T. cocoes* (Mask. 1890 als *Dactylopius cocotis*). Der Wessfall von *Cocos* lautet *cocoes*, nicht *cocotis*, auch nicht *cocois*.

Unaspis MacGill. 1921 (syn. *Dinaspis* Malen. 1916 nec Leon. 1911; *Graphaspis* und *Prontaspis* MacGill. 1921). — Leitart *U. acuminata* (Green 1896 als *Chionaspis*). — *U. citri* (Comst. 1883 als *Chionaspis*) Ferr. 1937 (syn. *Chionaspis ficus* Comst. 1883, *Howardia citri* Berl. et Leon. 1896, *Chionaspis permutans* „Green“ How. et Ashm. 1896, Green 1899, *Inschionaspis citri* Herrera 1901, *Dinaspis annae* und *D. permutans* Malen. 1916, *Graphaspis permutans* und *Prontaspis citri* MacGill. 1921, *Chionaspis annae* Rev. appl. ent. A 16, 1928, 445, *Trichomytilus permutans* Ldgr. 1933, *Polyaspis permutans* Ldgr. 1934). — *U. euonymi* (Comst. 1881 als *Chionaspis*) Ferr. 1936 (syn. *Chionaspis nemausensis* „Licht.“ Sign. 1886, *Mytilaspis euonymi* Targ. 1888, *Chrysomphalus evonymi* Matouschek 1930). — *U. nakayamai* Takah. et Kanda 1939.

Velataspis Ferr. = *Mytilococcus* Amerl.

Websteriella Leon. (1899) 1900 = *Apterionidia* Berl. 1896.

Nachtrag während der Drucklegung :

Eine im Druck befindliche Darlegung im *Bombus*-Hamburg bringt die Nachweise für folgende Änderungen:

Dactylopius Costa 1829. — Leitart *D. coccus* Costa 1829 = *D. mexicanus* (Lam.) comb. nov. (syn. *Coccus mexicanus* Lam. 1801).

Diaspis Costa 1829. — Leitart *D. calyptroides* Costa 1829 (syn. *Aspidiotus echinocacti* Bouché 1833).

Ripersia Sign. 1875 = *Tychea* Koch 1857. — *R. parkeri* Balachw. 1936 = *Tychea parkeri*. — *R. rehi* Ldgr. = *Tychea rehi* comb. nov.

Tychea Koch 1857. — Leitart *T. graminis* Koch 1857 = *T. phalaridis* (L.) comb. nov. (syn. *Coccus phalaridis* L. 1758). Lindinger.

Anschrift des Verfassers: Hamburg 39, Alsterdorferstraße 191/II, derzeit: Schärding a. Inn, postlagernd.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1943

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Lindinger Leonhard

Artikel/Article: [Verzeichnis der Schildlaus-Gattungen, 1. Nachtrag. \(Homoptera Coccoidea.\). Schluß. 264-265](#)