

VII. Ios (Jos, Nios).

Insel im mittleren Südteil der Kykladengruppe. Lokali-
täten: Jos.

1. *Maniola jurtina hispulla* Hb.

Zwei gefl. ♀♀, Jos, 11. 9., hievon eines mit symmetrischen
Eidechsenbissen an allen Flügeln.

Siehe Kythera!

2. *Carcharodus alceae australis* Z.

Ein sehr kleines (Vfl. 9 mm, Exp. 17 mm) ♂, Jos, 11. 9.,
wohl zu einer dritten Generation gehörig.

Siehe Kythera!

3. *Scopula ochroleucata* HS.

1 ♂, Jos, 10. 9.

Siehe Keos!

4. *Scopula luridata coenosaria* Led.

Zwei ♂♂ abends am Licht, Jos, 10. 9.

Siehe Keos!

5. *Rhodometra sacraria* L.

Ein zur f. *atrifasciaria* Fuchs gehöriges ♂, Jos, 11. 9.

Siehe Kythera!

VIII. Thera (Thira, Santorin).

Vulkanische Insel im Süden der Kykladengruppe. Lokali-
täten: Messariá (Mess.). — Pyrgos (Pirgos), Ort im Südteil
der Insel (Pyrg.).

1. *Utetheisa pulchella* Hb.

1 ♀, Pyrg., 12. 9.; 1 ♂♀, Mess., 13. 9.

Griechenland 1, p. 110. — Inseln: Rhodos 20, p. 234; Karpathos 17,
p. 31. — Kreta 6, p. 141. — Cypern 19, p. 542.

Anschrift des Verfassers: Wien, I., Rathausstraße 11.

Großschmetterlinge aus Mähren und Schlesien.

Von Hugo Skala, Haid.

Seit 35 Jahren arbeite ich an einer Neuauflage der Schmet-
terlingsfauna dieses Gebietes. Nun, da die Handschrift so gut
wie vollendet ist, ist die Möglichkeit der Drucklegung vernichtet.

Einen kleinen Teil mir bemerkenswert erscheinender An-
gaben will ich dem drohenden Vergessen entreißen und hier ver-
öffentlichen, vorerst die Großfalter.

Ueber minierende Arten, auch anderer Ordnungen, ver-
öffentliche ich zusammen mit dem leider seither verstorbenen
Direktor Hynek Zavřel aus Drewostitz eine Abhandlung in den
Entomologické listy in Brünn, die im Herbst 1945 daselbst er-
schienen sein soll. Ich sah weder sie noch Sonderabdrücke.

Allen Helfern, von denen einige dem Krieg zum Opfer ge-
fallen sind, andere, wie es scheint, inzwischen gleichfalls ver-
storben sind, danke ich auch an dieser Stelle herzlichst.

Von Abkürzungen bedeutet Buk. Dr. Michael Graf von Bukowyk, Wink. Winkelmann.

Artenliste.

- Papilio podalirius* L. ab. *lugens* Sch. und *conglomeratus* Now., beide Mähr. Trübau (Jenisch).
- Parnassius mnemosyne* L. ab. *arcuata* Hschke Blauda (Kammel), die ab. *melaina* Honr., *maculata* Bryk, *siegeli* Gönn., *umbratilis* Fruhst., alle von Mähr. Schönberg (Kolb).
- Aporia crataegi* L. ab. *flava* Tutt und *lunulata* Tutt von Mähr. Schönberg (Kolb).
- Pieris brassicae* L. ab. *fasciata* Kief., M. Schönberg (Kolb), *marginata* Tutt, Kornitz (Jenisch).
- Euchloë cardamines* L. ab. *alberti* Hoffm., Znaim (Wink.).
- Colias myrmidone* Esp. ab. *agnes* Pieszcz., Jägerndorf (Wolf).
- Limenitis sibilla* L. ab. *obliterata* S., Mähr. Trübau (Jenisch).
- Pyrameis atalanta* L. ab. *martha* Stef., Mähr. Schönberg (Kolb).
- Araschnia levana* L. ab. *zavřeli* Ruž., Trebitsch (Ružicka, bei Wärmeversuchen).
- Melitaea athalia* Rott. ab. *leucippe* Schneid., Altvatergebirge (Kolb), *obsoleta* Tutt, Znaim (Wink.).
- Argynnis selene* Schiff. ab. *selenis* Frr., Wall. Meseritsch (Buk.), *gerda* Schultz, Teschen (Stuglik).
- Argynnis aglaja* L. ab. *emilia* Qu., Znaim (Wink.), *eridioides* Pflüm, Mähr. Schönberg (Kolb).
- Argynnis niobe* L. ab. *pelopia* Bkh., Altvatergebirge (Kolb).
- Melanargia galathea* L. ab. *amarginata* Metzg., Schönthal (Heinrich).
- Erebia epiphron* Kn. ab. *ornatissima* Horm., Altvatergebirge (Kolb).
- Er. euryale* Esp. ab. *isarica* Rhl. und *philomela* Esp., desgl.
- Coenonympha pamphilus* L. ab. *multipuncta* Schultz, Wall. Meseritsch (Buk.).
- Lycaena idas* L. Von mir seinerzeit als *aegusella* Ver. angeführt, Nikolsburg (Skala, 1904), Fulnek 1 ♂, Waltersdorfer Wald, 4. 6. 1911, 1 ♀, 25. 6. 1911, Jogs Busch (Skala, Museum, Linz).
- Lyc. amandus* Schn. ab. *caeca* Gillm., Mähr. Schönberg (Kolb).
- Lyc. semiargus* Rott. ab. *caeca* Courv., Brünn (Gregor).
- Protoparce convolvuli* L. ab. *virgata* Tutt und *obscura* Tutt, Mähr. Schönberg (Kolb).
- Deilephila euphorbiae* L. ab. *cuspidata* Rbl., Deutsch Liebau (Kammel e. l.).
- Choerocampa elpenor* L. ab. *obsoleta* Tutt, Mähr. Schönberg (Kolb).
- Metopsilus porcellus* L. ab. *suffusa* Tutt, desgl.
- Pygaera anastomosis* L. ab. *tristis* Stgr., Znaim (Wink.).
- Orgyia antiqua* L. ab. *dilutior* Schultz und *infernalis* Rbl., Mähr. Schönberg (Kolb).
- Dasychira fascelina* L. ab. *laricis* Schille, Wall. Meseritsch (Buk.).
- Gastropacha quercifolia* L. ab. *obscura* Tutt, Znaim (Wink.).
- Dendrolimus pini* L. ab. *grisescens* Rbl. und *fischeri* Kraml., Freiheitsau (Buk.).
- Saturnia pavonia* L. ab. *lutescens* Schultz, Znaim (Wink.).
- Aglia tau* L. ab. *ferenigra* Th. M., Mähr. Schönberg (Kolb).
- Acronycta leporina* L. ab. *bimacula* Maass., desgl.
- Acr. strigosa* F. ab. *bryophiloides* Horm., Teschen-Dziegielau (Stuglik).
- Agrotis xanthographa* F. ab. *nigra* Tutt, Teschen (Stuglik).
- Agr. primulae* Esp. ab. *congener* Hb. und *grisea* Tutt, Altvater (Kolb).
- Agr. cinerea* Hb. ab. *livonica* Teich, Teschen (Stuglik).
- Agr. tritici* L. ab. *ocellina* Sph. und *nigra* Tutt, desgl.
- Pachnobia leucographa* Hb. ab. *suffusa* Tutt, desgl.
- Mamestra brassicae* L. ab. *albidilinea* Hw., Mähr. Schönberg (Kolb), Znaim (Wink.).
- Mam. trifolii* Rott. ab. *saucia* Esp., Mähr. Schönberg (Kolb).
- Mam. serena* F. ab. *leuconota* Ev., desgl.

- Dianthoecia irregularis* Hfn. Gregor fing 1 ♀, 22. 7. 1942, in der mährischen Sahara südlich Bisenz, ein weiteres Stück bei Tschetsch. Die Art ist neu für das Land.
- Apamea testacea* Tr. ab. *x-notata* Hw., Mähr. Schönberg (Kolb).
Hadena adusta Esp. ab. *duplex* Hw., Teschen am Tul (Stuglik).
Had. rurea F. ab. *nigrorubidata* Tutt, Mähr. Trübau (Jenisch).
Hadena scolopacina Esp. ab. *unicolor-nigra* Wgnr., Teschen (Stuglik).
Had. basilinea F. ab. *unicolor* Tutt, Mähr. Schönberg (Kolb).
Hydroecia nictitans Bkh. ab. *auricula* Don., desgl.
Amphipyra tragopogonis L. ab. *nigrescens* Spul., desgl.
Taenioctampa populi F. ab. *atropunctata* Geest. und *atropurpurea* Geest., ebenso.
- Orrhodia vaccinii* L. ab. *obscura* Tutt, Kremsier (Buk.).
Calocampa vetusta Hb. ab. *brunnea* Tutt, Mähr. Schönberg (Kolb).
Plusia chrysitis L. ab. *disjuncta* Schultz, Wall. Meseritsch (Buk.).
Plusia gamma L. ab. *hoedur*, benenne ich Stücke, deren Gammazeichen dem Grunde gleichfarbig und ohne Metallganz ist. 1 St. von Brünn (Satory).
- Euclidia glyphica* Cl. ab. *obsoleta* Strand, Wall. Meseritsch (Buk.).
Catocala nupta L. ab. *flava* Schultz, Mähr. Schönberg (Kolb).
Brephos parthenias L. ab. *obscura*, benenne Kolb bei Mähr. Schönberg gefundene Falter mit einfarbig verdunkelten Vorderflügeln.
Geometra papilionaria L. ab. *alba* Gillm., Mähr. Trübau (Jenisch).
Codonia pendularia Cl. ab. *brunnearia* Lamb., Mähr. Schönberg (Kolb).
Cod. annulata Schultze ab. *obsoleta* R., Chropin (Buk.).
Cheimatobia brumata L. ab. *hyemata* Huene, Znaim (Wink.).
Lygris reticulata F. ab. *ovulata* Borgm., Mähr. Schönberg (Kolb).
Larentia ocellata L. ab. *coarctata* Prout, *truncata* Hfn. ab. *centumnotata* Schultze und *fluctuata* L. ab. *ochreatea* Prout, alle 3 von Mähr. Schönberg (Kolb).
- Lar. montanata* Schiff. ab. *continuata* Krul., Wall. Meseritsch (Buk.).
Lar. suffumata Hb. ab. *piceata* Sph., Teschen (Stuglik).
Lar. affinitata Sph. ab. *jenischi* Schneid., Winkelsdorf (Jenisch).
Lar. autumnalis Ström. ab. *impluviaria* H. S., Teschen (Stuglik), ab. *obsoletaria* Schille, bei Trebitsch (Stehlik).
Lar. silaceata Hb. ab. *umbrosaria* Motsch., Teschen (Stuglik).
Lar. corylata Thnbg. ab. *ruptata* Hb., Wall. Meseritsch (Buk.).
Tephroclystia subfulvata Hw. ab. *oxydata* Tr., Teschen (Stuglik).
Abrazas marginata L. ab. *subdeleta* Ckl., Kremsier (Buk.).
Bapta bimaculata F. ab. *brunneimargo* Prout, Wall. Meseritsch (Buk.).
Stegania dilectaria Hb., Brünn (Gregor, 1 ♂, 1944).
Deilinia exanthemata Sc. ab. *arenosaria* Hw., *Selenia bilunaria* Esp. ab. *infuscata* Strand und *Himera pennaria* L. ab. *castanearia* Lamb., alle 3 von Mähr. Schönberg (Kolb).
Cautoloma flavicaria Hb., Auspitz (Gregor 1 ♂). Der nördlichste Fundort.
Venilia macularia L. ab. *albicans* Obth., Wall. Meseritsch (Buk.).
Amphidasis betularius L. ab. *carbonaria* Jord., Teschen (Stuglik), ab. *insularis* Th. M., Znaim (Wink.).
Boarmia consonaria Hb. ab. *nigra* Bankes, Teschen (Stuglik).
Boarm. punctularia Hb. ab. *obscuraria* Paux., Mähr. Schönberg (Kolb).
Bupalus piniarius L. ab. *fuscantaria* Krul., bei Studnitz (Stehlik).
Perconia strigillaria Hb., Hombok (Adámek, 1937).
Sarrothrips revayana Sc. ab. *ramosana* Hb., Mähr. Trübau (Jenisch).
Spilosoma lubricipedium L. ab. *fasciata* Tgwll., Mähr. Schönberg (Kolb).
Parasemia plantaginis L. ab. *bicolor* Rätz, Radhost (Buk.).
Hipocrita jacobaeae L. ab. *totonigra* P., Konitz (Jenisch).
Endrosa roscida Schiff., Nebowied (Povolný und Gregor).
Zygaena punctum O. ab. *cingulata* Burg., Kesselberg bei Klentnitz (Holik).
Ino chloros Hb., Nebowied (Povolný und Gregor).
Ino geryon Hb., Plumenau (Adámek).

Anschrift des Verfassers: Haid, Post Ansfelden bei Traun, O.-Oe.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1946

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): Skala Hugo Otto Victor

Artikel/Article: [Großschmetterlinge aus Mähren und Schlesien. 59-61](#)