

den Außenrand rot gefärbt hat, die vorhin erwähnte Art *Pholus fasciatus* Sulz. verkörpert ist. — Es sei im Folgenden noch die exakte Beschreibung aus dem Amerikaband des Seitzwerkes (Textband Spinner und Schwärmer, p. 884) zitiert, um den Vergleich deutlicher zu machen:

Pholus vitis L. „Diese wohlbekannte, schöne Art mit der hellen, von zwei Querbändern geteilten Längsbinde der Vorderflügel und den nur am Innenrand rosa gefärbten Hinterflügeln ist ...“ etc.

Pholus fasciatus Sulz.: „Sehr ähnlich der vorigen Art, aber sofort zu unterscheiden durch die auch am Außenrand karminrosa gefärbten Hinterflügel. Auf den Vorderflügeln ist das Antemedianband rudimentär, der Diskalfleck einfach, nicht geteilt. Auf den Hinterflügeln fehlt das schwarze Mittelband, dafür ist ein breites Subterminalband vorhanden.“

Hinzuzufügen ist allerdings, daß das Bild von *Pholus vitis* Linné im Tafelband der Amerikanischen Fauna (Tafel 98D, oben) geradezu schauerlich dunkel geraten und der Hinweis im Textband bei der Nominalform auf diese Abbildung absolut nicht zutreffend ist. Wo bleibt da die (vgl. l. c.!) „wohlbekannte, schöne Art mit der hellen, von zwei Querbändern geteilten Längsbinde der Vorderflügel ...“? Es ist von der Längsbinde nicht mehr viel zu sehen, noch weniger von der in Wirklichkeit sehr deutlichen Querteilung durch die erwähnten Binden. Es könnte sich der Abbildung nach höchstens um die stark braun übergossene f. *fuscatus* R. & J., niemals aber um die Nominalform *Pholus vitis vitis* Linné handeln; eine Feststellung, zu der sich der Autor angesichts des schon hinreichend großen Nomenklaturdickichts in dieser Gruppe verpflichtet fühlt.

Der wahre nomenklatorische Sachverhalt läßt sich somit in Kürze folgendermaßen darstellen: *Pholus vitis* Linné (nec Drury, nec *hornbeckiana* Harris et *linnei* Grote & Robinson etc.), ferner *Pholus fasciatus* Sulz. (nec *vitis* Drury etc.).

Anschrift des Verfassers: Wien-Mödling, Schubertgasse 13.

Kleiner Beitrag zur Lepidopterenfauna von Herzogenburg und Umgebung.

Von Leo Schwingenschuß, Wien.

(Fortsetzung.)

5. Fam. *Lycaenidae*.

- | | | |
|------|-------|---|
| 51. | (94) | <i>Thecla spini</i> Schiff. Th. 6. 7., F. 9. 7., A. 15. 7. (Ossarn 18. 7., Zone 5). |
| †52. | (97) | <i>Thecla acaciae</i> F. Th. 6. 7., F. 10. 7., meist schon abgefliegen. |
| 53. | (99) | <i>Callophrys rubi</i> L. G. K. 29. 5. |
| 54. | (101) | <i>Zephyrus betulae</i> L. Th. 6., 9. 8., G. K. 15. 8., F. 20. 8. |
| 55. | (107) | <i>Chrysophanus phlaeas</i> L. A. 15. 7., Th. 6. 8. |
| 56. | (108) | <i>Chrysophanus dorilis</i> Hufn. G. K. 29. 5., A. 30. 5. |
| 57. | (112) | <i>Lycaena argiades</i> Pall. F. 10. 7., G. K. 11. u. 14. 7., A. 28. 7., Th. 20. u. 23. 7., 20. 8., immer nur einzeln und meist schlecht. |

58. (114) *Lycaena argus* L. Th. 6. 7., F. 10. 7., G. K. 27. 7., 3. 8., F. 30. 7., merkwürdigerweise sehr einzeln.
- †59. (115 bis) *Lycaena idas* L., ssp. *acreon* F. G. K. 29. 5., F. 30. 7., G. K. 3. 8., H. 4. 8., Th. 6. u. 20. 8., B. D. 5. 8., A. 4. 8.
- †60. (119) *Lycaena astrarche* Bgstr. A. 30. 5., Ederding 29. 7., Th. 1. 8., 16. 8., G. K. 3. 8., H. K. 6. 8., H. 4. 8., A. 4. 8.
- †61. (120) *Lycaena eumedon* Esp. Auf dem Wege zum H. K. auf einer Wiese an Geranium am 5., 6. u. 14. 7. War merkwürdigerweise nur dort zu finden, obwohl die Futterpflanze an der Straße zum G. K., am B. D. und bei Walpersdorf im unteren Ortsteil und bei Inzersdorf unten in den Gärten zahlreich steht, vielleicht weil die Flugzeit schon zu Ende ging. Auch die Form *Speyeri* Husz. fand sich.
62. (121) *Lycaena icarus* Rott. A. 29. 5., Th. 30. 5., 6. 7., A. 8. 7., A. 9. 8., Th. 20. 8., wohl überall.
- †63. (121 bis) *Lycaena thesites* Chapm. A. 24. 7., 4. 8., B. D. 29. 7., 3. 8., F. 31. 7., Th. 1., 6., 20. 8.
64. (123) *Lycaena hylas* Esp. Th. 16. u. 20. 8. War erst wieder im Kommen.
65. (124) *Lycaena meleager* Esp. Th. 6. 7., 9. 7., 16. 7., F. 10. u. 30. 7., G. K. 11. u. 21. 7. Diese schöne Art war keineswegs selten.
66. (125) *Lycaena bellargus* Rott. A. 30. 5., H. 15. 8., Th. 16. u. 20. 8. Die zweite Generation erschien erstmalig am 15. 8. und wäre später bestimmt zahlreich zu finden gewesen.
67. (126) *Lycaena corydon* Poda. Im ganzen Gebiet von der Wasserburgerhöhe (Zone 5) bis Nußdorf überall, so z. B. G. K. 11., 14., 27. 7., A. 12. 7., 3. 8., Th. 20., 23. 7., 6., 16., 20. 8. usw.
- †68. (127) *Lycaena damon* Schiff. Nur auf den Bergen, aber an den Fundstellen zahlreich: Th. 6., 9., 16. u. 20. 7., 1. u. 6. 8., G. K. 11. u. 14. 7., 3. 8.
69. (129) *Lycaena minima* Fuessl. G. K. 29. 5., 6. 7.
70. (131) *Lycaena cyllarus* Rott. G. K. 29. 5., Th. 30. 5.
- †71. (132) *Lycaena alcon* F. G. K. 31. 7., Th. 6., 16. u. 20. 8., Sp. 13. 8. Ziemlich verbreitet, aber einzeln.
72. (133) *Lycaena euphemus* Hb. F. 10. u. 30. 7., Ederding 9. 8.
73. (134) *Lycaena arion* L. Th. 23. 7.
74. (136) *Lycaena arcas* Rott. A. 21. 7., 30. 7. u. später einzeln. Ederding 9. 8.
75. (136) *Lycaena argiolus* L. Th. 9. u. 16. 7., A. 2., 15., 18., 26. 7., F. 10. 7. Auch die Form *aquilina* Gr. Manche Weibchen waren ungewöhnlich groß.

6. Fam. *Hesperiidae*.

- †76. (137) *Heteropterus morpheus* Pall. Überall von der Wasserburgerhöhe (Zone 5) durch die Au bis zur Th. u. G. K., dort auch gerne auf Luzernerklée. G. K. 11., 14., 27. 7., 3. 8., Th. 16. u. 20. 7., 1. 8., A. 15. u. 21. 7. Zwei Männchen mit gelben Flecken in der Mitte der Hinterflügel: *nova forma maculata*.
77. (138) *Pamphila palaemon* Pall. G. K. 29. 5., A. 30. 5.
78. (139) *Adopaea lineola* O. G. K. 5., 14. 7., Th. 6., 16. 7., B. D. 13. 7., A. 15. 7. Besonders am 10. 7. nach Regen auf der Straße Maria Elend—Theyern—Nußdorf a. d. Traisen stellenweise in Massen.
79. (142) *Augiades comma* L. G. K. 26. 7., 3. 8., A. 6. 8., Th. 16., 20. 8. usw.
80. (143) *Augiades silvanus* Esp. G. K. 5., 14., 22. 7., Th. 6., 16., 20. 7., A. 15. u. 24. 7., Ederding 29. 7.
- †81. (145) *Carcharodus alceae* Esp. Raupen B. D. 13. 7. an der Straße nach Traismauer, auch Nußdorf a. d. Traisen. Falter G. K. 26. 7., B. D. 29. 7., e. 1., 3. u. 4. 8.
- †82. (148) *Hesperia sao* Hb. G. K. 29. 5., Th. 6., 16. 8.
84. (154) *Hesperia malvae* L. Th. 30. 5.
- †83. (150) *Hesperia alveus* Hb. G. K. 29. 5.
85. (155) *Thanaos tages* L. G. K. 29. 5., A. 30. 5., 25. 7., 17. 8., Ederding 29. 7., B. D. 29. 7., Th. 16. 8. u. a.

7. Fam. *Sphingidae*.

86. (156) *Acherontia atropos* L. } Kommen nach Angabe von zwei pens.
 87. (157) *Herse convolvuli* L. } Schuldirektoren vor.
 88. (158) *Sphinx ligustri* L. An Pflöcken im Ort 13. 7., A. 26. u. 28. 7. Falter
 und Raupen an Liguster.
 89. (164) *Haemorrhagia tityus* L. A. 30. 5., G. K. 3. 8.
 90. (168) *Macroglossum stellatarum* L. G. K. 14. 7., am Licht 17. 8. Raupe
 H. 15. 8., e. 1., 5. 9.
 91. (174) *Pergesa porcellus* L. Th. 6. 7.

8. Fam. *Notodontidae*.

92. (179) *Dicranura vinula* L. Mehrere Raupen Ederding 18. 7. an kleinen
 Zitterpappeln.
 93. (199) *Pterostoma palpinum* L. Raupe Th. 20. 8., G. K. 21. 8. von Eichen
 geklopft.
 94. (201) *Phalera bucephala* L. Raupe H. 15. 8., Th. 20. 8., G. K. 21. 8. ge-
 klopft.
 95. (206) *Pygaera pigra* Hufn. Raupe 20. 7. bei Nußdorf a. d. Traisen, e. 1. 8.

10. Fam. *Lymantriidae*.

96. (208) *Hypogymna morio* L. G. K. 29. 5., A. 9., 18. 7., klein, wohl zweite
 Generation.
 97. (210) *Orgyia antiqua* L. Raupe A. 15., 17. 8., e. 1. 8. 9.
 98. (214) *Dasychira pudibunda* L. Raupe A. 17. 8., e. 1. 28. 1. 52 in der Form
concolor Stgr.
 99. (216) *Porthesia similis* Fuessl. Falter A. 8. 8. aufgescheucht.
 100. (219) *Lymantria dispar* L. Raupe Walpersdorf 30. 5., Götweig Kreuz-
 weg (in Verpuppung), Falter 14. 8. Walpersdorf, 28. 8. im Haus
 Licht.
 101. (230) *Lasiocampa quercus* L. Raupe Th. 30. 5., e. 1. 3. 8., Falter Th. 20. 7.
 ein frisches Männchen.
 102. (231) *Lasiocampa trifolii* Esp. A. 8. 8. ein totes Weibchen unter einem
 Lichtmast.
 103. (232) *Macrothylacia rubi* L. Th. 10. 7. ein Weibchen, Raupe mehrfach
 August, so Th. 16. 8.
 104. (237) *Gastropacha quercifolia* L. Nach Angabe der Schuldirektion.

14. Fam. *Saturniidae*.

- †105. (244) *Saturnia pyri* Schiff. Nach Angabe der Schuldirektion manchmal
 nicht selten. Raupe Inzersdorf a. d. Traisen 16. 8. in Verpuppung.
 106. (246) *Saturnia pavonia* L. Th. 6. 8. eine erwachsene Raupe.

15. Fam. *Drepanidae*.

107. (253) *Cilix glaucatus* L. Maria Ellend 30. 7. (F.).

16. Fam. *Thyrididae*.

108. (254) *Thyris fenestrella* Sc. A. 26. 7.

17. Fam. *Noctuidae*.

109. (259) *Acronycta aceris* L. Raupe im Stiftsgarten 15. 7. sich verpuppend.
 110. (263) *Acronycta tridens* Schiff. A. 8. 8., Th. 16. 8.
 111. (264) *Acronycta psi* L. A. 15. 7.
 112. (267) *Acronycta auricoma* F. A. 12. 7., G. K. 26. 7.
 113. (269) *Acronycta rumicis* L. G. K. 11. 7., Th. 16. 7., 22. 7. Auf der Straße
 zum G. K. war am 26. 7. u. 3. 8. auf den weiß angestrichenen
 Bäumen die Form *salicis* Curtis vorherrschend, allerdings sahen
 die Tiere auf der weißen Unterlage noch schwärzer aus.
 114. (283) *Agrotis pronuba* L. Th. 20. 7., A. 14., 17. 8. aus dünnen Zweigen
 geklopft, auch in der Wohnung.
 *115. (285) *Agrotis comes* Hb. A. 20. 7., geklopft.
 116. (290) *Agrotis baja* F. A. 20. 7., geklopft.
 117. (294) *Agrotis c-nigrum* L. A. 27. 7., geklopft.

118. (297) *Agrotis xanthographa* Schiff. A. 17. 8., geklopft.
- †119. (308) *Agrotis cuprea* Hb. Th. 20. 8. Mehrere Exemplare im Schlag vormittags auf Centaureenblüten.
120. (310) *Agrotis plecta* L. A. 17. 8.
- †121. (313) *Agrotis candelisequa* Hb. Th. 30. 5. zwei Raupen gekratzt, waren leider gestochen.
122. (331) *Agrotis nigricans* L. Mit den vorigen Th. 30. 5., e. l. 3. 8.
123. (332) *Agrotis aquilina* Hb. Th. 6. 8. auf Blüten sitzend.
124. (334) *Agrotis obelisca* Hb. Th. 16. 8. ein Vorderflügel. Das Tier wurde offenbar von einer Fledermaus gefressen.
125. (338) *Agrotis segetum* Schiff. Am Licht 12. 8.
126. (349) *Epineuronia cespitis* E. Am 11. 8. Sch. eine Puppe gekratzt. Ein verkümmertes Weibchen schlüpfte anfangs September.
127. (355) *Mamestra brassicae* L. G. K. 6. 7., Licht 18. 8.
128. (361) *Mamestra dissimilis* Knoch. A. 26. 7., 17. 8. aus dünnen Zweigen geklopft.
- †129. (365) *Mamestra leineri* Frr. Am Fuße des Sch. bei Statzendorf am 8. u. 11. 8. die Raupen unter *Artemisia campestris*.
- †130. (372) *Mamestra chrysozona* Bkh. G. K. 11. 7. Im Ort 12., 14. 7., A. 15. 7. Die Raupen an der neu angelegten Straße zum Bahnhof am 16. 7. zahlreich. Am nächsten Tage war die Futterpflanze restlos abgeschnitten. B. D. 25. u. 29. 7. in großer Anzahl, aber alle Raupen gestochen.
131. (381) *Dianthoeicia compta* F. Am Licht 12. 7., an Zaun 14. 7.
132. (382) *Dianthoeicia capsicola* Hb. Raupe in A. mehrfach 16. 7., e. l. 14. 8.
133. (383) *Dianthoeicia cucubali* Fuessl. Raupe A. 26. 7.
134. (384) *Dianthoeicia carophaga* Bkh. Raupe am Traisendamm aus *Silene inflata* geklopft im August.
- †135. (391) *Miana bicoloria* Vill. Ein frisch geschlüpftes Männchen Th. 20. 7. aufgescheucht, aber nicht erreicht. A. 27. 7. ein verkümmertes Weibchen geklopft.
- †136. (392 quat.) *Bryophila recepticula* Hb. Im Ort ein stark geflogenes Exemplar an Stein.
137. (393) *Bryophila algae* F. Im Ort 28. 7. in der Allee, bei Wielandstal 12. 8. an einem Birnbaum.
138. (397) *Apamea testacea* Hb. A. 17. 8. geklopft.
- †139. (398) *Celaena matura* Hufn. Beim B. D. an Hausmauer 17. 8., auch H. 12. 8. aus einem Artemisiastock aufgescheucht.
- †140. (402) *Hadena ochroleuca* Esp. G. K. 22. u. 28. 7. auf Centaureenblüten.
141. (410) *Hadena monoglypha* Hufn. G. K. 26. 7., A. 8. 8.
142. (413) *Hadena lithoxylea* F. A. 21. 7. geklopft.
143. (417) *Hadena scolopacina* Esp. A. 25. 7. ein sehr geflogenes Weibchen geklopft.
144. (422) *Hadena secalis* L. A. 17. 8. geklopft, aber verflogen, in drei Formen: *secalis* L., *nictitans* Esp., *leucostigma* Esp.
- †145. (444) *Rhizogramma detersa* Esp. A. 17., 22. 7. u. im Ort an Bäumen und Zäunen 27. 7., 2., 3., 8., 12., 17. u. 20. 8.
146. (452) *Brotolomia meticulosa* L. Im Haus 22. 8.
- †147. (473) *Luceria virens* L. ssp. *immaculata* Stgr. Bei Wielandstal 12. 8. im Gras.
148. (486) *Leucania conigera* F. G. K. u. Th. An Blüten von Spinnen ausgesogene tote Falter.
149. (487) *Leucania albipuncta* F. G. K. 26. 7., A. 8. 8.
150. (488) *Leucania lithargyria* Esp. A. 25. 7. geklopft.
151. (493) *Caradrina quadripunctata* Hufn. A. 14. 8. und Licht.
152. (499) *Caradrina alsines* Brahm. A. 18. 7. auf Blüten sitzend.
153. (500) *Caradrina taraxaci* Hb. A. 18. 7.
154. (509) *Amphipyra tragopoginis* L. G. K. 21. 8.
155. (539) *Plastenis retusa* L. A. 26. 7.
156. (579) *Calophasia lunula* Hufn. Raupe Sch. 11. 8.
157. (582) *Cucullia verbasci* L. A. Raupen Juli.

- †158. (584) *Cucullia lychnitis* Rbr. In der Au saßen an den Tausenden dort wachsenden Verbascumstauden die Raupen zweier Formen oder Arten zahlreich, waren aber größtenteils gestochen.
159. (589) *Cucullia umbratica* L. Th. 6. 7., A. 6. 8. an Pflöcken.
- †160. (597) *Cucullia artemisiae* Hufn. Sch. 11. 8. bei Suche nach *Mam. leineri* zwei jüngere Raupen an *Artemisia campestris*.
161. (606) *Heliothis ononidis* F. B.D. 5. 8. ein Männchen der zweiten Generation.
162. (607) *Heliothis dipsacea* L. G. K. 27. 7. Raupe, B. D. 19. 8., Th. 20. 8.
- †163. (610) *Chariclea delphinii* L. Auf einem Feld oberhalb des B. D. am 15. 8. ein verflogenes Weibchen an *Delphinium* Eier legend. Dort die Raupen 19. u. 28. 8.
- †164. (613) *Acontia luctuosa* Esp. Th. 10. 7., G. K. 27. 7., A. 4. 8., H. 8. 8.
- †165. (625) *Erastria pusilla* View. A. 17. u. 24. 7.
166. (627) *Erastria fasciana* L. A. 8. 7., F. 10. 7.
167. (628) *Rivula sericealis* Scop. A. 8. 8., 14. 8.
168. (631) *Emmelia trabealis* Scop. G. K. 29. 5., 6. 7., A. 12. 7., B. D. 13. 7., Th. 16. 7., A. 17. 7., G. K. 27. 7.
169. (633) *Scoliopteryx libatrix* L. A. 12. 8. eine Raupe.
170. (634) *Habrostola triplasia* L. A. 14. 8. eine Raupe.
- ? (637) *Plusia c. aureum* Knoch. A. 15. 8. scheuchte ich in der Nähe von Thalictrum eine dunkle *Plusia* auf, die möglicherweise diese Art war.
171. (648) *Plusia gutta* Gn. G. K. 26. 7. ein Weibchen; die jungen Raupen gingen leider ein.
172. (651) *Plusia gamma* L. Th. 6. 7., A. 7. u. 25. 7. usw.
173. (655) *Euclidia mi* Cl. G. K. 29. 5.
174. (656) *Euclidia glyphica* L. G. K. 29. 5., 11. u. 14. 7., A. 4. 8., Th. 20. 8. usw.
175. (662) *Catocala electa* Bkh. G. K. 3. 8., Ossarn 15. 8., A. 17. 8. G. K. 18. 8. an Baumstämmen und Zäunen.
176. (665) *Catocala nupta* L. Beim Stift an einer Mauer 17. 7.
- †177. (674) *Toxocampa lusoria* L. Th. 23. 7. aufgescheucht.
- †178. (677) *Toxocampa craccae* F. A. 17. 8. aus dürren Zweigen geklopft.
179. (678) *Laspeyria flexula* Schiff. A. 12. 7.
- †180. (682) *Zanclognatha tarsiplumalis* Hb. Th. 16. 7. mehrere abgeflogene Stücke.
181. (688) *Madopa salicalis* Schiff. A. 8. 8., B. D. 18. 8.
- *182. (689) *Herminia derivalis* Hb. Th. 6. 7., F. 10. 7., Göttweig 30. 7. aus Eichen geklopft, aber ausnahmslos schlecht.
- *183. (690) *Herminia tentacularia* L. Fast täglich zu finden, so Th. 6., 9. 7., 6., 20. 8., G. K. 11. 7., 3. 8., B. D. 13. 7., A. 24. 7., 17. 8.
184. (693) *Hypena proboscidalis* L. Raupe A. 15. 7., e. l. 11. 8.
185. (694 bis) *Hypena rostralis* L. Raupe A. 25. 7., e. l. 11. 8.

18. Fam. *Cymatophoridae*.

186. (701) *Cymatophora duplaris* L. A. 7. 8.

(Fortsetzung folgt.)

Literaturreferat.

Prof. Dr. M. Draudt, „Beiträge zur Kenntnis der Agrotiden-Fauna Chinas. Aus den Ausbeuten Dr. H. Hönes. (Beitrag zur Fauna Sinica)“. Mitt. d. Münchn. Ent. Ges., XL, 1950, pp. 1—174, Taf. I—XVIII.

Diese wichtige Arbeit zeigt das Ergebnis von Prof. Draudts Studium des enormen aus China durch Dr. h. c. Höne zusammengebrachten Materials. Man kann wohl sagen, daß letzteres der wichtigste jemals zur Erforschung der chinesischen Fauna erbrachte Beitrag ist, vielleicht sogar der bedeutendste, der überhaupt durch eine wissenschaftliche Expedition zur Kenntnis irgend einer Region der Erde geleistet wurde. Die durch Dr. h. c. Höne erzielten und in ihrer Bedeutung außergewöhnlichen Ergebnisse sind, man muß dies unterstreichen, seiner ausdauernden Forschertätigkeit zu verdanken, vor allem aber auch seinem Scharfsinn und der sicheren Erfassung der zu untersuchenden Gebiete. Die Wichtigkeit der getroffenen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1952

Band/Volume: [37](#)

Autor(en)/Author(s): Schwingenschuß[ss] Leo

Artikel/Article: [Kleiner Beitrag zur Lepidopterenfauna von Herzogenburg und Umgebung. Fortsetzung. 130-134](#)