

Fig. 5. *Euxoa tritici* L., Paris-Umgebung.

Fig. 6. *Euxoa tritici* L., Ifrane (Mittel-Atlas, Marokko).

Tafel 5

Fig. 7. *Euxoa tritici eruta* Hb., Plouharnel (Bretagne).

Fig. 8. *Euxoa segnilis* Dup., Budapest.

Fig. 9. *Euxoa aquilina* Schiff., Alpen.

Fig. 10. *Euxoa oranaria* B.-H., Algerien.

Fig. 11. *Euxoa wagneri* Cti., Albarracin. Hier zum ersten Male abgebildet.

Fig. 12. *Euxoa theryi* Le Cerf, Ifrane, Mittel-Atlas, Marokko. Hier zum ersten Male abgebildet.

Anschrift des Verfassers: 11, rue des Ecoles, Paris 5-ème.

Beitrag zur Lepidopterenfauna des südlichen Burgenlandes.

Von Dipl. Ing. Rudolf Pinker, Mauer b. Wien

(Mit 1 Karte)

(Fortsetzung)

Euxoa Hb.

- obelisca* Schiff., R., VI.
- tritici* L., R., VI.
- nigricans* L., R., I., IX.
- aquilina* Schiff., U., H., R., VI.
- decora* Schiff., H., VIII.

Scotia Hb.

- cinerea* Schiff., U., N., R., V.
- segetum* Schiff., U., R., I., IX.
- corticea* Schiff., U., R., VI.
- ypsilon* Hufn., U., R., I., VIII.
- exclamationis* L., U., VI.
- crassa* Tr., R., VIII.

Ochropleura Hb.

- signifera* F., I., VI.
- praecox* L., U., VIII.
- pecta* L., U., R., I., exl., VII. u. IX.

Eugnorisma Brsn.

- depuncta* L., R., VIII.
- flammatra* Schiff., R., I., Gü., VIII.

Chersotis Bsd.

- rectangula* F., R., Gü., I., VII. und übersommert im IX.
- multangula* Schiff., R., Gü., exl., V.
- margaritacea* Vill., H., R., VIII.

Tripshaena O.

- pronuba* L., U., R., VIII.
- orbona* Hufn. (*comes* Hb.), R., U., I., VI.
- comes* Tr. (*subsequa* Esp.), U., VI.
- fimbriata* Schreber (*fimbria* L.), R., N., I., VII.

Epilecta Hb.

- linogrisea* Schiff., R., VIII.

Opigena Bsd.

- polygona* Schiff., Ga., U., R., I., VII. und übersommert X.

Eugraphe Hb.

- sigma* Schiff. (*signum* F.), S., I., VIII.

Lycophotia Hb.

- porphyrea* Schiff. (*strigula* Thnbg.), R., V.

Peridroma Hb.

- saucia* Hb. und f. *margaritosa* Haw., R., I., exl., VIII.

Diarsia Hb.

- rubi* View., Oberdorf, N., I., V. und VII.

Amathes Hb.

- c-nigrum* L., U., S., I., VIII.
- ditrapezium* Schiff., I., VI.

Amathes Hb.

- baja* Schiff., U., exl. VII.
- rhomboidea* Esp. (*stigmatica* Hb.), R., S., VII.
- castanea* Esp. *neglecta* Hb., U., R., I., VIII.
- xanthographa* Schiff., Jabing, S., U. IX.

Naenia Stphs.

- typica* L., U., Oberdorf, I., VI.

Mesogona Bsd.

- acetosellae* Schiff., R., U., I., IX.

Discestra Hmps.

- trifolii* Hufn., R., S., H., I., VIII.

Heliophobus Bsd.

- calcatrippae* View. (*reticulata* Vill.), I., H., VI.

Polia O.

- bombycina* Hfn. (*advena* Schiff.), U., VI.

Pachetra Guen.

- sagittigera* Hfn. (*leucophaea* Schiff.), A., I., V.

Mamestra O.

- brassicae* L., U., I., VII.
persicariae L., U., R., V.
contigua Schiff., R., S., U., I., VI., IX.
w-latinum Hufn. (*genistae* Bkh.), R., VI.
thalassina Hufn., A., R., VI., IX.
suasa Schiff. (*dissimilis* Knoch), H., R., I., VI.
oleracea L., U., S., I., V.
aliena Hb., U., VI.
pisi L., H., U., I., V., VIII.
nana Hufn., R., U., I., V., VI., IX.
bicolorata Hufn. (*serena* Schiff.), U., R., I., VII. und f. *leuconota* Ev., R., I., VII.
dysodea Schiff. (*chrysozona* Bkh.) (*spinaciae* View.), R., exl. VII.
cappa Hb., R., VIII., sehr auffallendes Vorkommen!

Hadena Schrk.

- cucubali* Schiff., U., R., VI., IX.
lepida Esp. (*carpophaga* Bkh.), U., R., H., I., V., VI.
filigramma Esp. f. *xanthocyanea* Hb., U., VI.
albimacula Bkh., U., VI.
compta Schiff., R., VIII.

Hadena Schrk.

- confusa* Hufn. (*nana* Rott.), R., U., I., V., VI., IX.
bicruris Hufn. (*capsincola* Schiff.), R., IX.
luteago Hb., U., VI.

Tholera Hb.

- cespitis* Schiff., und f. *desyllesi* Bsd. (*ferruginea* Höfn.), R., S., I., IX.
decimalis Poda (*popularis* F.), R., I., IX.

Hyssia Gn.

- cavernosa* Ev., I., VII.

Panolis Hb.

- flammea* Schiff., (*griseovariegata* G.), R., V.

Xylomiges Guen.

- conspicillaris* L., N., V.

Mythimna O.

- turca* L., U., R., H., V.
ferrago F. (*lithargyria* Esp.), R., VII.
l-album L., U., R., I., VI.
albipuncta Schiff., U., R., I., VI., VII.
vitellina Hb., Ga., U., S., R., I., VIII.
pallens L., U., R., I., IX.

Cucullia Schrk.

- absinthii* L., U., S., H., R., exl. VII.
chamomillae Schiff., R., I., V.
lucifuga Hb., U., R., VI., VII.
lactucae Schiff., R., exl. VI.
campanulae Frr., H., R., auch als Raupe! F.
umbratica L., U., S., H., R., I., V., VIII.
tanacetii Schiff., N., H., exl. VI., VIII.
gnaphalii Hb., U., R., VI., VIII.

- Cucullia lychnitis* Rbr., Gü., VI.
scrophulariae Cap., U., exl. VI.
verbasci L., U., R., exl. V.
prenanthis Bsd., R., V.

Omphalophana Hmps.

- antirrhini* Hb., H., V.

Calophasia Steph.

- lunula* Hufn., U., H., R., VIII.

Brachionycha Hb.

- sphinx* Hufn., R., I., X.

Derthisa Wlk.

- trimacula* Schiff. (nicht *glauca* Esp.), R., IX.

Aporophyla Guen.

- lutulenta* Schiff., U., R., I., IX.

Lithophane Hb.

- semibrunnea* Haw., R., IX.
socia Hufn., R., I., VIII.
ornitopus Hufn., R., I., IX.
furcifera Hufn., U., I., R., IX.

Lithomoia Hb.

- solidaginis* Hb., R., VIII.

Xylena O.

- vestusta* Hb., U., Ga., R., I., IX.
exoleta L., U., I., IX.

Meganephria Hb.

- bimaculosa* Hb., R., H., I., Gü., VIII.

Allophyes Tams

- oxyacanthae* L., R., I., IX.

Griposia Tams

- aprilina* L., U., R., I., IX.
convergens Schiff., R., I., IX.

Dryobotodes Warr.

- protea* Schiff., R., IX.

Blepharita Hmps.

- satura* Schiff. (*porphyrea* Esp.), R., I., VIII.
adusta Esp., H., V.

Lamprosticta Hb.

- culta* Schiff. (*viridana* Walch), A., R., U., I., VI. exl.

Antitype Hb.

- xanthomista* f. *nigrocincta* Tr., R., IX.
gemma Tr., R., IX.
chi L., R., I., IX.

Ammonoconia Led.

- caecimacula* Schiff., R., I., IX.

Eupsilia Hb.

- transversa* Hufn. (*satellitina* L.), U., R., IX.

Xanthia Hb.

- croceago* Schiff., R., IX.

Conistra Hb.

- erythrocephala* Schiff. und f. *glabra* Hb. I., IX.
rubiginosa Scop. (*vau punctatum* Esp.), Ga., I., IX.
vaccinii L., R., I., X.
ligula Esp., U., I., X.
rubiginea Schiff., U., R., N., I., VIII.—X.

Agrochola Hb.

- circellaris* Hufn., R., I., IX., X.

- Agrochola lota* Cl., Ga., IX.
macilentata Hb., Ga., R., IX., X.
nitida Schiff., S., R., I., VIII., IX.
helvola L., Ga., H., R., I., IX.
humilis Schiff., U., R., I., IX. häufig!
litura L., U., R., I., IX.
lychnidis Schiff., mit allen Formen
außer *coerulescens* Calb., R., IX.
laevis Hb., R., S., I., VIII., IX.
Parastichtis Hb.
suspecta Hb., S., VII.
Athetmia Hb.
xerampelina Esp., I., IX.
- Athetmia ambusta* Schiff., N., R., exl.
VIII.
Cirrhia Hb.
aurago Schiff., R., Ga., IX.
fulvago Cl. (*sulphurago* F.), R., Gü.,
exl. VIII.
lutea Ström., U., S., VIII., IX.
icteritia Hufn. (*fulvago* L.) mit f.
flavescens Esp., U., I., IX.
gilvago Schiff. und f. *palleago* Hb.,
H., IX.
citrago L., U., I., VIII.

(Fortsetzung folgt)

Berichtigung.

In der Arbeit „Cyprische Kleinschmetterlinge“ von H. G. Amsel ist auf Seite 55 die neue *Scoparia*-Art irrtümlich mit dem bereits präoccupierten Namen *unicolorella* benannt worden. Der richtige, hierfür einzusetzende Name lautet: ***Scoparia unicornutella* sp. n.** Auch bei der Unterschrift zu Abb. 7 auf S. 56 ist der richtige Name *unicornutella* einzusetzen.

Literaturreferat.

Dufay Cl.: Sur une espèce française de Noliné dont un seul exemplaire était jusqu'à présent connu: *Celama dresnayi* Warn. (Lep. Arctiidae). (Contribution à l'étude des Arctiidae Nolinae, I) („Über eine französische Nolinenart, von welcher bisher nur ein Exemplar bekannt war: *Celama dresnayi* Warn.“). Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon, 27, Nr. 3, Lyon 1958, p. 64—66, pl. I. — Warnecke's Originalbeschreibung lag ein einziges Stück zu Grunde, das am 25. Juli 1936 von Dresnay bei La Bessée-sur-Durance (Hautes-Alpes), ca. 1100 m, gefangen worden war (Rev. franç. Lép., X., 1946, p. 289, Taf. IV). Nun konnte Dufay bei Saint-Michel-l'Observatoire, ca. 650 m, in etwa 120 km Luftlinie südwestlich des erstgenannten Fundortes zwischen dem 28. Mai und 2. Juni 1957 sieben Stücke an der Quecksilberdampflampe erbeuten. Diese ermöglichten eine ergänzende Beschreibung und weitere Genitaluntersuchungen. Die Falter — hievon ein Exemplar in stärkerer Vergrößerung — werden, ebenso wie ihre männlichen Genitalarmaturen im Vergleich mit *Celama centonalis* Hb. gut abgebildet. Die anscheinend ziemlich lokale und seltene Art steht *centonalis* Hb. nahe, läßt sich aber äußerlich unschwer durch die sehr langen Palpen und die seidig-hellilagraue Färbung unterscheiden. Es wäre beim Lichtfang im westlichen Mediterran- und Alpengebiet besonders auf das Vorkommen dieser sicher oft übersehenen Art zu achten und deren Verbreitung zu ermitteln. Reisser.

Patocka, J.: Beitrag zur Kenntnis der Schmetterlinge an Tannen. Z. ang. Entomologie 41, p. 208—215, 1957. — Der Verfasser gibt eine ausführliche und sorgfältige Darstellung der Biologie von *Ypsolophus (Cerotoma) coriacellus* HS. und *Pammene oxsenheimeriana* Z. Raupen und Puppen werden beschrieben und gut abgebildet, beide Arten werden als Bewohner der Tanne nachgewiesen. H. G. Amsel.

Toll, Sergiusz und Wojtusiak, Roman J.: Revision of the Palaearctic forms of the genus *Paratalanta* Meyr. Acta Zool. Cracoviensia II, Nr. 13, p. 279—310, 1957. — Die innerhalb der paläarktischen *Pyraustinae* durch ihren Sexualdimorphismus und die höchst aparte Gestalt der ♂ auffallende Gattung *Paratalanta* Meyr. erfährt in dieser Veröffentlichung eine monographische Darstellung von hohem Wert. Eine Karte mit den Verbreitungsangaben, sorgfältige Darstellungen der Genitalien beider Geschlechter und anderweitige morphologische