

Argyroploce (Celypha) woodiana Barr., neu für Burgenland und Österreich.

Von Dr. Walter Hayek, Wiener Neustadt.

Auf dem Csaderberg südlich von Kohfidisch (südl. Burgenland) kam am 5. 9. 1959 ein *Arg. woodiana*-♂ zum Licht. Es war zwei Tage nach Neumond, Windstille und die Temperatur sank von 13 Grad bei Anbruch der Dunkelheit auf 10 Grad um Mitternacht. Ich leuchtete damals mit einer Osram-HWA-500-W-Lampe. Seehöhe 500 m. Mischwald mit vorwiegend Eichen, in dem aber auch zahlreiche Föhren stehen.

Arg. woodiana Barr. wurde aus England beschrieben, wo sie in Hereford lokal vorkommt. Sie wurde weiter aus dem südlichen Frankreich bekannt, aus dem mittleren Deutschland, um Berlin, und aus dem Gebiet des Olymp, wo Dr. Klimesch in 800 m Höhe ein Stück ans Licht bekam. In den unmittelbaren Nachbarländern Österreichs wurde der Falter also noch nicht beobachtet.

Sicher ist die Art weiter verbreitet, doch wird sie wegen ihrer Lebensweise nur sehr selten gefangen. Die Raupe lebt an der Mistel, in deren Blättern die Jugendstände minieren. Nach dem Verlassen der Minen lebt die Raupe zwischen zusammengesponnenen Blättern. Angeblich soll man im Frühjahr an abgefallenen *Viscum*-Blättern die Minen finden. Der Falter entfernt sich nicht weit von der Futterpflanze, lebt also in den Kronen der Bäume. Erst durch Verwendung von Mischlicht gelang es, die Falter aus ihrer Höhe herunterzulocken. Da sich unser „Stammplatz“ dort am Rande eines Abhanges befindet, der bewaldet ist, wäre es auch möglich, daß der Falter waagrecht angefliegen kam.

Für die Bestimmung und Charakterisierung des Falters bin ich Herrn Dr. J. Klimesch, Linz, sehr zu Dank verpflichtet.

Anschrift des Verfassers: Wiener Neustadt, Bahngasse 46

Zur Kenntnis der *Pieris melete*-Gruppe.

Von Leo Sheljuzhko, München.

(Mit 5 Tafeln und 2 Textabbildungen)

Der Formenkomplex, der gewöhnlich als *Pieris melete* Mén. zusammengefaßt wird, und dem sich auch die der *melete* sehr nahestehenden ostasiatischen *napi*-Formen eng anschließen, bietet noch manche Unsicherheit. Es wurde freilich eine Anzahl von Formen der genannten Gruppe aufgestellt, leider aber noch viel zu wenig Klarheit in den Zusammenhang einiger dieser Formen gebracht. Ich erhebe gewiß nicht den Anspruch, in diesem Artikel die gesamten noch offenstehenden Fragen zu lösen und volle Klarheit in die Angelegenheit zu bringen. Ich möchte nur hoffen, daß meine Aus-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1960

Band/Volume: [45](#)

Autor(en)/Author(s): Hayek Walter

Artikel/Article: [Argyroploce \(Celypha\) woodiana Barr., neu für Burgenland und Österreich. 4](#)