©Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Beilage: Tafel 6

ZEITSCHRIFT DER WIENER ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT

45. Jahrg. (71. Band) 15. Februar 1960 Nr. 2

Mitgliedsbeitrag, zugleich Bezugsgeld für die Zeitschrift: Österreich vierteljährlich S 12·50, Studenten jährlich S 10·—. **Zahlungen nur auf Postsparkassenkonto Nr. 58.792,** Wiener Entomologische Gesellschaft. Westdeutschland vierteljährlich DM 4·—, Überweisung auf Postscheckkonto München 150, Deutsche Bank, Filiale München, „für **Ausländer-DM-Konto Nr. 137 514,** Wiener Ent. Ges.". Sonstiges Ausland nur Jahresbezug S 100·—, bzw. England Pfund Sterling 1.15.0, Schweiz. frs. 16·—, Vereinigte Staaten USA Dollar 5·—. **Einzelne Nummern** werden nach Maßgabe des Restvorrates zum Preise von S 4·— für Inländer bzw. S 8·— für Ausländer zuzüglich Porto abgegeben.

Zuschriften (Anfragen mit Rückporto) und **Bibliothekssendungen** an die Geschäftsstelle Wien I, Getreidemarkt 2 (Kanzlei Dr. O. Hansslmar). **Manuskripte, Besprechungsexemplare und Versandanfragen** an den Schriftleiter Hans Reisser, Wien I, Rathausstraße 11. — Die Autoren erhalten **50 Separata kostenlos,** weitere gegen Kostenersatz.

Inhalt: Mitterndorfer: Beitrag zur Lepidopterenfauna Niederösterreichs. S. 17. — Wyatt: Neue Rasse von Parnassius simo Gray. (Taf. 6). S. 18. — Sheljuzhko: Pieris melete Mén. (Forts.). S. 20. — Literaturreferat. S. 29.

Ein kleiner Beitrag zur Lepidopterenfauna Niederösterreichs.

(Zone 17 des Prodromus)

Von Wilhelm Mitterndorfer, Eferding.

Im Sommer 1959 hatte ich Gelegenheit, öfters die Hochfläche von Rammelhof im westlichen Waldviertel zu besuchen und dort in der Zeit vom 14. 7. 1959 bis 4. 10. 1959, achtmal Lichtfang mit der Mischlichtlampe zu betreiben. Da aus diesem abgelegenen Gebiet – abgesehen von einer kleinen Veröffentlichung Sterzls über die Flitz-Au (Ztschr. Wr. E. Ges. 1. 3. 1953) – keine weiteren lepidopterologischen Daten vorliegen, meine diesjährige Sammeltätigkeit dort aber einige recht interessante Falterarten erbrachte, halte ich es für angezeigt, hier kurz darüber zu berichten.

Das von mir besuchte, auf der Übersichtskarte mit „Rammelhof" bezeichnete Gebiet, erstreckt sich ca. 7 km südwestlich von Arbesbach in einer Seehöhe von 900 bis 950 m. Es ist, besonders auf seiner Süd- und Nordabdachung, stellenweise stark versumpft und weist einige interessante Moorwälder auf, die eine intensivere entomologische Durchforschung verdienen.

In das oben genannte Gebiet leitete mich Herr Dr. J. Klimesch, Linz a. d. D., durch eine kleine Skizze zum Nordrand der Hochfläche von Rammelhof. Dort leuchtete ich viermal. Die Leuchtstelle ist von drei Seiten Moorwald umgeben. Dort fing ich als neu für Niederösterreich *Dasypolia templi* Thunbg., und als neu für Zone 17 des Prodromus N.-Ö. noch *Xylina ingrica* H. S. Dieser

©Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Leuchtplatz scheint mir noch viel günstiger zu sein als die Südseite (Flitz-Au), wo schon arg entwässert und Torf gestochen wird. Ich konnte dort fast alle ans Moor gebundenen Pflanzen feststellen. Im Umkreis wächst auch Wacholder. Doch auch die Flitz-Au durchstreifte ich und fand am Südrand derselben eine günstige Leuchtstelle. Als dritten Leuchtplatz in diesem Gebiet versuchte ich es auf der Westseite, oberhalb eines Waldmoores ganz an der Grenze zwischen Ober- und Niederösterreich.

Folgende bemerkenswerte Arten fing ich an diesen drei Leuchtstellen (Nomenklatur lt. Prodromus bzw. Berge-Rebel):

Lophopteryx cuculla Esp.
Selenephera lunigera ab. *lobulina* Esp.
Panthea coenobita Esp.
Acronicta menyanthidis View.
Agrotis polygona F.
Agrotis fimbria L.
Agrotis dahlii Hb.
Agrotis nigricans L.
Agrotis occulta L.
Dianthoecia proxima Hb.
Polia xanthomista v. *nigrocincta* Tr.
Dichonia aprilina L.
Hyppa rectilinea Esp.
Hydroecia lucens Frr.
Hydroecia paludis Tutt
Tapinostola fulva Hb.
Xanthia citrago L.
Calocampa solidaginis Hb.
Plusia bractea F.
Lygris reticulata F.
Lygris prunata L.
Lygris testata L.
Larentia miata L.
Larentia immanata Hw.
Larentia firmata Hb.
Larentia didymata L.
Larentia christyi Prout
Larentia autumnata Bkh.
Larentia caesiata Lang
Larentia molluginata Hb.
Larentia quadrifasciaria Cl.
Larentia lugubrata Stgr.
Eupithecia venosata F.
Eupithecia albipunctata Hw.
Eupithecia castigata Hb.
Eupithecia veratraria H. S.
Eupithecia nanata Thnbg.
Sarrothripus degenerana Hb.
Hepialus humuli L.

Anschrift des Verfassers: Eferding, O.-Ö., Stadtplatz Nr. 6.

Eine neue Rasse von Parnassius simo Gray.

Von Colin W. Wyatt, Farnham.

(Mit 1 Tafel)

Als ich 1956 den Kaschmirhimalaya durchstreifte, erbeutete ich bei etwa 4300 m am Südabhang vom Ludarwas Ganj (Ganj = Paß) oberhalb Sonamarg, etwa 70 km nordöstlich von Srinagar, an der gleichen Gebirgskette wie der Zogi-La Paß und nur etwa 8 km westlich davon, drei frische Stücke einer sehr auffallenden *Parnassius simo*-Rasse. Diese weichen von den Nachbarrassen *lorimeri* Tytl. und *simoides* O. B-H. (= *ganymedes* Br. & Eis.) stark ab und lassen sich bei keiner anderen *simo*-Rasse aus dem Westhimalaya einreihen.

Ich hatte neulich Gelegenheit, diese Stücke mit den langen *simo*-Serien in der Coll. Eisner zu vergleichen, wobei ich feststellen konnte, daß es sich tatsächlich um eine bisher unbekannte *simo*-Rasse handelt. Auch Herr Eisner wurde darüber einig.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1960

Band/Volume: 45

Autor(en)/Author(s): Mitterndorfer Wilhelm

Artikel/Article: Ein kleiner Beitrag zur Lepidopteronfauna Niederösterreichs. (Zone 17 des Prodromus). 17-18