



# ZEITSCHRIFT DES VEREINES DER NATURBEOBACHTER UND SAMMLER



5. Jahrgang

1930

Nr. 2

Briefe, Anfragen mit RÜCKPORTO und Manuskrifte sind zu senden an Alois Sterzl, Wien VII., Lerchenfeldergürtel 38, Tür 15. — Post-Scheckkonto Wien Nr. 139.273. — Geldsendungen sind nur an den Kassier Ctto Wittmer, Wien XVII., Hernalserhauptstraße 172, zu senden.

## Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna des nördlichen Burgenlandes.

Von Franz Fischer sen.

(Fortsetzung.)

Marumba.

quercus Schiff., Mannersdorf Leithageb., selten. Vor dem Kriege, 1914, fand ich die Raupe alljährlich an jungen Eichen, die an dem Wegrande der Straßen zu den Steinbrüchen sich befinden. Zugleich klopfte ich auch die Rp. von Phal. bucephaloides. Seit dem Jahre 1918 war es mir nicht mehr gelungen, wenigstens eine von den beiden zu erreichen.

Mimas.

tiliae L., Bruck a/L., Trautmannsdorf, Eisenstadt; Juni.

Smerinthus.

ocellata, überall zu finden, wo Weide und Pappel wächst.

Amorpha.

populi, überall zu finden, wo Weide und Pappel wächst.

Haemorrhagia.

fuciformis L., überall im Gebiet.

Proserpinus.

proserpina Pfl., Leithageb., in den Steinbrüchen bei Mannersdorf; nicht häufig.

Macroglossum.

stellatarum L., überall häufig in zwei Gen.

Celerio.

euphorbiae L., überall im Gebiet vertreten.

Gallii Rott., nicht selten bei Wallern a/See.

vespertilio Esp. Leithageb. in den Steinbrüchen von Mannersdorf nicht häufig. 2 Gen.

**Pergesa.**

eipenor L., überall im Gebiete, Einser-Kanal bei Wallern a/See; nicht selten.

porcellus L., überall im Gebiete.

**Bombyces.****Procris.**

pruni Schff., überall verbreitet. Rp. auf Schlehen im Juni zu klopfen.

statices L., Mannersdorf, Leithageb., Kaisersteinbruch, Bruck a/L.

globulariae Hb. Mannersdorf, Bruck a/L. selten.

ab. subsolana Stgr., Mannersdorf, Bruck a/L. Rp. in den Herztrieben von Carlina.

chloros Hb., Somerein, Bruck, Juli.

**Zygaena.**

purpuralis Hb. überall verbreitet.

scabiosae Schew., Müllendorf, Leithageb. Juni.

loniceriae Schew. überall im Gebiet.

angelicae Ochs., „

filipendulae L., „

ephiatles L., Müllendorf, Juli.

ab. medusa Pall., „

ab. athamanthae Esp., „

ab. trigonellae Esp. Mannersdorf, Leithageb. Juli.

ab. coronillae Esp. „

achilleae Esp., Müllendorf, Juli.

carniolica Sc., überall häufig.

**Syntomis**

phegea L., überall im Gebiet des Leithageb.

**Dysauxes.**

ancilla L., in der Au bei Trautmannsdorf, Juli.

**Nola.**

culcatella L., Bruck, Weiden. Rp. an Weißdorn, Mai.

**Roeselia.**

togutalis Hb., Mannersdorf; Rp. überwintert. Nur an kleinen Eichen.

**Celama.**

confusalis H. S., überall im Gebirge; Mai. Mit Buche gezogen.

**Sarrothripus.**

revayana Sc., Mannersdorf, Bruck; Rp. an besonders verkrüppelten Eichen im Mai. Falter überwintert.

**Earias.**

clorana L., an Bachufeln mit der Weide verbreitet

vernana Hb., mit der Silberpappel im Gebirge verbreitet.

**Hylophila.**

prasinana L., im Waldgebirge überall.

**Hylophilina.**

bicolorana Fuesl., Mannersdorf, Wilfleinsdorf, Bruck; Rp. überwintert klein. An Eichen

## Comacia.

senex Hb., Weiden a/See, Juni.

## Mitochrasta.

miniata Forst., an feuchten Waldstellen, Mannersdorf, Somerein.

## Cybosia.

mesomella L., mit der vorigen an gleichen Stellen. Donnerskirchen.

## Oeonistis.

quadra L., Bruck, Spitalberg.

## Lithosia.

griseola Hb., im Waldgebirge nicht selten. Saugraben. Juli.

lurideola Zink, Mannersdorf, Bruck a/L.

complana L.,

lutarella L., Wüste Mannersdorf.

## Pelosia.

muscerda Hufn., Trautmannsdorf, Au.

## Gnophria.

rubricollis L., Zeilerberg b./Bruck.

## Coscinia.

striata L., auf Hutweiden, gleichzeitig mit *Cletis maculosa*; Winden.

## Cletis.

maculosa Gern., von Bruck a/L. bis Jois, Winden, auf den Hügelketten und Hutweiden. Vor dem Kriege, 1914, ungemein häufig. In Winden bestand eine Art Börse, die sich mit dem Vertrieb der Raupen befaßte; durch diese massenhafte Wegschleppung der Raupen wurde das Tier sehr stark reduziert.

## Phragmatobia.

fuliginosa L., im ganzen Gebiet verbreitet.

## Eucharia.

casta Esp., Bruck a/L., Eisenstadt. Der Falter kommt nachts zum Licht. Mai. Rp. an *Galium*, frißt nur während der Nacht. Juli bis September.

## Spilarctia.

lubricipeda L., Bruck a/L.

## Spilosoma.

menthastri Esp., überall im Gebiet.

urticae Esp.,

## Arctinia.

caesarea Goeze, Müllendorf, Juni.

## Diaphora.

mendica Cl., Bruck, Winden, Juni.

## Rhyparia.

purpurata L., Bruck a/L., Winden, häufig, großer Prozentsatz der Raupen gestochen.

## Diacrisia.

sannio L., Kaisersteinbruch, Bruck, Winden, Leithageb. 2 Gen.

## Hyphoraia.

aulica L., überall im Gebiet.

## Arctia.

caja L., überall, die Raupen, sowie die von purpurata sehr viel gestochen.

villica L., besonders in den Steinbrüchen von Mannersdorf Bruck a/L.

hebe L., Zeilerberg bei Bruck a/L.

## Callimorpha.

quadripunctaria Poda, überall im Leithageb.

## Dasychira.

fascelina L., Kaisersteinbruch, Winden. Rp. im Juni.

pubibunda L., überall im Leithageb.

## Hypogymna.

morio L., überall im ganzen Gebiet.

## Orgya.

antiqua L., wie vorige.

gonostigma F., auf Holzschlägen, Wilfleinsdorf. Rp. gerne an Linden.

## Arctornis.

l-nigrum Müll., Mannersdorf, Wilfleinsdorf. Juli Rp. an Birken und Linden, zieht Lindenbüsche vor. Mai.

## Stilpnota,

salicis L., Donnerskirchen. Rp. an Pappel im Juni.

## Lymantria.

dispar L., überall verbreitet.

monacha L., Leithagebirge, Mannersdorf.

## Porthesia.

similis Fuessl., Müllendorf, Purbach.

## Euproctis.

chrysorrhoea L., im ganzen Gebiet stark verbreitet.

## Thaumetopoea.

processionea L., Mannersdorf, Donnerskirchen. Rp. auf Eiche.

## Malacosoma.

neustria L., im ganzen Gebiet verbreitet.

castrensis L., Bruck a/L., Winden. Rp. im Mai, Juni.

## Trichiura.

crataegi L., Winden. Leithagebirge zerstreut. Rp. an Schlehen und Weißdorn. Mai.

## Eriogaster.

catax L., Leithagebirge, Winden. Rp. auf Weißdorn, Schlehen. Mai.

lanestris L., überall beim Gebirge verbreitet, Rp. auf Schlehen. Mai, Juni.

rimicola Hb., Mannersdorf, selten. Rp. auf Eichenbüschen. Mai, Juni.

## Lasiocampa.

quercus L., im ganzen Gebiet verbreitet. Rp. im Mai, Juni auf Schlehen Weißdorn, Hartriegl.

trifolii Esp., Mannersdorf, Kaisersteinbruch, Bruck. a/L.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Vereines der Naturbeobachter und Sammler](#)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: [5\\_2](#)

Autor(en)/Author(s): Fischer Franz

Artikel/Article: [Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna des nördlichen Burgenlandes. 9-12](#)