

Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna des nördlichen Burgenlandes.

Von Franz Fischer sen.

(Fortsetzung.)

linogrisea Schff. Steinbrüche von Mannersdorf, Bruck a/L. Rp. April, Mai, nachts.

fimbria L. häufig im ganzen Leithagebirge. Rp. 4. 5. nachts.

augur F. Raupe unter *Pulmonaria* off. nicht selten auf Holzschlägen 4. 5.

obscura Hb. Rp. nachts an *Linum*. 4. 5. Falter aus dünnen Büschen geklopft. 6. 7. Hutweiden und freien Waldstellen; überall aber nicht häufig.

pronuba L. überall im Gebiete.

orbona Hfn. Mannersdorf, Purbach, Donnerskirchen. Rp. nachts an niederen Pflanzen zu suchen. 4—5.

comes Hb. überall häufig. Falter am Köder. Rp. nachts zu finden.

triangulum Hfn. detto

baja F. detto

candelarum St. Mannersdorf, Kaisersteinbruch. Rp. an niederen Pflanzen. Nachts zu suchen.

c nigrum L. häufig am Köder, überall im Gebirge.

ditrapezium Bkh. nicht zu häufig am Köder. Raupe nachts zu finden an niederen Pflanzen. 4. 5.

stigmatica Hb. detto.

xanthographa F. detto.

rubi Vw. detto.

brunnea F. detto.

primulae Esp. detto.

depuncta L. im Gebiete vertreten, nicht häufig; gerne an Wasserläufen (Au), 1927 60 Stk. an einem Abend am Köder. 8. 9.

margaritacea Vill. Mannersdorfer Steinbrüche. Rp. an *Galium* nicht selten. 3—4.

multangula Hb. Falter an Blumen nachts; Rp. an *Galium*, 5—6. Mannersdorf, Bruck a/L.

rectangula F. Bruck a/L., Spitalberg; 7. Rp. 4.

pecta L. überall im Leithageb.

musiva Hb. Mannersdorf; Rp. nachts an niederen Pflanzen zu suchen. 5.

lucipeta F. Bruck a/L. Sattelberg; Rp. an *Galium*, Huflattich. 4—5.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Vereines der Naturbeobachter und Sammler](#)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: [5_6](#)

Autor(en)/Author(s): Fischer Franz

Artikel/Article: [Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna des nördlichen Burgenlandes. 28](#)