



ZEITSCHRIFT DES VEREINES DER NATURBEOBACHTER UND SAMMLER



6. Jahrgang

1931

Nr. 4

Briefe, Anfragen mit RÜCKPORTO und Manuskrifte sind zu senden an
Alois Sterzl, Wien VII., Lerchenfeldergürtel 38, Tür 15. — Post-Scheckkonto Wien
Nr. 139.27. — Geldsendungen sind nur an den Kassier Otto Wittmer, Wien
XVII., Hernalserhauptstraße 172, zu senden.

Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna des nördlichen Burgenlandes.

Von Franz Fischer sen.

Fortsetzung.

Celaena

matura Hb. an grasigen Stellen im ganzen Gebiete. VII. VIII.
Rp. überwintert und ist im Mai erwachsen.

Hadena

porphyrea Esp. an feuchten Waldstellen. VIII., geht am Köder.
ochroleuca Esp. nicht häufig im Gebiete. Falter bei Tage an
den Blüten von Centaurea. VII — VIII.
adusta Esp. Mannersdorf, Winden. VI.
monoglypha Hfn. nicht selten im Gebiete, geht zum Köder. VIII.
sordida Bkh. Bruck a/L. VI.
lithoxylea F. nicht häufig im Gebiete, kommt am Köder. VII.
sublustris, Esp. VII. Rp. zwischen Grasbüschen und unter Steinen
in einem aus Grasstengel und Kot gemachten Neste, bis V.
Falter bevorzugt Steinbrüche. Mannersdorf, Bruck a/L. VI — VII.
rurea F. Leithagebirge, Mannersdorf. VII.
hepatica Hb. auf Waldwiesen und grasigen Stellen, in Manners-
dorf, Bruck a/L.; selten. VI. VII.
basilinea F. wie vorige, aber mehr verbreitet. Bruck, Wallern.
gemina Hb. im Leithagebirge verbreitet. Rp. im Herbst.
unanimis Tr. an feuchten Stellen am Neusiedlersee. VI — VII.
Rp. überwintert in abgeschnittenen Rohrstengeln bis Mai.
secalis Bjk. im Gebiete überall verbreitet, geht am Köder.

Episema

glaucina Esp. nicht selten, besonders Bruck a/L. VIII — IX.
scoriacea Esp. Wilfleinsdorf, Bruck a/L. VIII. Rp. in den Früch-
ten der Herbstzeitlosen. IV — V.

Aporophyla

lutulenta Bkh.

Ammoconia

caecimacula F. im Leithagebirge nicht selten, kommt häufig am Köder. VIII. IX.

Polia

polymita L. Sommerein. VII.

xanthom. ab. nigrocincta Tr. Teufelsjochsteinbruch. VIII. Rp. an niederen Pflanzen. IV. V.

chi L. Mannersdorf, Bruck a/L., selten. Falter an Baumstämmen. Juli.

Brachionycha

nubeculosa Esp. Falter auf neuen Holzschlägen, an Baumstämmen III bis IV.

sphinx Hfn. überall im Waldgebirge. Mannersdorf. IX.

Miselia

oxyacanthae L. im ganzen Gebiete häufig, kommt am Köder. IX. Rp. auf Schlehen, Weißdorn. V. VI.

bimaculosa L. Bruck a/L. VIII. Rp. auf Ulmen.

Chariptera

viridana Wlch. Mannersdorf, Bruck a/L. VI. VII, kommt am Köder. Rp. an Weißdorn, Zwetckhen, VIII bis IX.

Dichonia

aprilina L. mit der Eiche überall. IX. X.

convergens F. detto

Driobota

protea Bkh. im Leithagebirge nicht selten. IX. Rp. von Eichen zu klopfen. V. VI.

Dypterygia

scabriuscula L. auf Holzschlägen in Bruck a/L. VI. VII.

Rhizogramma

detersa Esp. häufig mit Berberis. VIII. Rp. massenhaft in der Nacht im ganzen Leithageb. auf Berberitzen. IV. V.

Chloanthapolyodon Cl. Mannersdorf. Kaisersteinbruch. VII. kommt am Köder. Rp. bei Tage unter der Futterpflanze (*Hypericum*) und dürrer Laub versteckt. VII und VIII bis X.

hyperici F. auf Holzschlägen, wo Johanniskraut wächst. 2 Gen.

Trachea

atriplicis L. nicht selten auf feuchten Waldwiesen u. Holzschlägen, Wilfleinsdorf. VII.

Brotolomia

meticulosa L. überall nicht selten.

Mania

maura L. im Leithagebirge überall vertreten, nicht zu häufig; kommt am Köder VII. VIII.

Naenia

typica L. Mannersdorf, Bruck a/L. nicht selten. VII.

Helotropha

leucostigma Hb. am Neusiedler-See. VII. VIII.

ab. fibrosa Hb. detto

Hydroecia

nictitans Bkh. Au bei Trautmannsdorf, aus welchen Büschen geklopft. VIII.

ab. erythrostigma Hw. detto

micacea Esp. bei Wilfleinsdorf. VIII, IX.

Gortyna

ochracea Hb. Sommerein; VIII. IX. Rp. in Klettenstengeln. V. VI.

Nonagria

sparganii Esp. Neusiedl, Donnerskirchen.

tiphae Thb. Wallern.

geminipuncta Htch. Donnerskirchen. Rp. in Phragmitis com.

dissoluta Tr. bei Wallern, Weiden. Rp. mit der vorigen.

ab. arundineta Schm. wie vorige.

Senta

maritima und Formen Tausch. am Neusiedler-See u. Einser Kanal.

Tapinostola

musculosa Hb. Mannersdorf. VII.

extrema Hb. am Einser Kanal bei Wallern VI.

fulva Hb. detto VIII.

Luceria

virens L. auf Hutweiden und in Steinbrüchen nicht. VII — IX.

Calamia

lutosa Hb. Donnerskirchen, wahrscheinlich auch im ganzen Seegebiet. IX.

phragmitidis Hb. Einser Kanal bei Wallern, VII. Puppe in Phrogm. com.

Leucania

pallens L. im ganzen Gebiete vertreten, häufig.

l. album L. detto

albipuncta F detto

lythargyria Esp. im ganzen Gebiete vertreten, häufig.
 impudens Hb. auf Holzschlägen in Bruck a/L.
 obsoleta Hb. Donnerskirchen, Einser Kanal. überwintert. Rp. in
 abgeschnittenen Phragmitis Stengeln.
 evidens Hb. Zeilerberg bei Bruck a/L. V.
 comma L. Purbach VIII.
 conigera F. im Gebiete überall,

Mythimna

imbecilla F. Waldgebiete zwischen Wilfleinsdorf — Winden. VII.

Grammesia

trigrammica Hfn. Bruck a/L. VII.
 v. bilinea Hb. „

Caradrina

exigua Hb. Bruck a/L. selten, Falter kommt ans Licht. VIII.
 quadripunctata F. nicht selten.
 kadenii Frr. Mannersdorf, Steinbruch, selten. VIII.
 respersa Hb. in den Steinbrüchen von Mannersdorf, Bruck a/L.,
 Falter nachts an Centaurea, Balota etc.; Rp. überwintert zwischen
 trockenen Blättern und unter Steinen, bis V.
 alsines, Brhm. überall im Gebiete.
 taraxaci Hb. „
 ambigua F. „
 lenta Tr. sehr selten, Mannersdorf.
 pulmonaris Esp. auf Holzschlägen und schütterem Wald, wo Pul-
 monaris officinal. wächst. VI — VII. Ei überwintert; kleine Rp.
 in den Blüten von Pulmonaris off. zuerst eingesponnen, dann frei
 unter der Futterpflanze. Frißt nur nachts. IV. V.

Rusina

umbratica Gr. nicht selten im Gebiete; Rp. überwintert erwachsen
 bis IV.

Amphipyra

tragopoginis L. nicht selten im Leithagebirge, VIII. Kommt am
 Köder.
 perflua F.
 pyramidea L. verbreitet im Gebiete.
 livida F. Bruck a/L., selten. VII. Kommt am Köder.

Perigrappa

cincta F. an grasigen Stellen, Mannersdorf — Bruck a/L. in
 manchen Jahren häufig. Eiablage und Lebensweise wie bei T.
 opima Hb.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift des Vereines der Naturbeobachter und Sammler](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [6_4](#)

Autor(en)/Author(s): Fischer Franz

Artikel/Article: [Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna des nördlichen Burgenlandes. 13-16](#)