

Diagnose: capite, antennis thoraceque nigris; abdomine pedibusque flavis; coxis, trochanteribus nigris; alis fumosis; nervuris stigmatique nigris — Long. 3 lin. — Nach der weiteren Beschreibung sind die Fühler fadenförmig, länger als Kopf und Thorax zusammen, kurz behaart; 3. Glied länger als das vierte. Körper zylindrisch; Hinterleib länger als der Vorderkörper; Clypeus halbkreisförmig ausgeschnitten; Vorderflügel mit 2 Radial- und 4 Cubitalzellen, deren zweite beide Medialnerven aufnimmt. Humeralfeld gestielt. Hinterflügel ohne Mittelzelle. Hintertarsen schwarz. Der 2. Medialnerv manchmal interstitial. — Ich besitze gleichfalls von Chile ein weibliches Exemplar, das dieser Beschreibung vollkommen entspricht; nur ist das Humeralfeld nicht gestielt, sondern durch einen schrägen Nerven getheilt. Aber ein solches Humeralfeld mit schrägem Quernerven kann sehr leicht für ein gestieltes gehalten werden, wenn man nicht genau zusieht; und da *Spinola* auch sonst nicht sehr zuverlässig ist, so halte ich diese seine Angabe für einen Irrtum, bis sich vielleicht ein *Blenocampide* von gleicher Grösse und Färbung finden sollte. Die Art wird also *Antholcus varinervis Spin.* heissen müssen.

Die neue Gattung ist auffällig charakterisiert nicht nur durch das Flügelgeäder, sondern mehr noch durch das grosse Hinterschildchen, das sonst bei den *Chalastogastra* kurz und viel breiter als lang zu sein pflegt.

Ein neuer *Entodecta* Knw. (Hym.)

Von Fr. W. Konow, p. -Teschendorf.

E. Beckeri n. sp. ♀. *Niger; palpis et pedibus e flavo albicantibus; coxis et femoribus anterioribus magis minusve infuscatis; tarsis posticis fuscescentibus; alis hyalinis, sub stigmatе fascia subobscurata ornatis; venis et stigmatе nigris, illo apice obscuriore.*

Parvus, nitidus; capite et thorace nigro-pilosulis; hoc pone oculos fortiter angustato; clypeo apice submarginato; antennis tenuibus, subcompressiusculis, nigro-pilosulis, abdomine longioribus; fovea supraantennali parva, vix impressa; vertice brevi, longitudine sua plus quam duplo latiore. — Long. 4 mm.

Patria: Caucasus.

Dem bekannten Dipterologen Herrn Stadtbaurat *Th. Becker* zu Ehren benannt, der die Art im Kaukasus gesammelt und mir freundlichst mitgetheilt hat.

Die 3 bisher bekannten *Entodecta*-Arten unterscheiden sich in folgender Weise:

1. Flügel stark bräunlich verdunkelt, gegen das Ende lichter; Hüften und Schenkel schwärzlich; Körper schwarz; Scheitel um die Hälfte breiter als lang.

1. *E. pumilus* Kl. ♂ ♀.

— Flügel hyalin, höchstens unter dem Stigma etwas verdunkelt. Beine bleich 2.

2. Flügel mit einer schwach verdunkelten Substigmatalbinde; Körper schwarz; Scheitel kurz, mehr als doppelt so breit als lang.

2. *E. Beckeri* n. sp. ♀.

— Flügel ohne Binde; Hinterleib schmutziggelb; Scheitel doppelt so breit als lang.

3. *E. Gei* Brischke ♂ ♀.

Descriptions of New Genera and Species of Hymenoptera from India.

By P. Cameron.

(Continued.)

Pro- and mesothorax smooth and shining; the scutellum behind and the post-scutellum are finely rugose. Median segment rugosely punctured, running into reticulations behind; on the apex of the mesopleurae, in the middle, is a short deep furrow. Pleurae smooth and shining; the meta-obscurely punctured above and behind; on the apex of the mesopleurae, in the middle, is a short deep furrow. Wings clear hyaline, the stigma fuscous, the nervures darker. Legs testaceous-yellow; the apices of the tibiae darker. The apex of the petiole is aciculated and bears longitudinal striae.

2. *Agathis Latr.*

A. rufoplagiata sp. nov. ♂.

Black, the prothorax, mesonotum, tegulae, a mark on mesopleurae, and tubercles rufous; the 4 anterior tarsi pale testaceous; the anterior tibiae in front dirty testaceous; the palpi black; the wings dark fuscous, the nervures and stigma black. — Length 7 mm.

Hab. Sikkim.

Head and thorax smooth and covered with white pubescence. Scutellum roundly convex; its lowerside, except at the base surrounded by a distinctly bordered furrow; its top is obscure red. The post-scutellum is smooth and shining and has an oblique slope; at its apex beneath is a deep depression, which is broader than long and is rounded at the apex. There are 3 smooth areas on the base of the median segment; the

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterologie](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Konow Friedrich Wilhelm

Artikel/Article: [Ein neuer Entodecta Knw. \(Hym.\). 4-5](#)