

Litteratur. (Dipt.)

Becker, Th., Aegyptische Dipteren. Mittheilungen aus dem zool. Mus. in Berlin. 1903. (Commission R. Friedländer & Sohn).

In kürzester Zeit hat der Verfasser Fortsetzung und Schluss seiner Seite 320 dieser Zeitschrift geschilderten Arbeit folgen lassen. Die Fülle des Stoffes und die Bewältigung desselben ist geradezu bewundernswert und ist besonders der Vortrag der gesamten Litteratur vor jeder Gattung, in welcher eine Neubeschreibung stattfindet, ein Verfahren, das zur Nachahmung nicht genug empfohlen werden kann, so lange uns noch ein grosser Catalog fehlt. 3 prächtige Tafeln unterstützen das Erkennen der folgenden neuen Gattungen und Arten:

Culex longefurcatus (68), *Anopheles antennatus*, *maculicosta* (69), *Chironomus nigrocinctus*, *variotarsatus* (71), *Ceratopogon imparunguis* (72), *flavitarisatus*, *luteicollis*, *puncticollis* (75), *Macroptilum* n. g. *nudum* (77), *Sciara kairensis*, *Simulium griseicollis* (78), *Dilophus africanus* (79), *Syrpitta subtilis* (89), *Pseudodoros* n. g. (*Syrphidarum*) *nigricollis* (92), Tabelle d. G. *Bacha*, *Doros*, *Pseudodoros* und *Spathiogaster*.

Es folgen dann eine Anzahl *Muscinen* und *Anthomyinen*, welche mit Ausnahme von *Lispa* Latr. von P. Stein, Gentlin, bestimmt und beschrieben sind. „*Musca crassirostris* St. (99), *Spilogaster coniformis*, *paradoxalis* St. (102), *Limnophora variegata*, *notabilis* (105) *flavescens*, *multipunctata*, *pallitarsis*, *plumisetata* St. (109), *Atherigona scutellaris* Stein (110);“ *Lispa pectinipes* B. (113), *rigida* B. (115), *Kowarzi*, *halophora* B. (116), *elephantina* B. (117), *armipes* (118), — von dieser Gattung kann die Beckersche Sammlung einige Arten aufzeigen — *Chartophila flavibasis* St., *Coenosia attenuata* St. (121), *Borborus miloticus* (124), *Limosina acrosticalis*, *octisetosa* (127), *Lonchaea cristella* (129), *Meliera nigratarsis* (130), *Myopites variofasciata* (132), *Oxyna parceguttata* (134), *Trypeta incompleta* (135) *planiscutellata* (136), *Schistopterum* n. g. (*Trypetidarum*) *Mochinsi* (137), *Dacus annulatus*, *semisphaereus* (139). *Amydrosoma* n. g. (*Sepsidarum*) *discedens* (141) *Sepsis hintipes*, *fissa*, *niveipennis* (143) *fragilis*, *trilens* (145). *Chloropisca lucidifrons* (146) *Metopostigma* n. g. (*Chloropinarum*) auf *tenuiseta* Lw. *Scolioptthalmus* n. g. (*Chlorop.*) *trapezoides* (147), *Stenophthalmus* n. g. (*Chlorop.*) *ocellatus* (148), *I. agarcceros* n. g. (*Chlorop.*) *megalops* (149), *Assuania* n. g. (*Chlorop.*) *Eurina triangularis* (150), *Crassi-*

seta flavofrontata (151) *trisulcata* (152), *Microneurum* n. g. (*Oscin.*) *maculifrons* (153), *Notonaulax* n. g. (*Oscin.*) *maculifrons*, *setulosa*, *favillacea*, *Anacamptoneurum* n. g. (*Oscin.*) *obliquum* (155). *Ephygrobia radiolata*, *nigrifacies*, *nilotica*, *composita*, *rufithorax*, *fratella*, *electa* (159), *Clasiopa quadripectinata*, *galactoptera* (161), *Atissa kairensis*, *hepaticoloris*, *acrosticalis* (163), hierzu Bestimmungstabelle! *Discomyza vorticis* (164), *Clanoneurum* n. g. (*Ephydrin.*) *infanatum* (165). *Hecamede grisea* (166), *Notiphila setigera* (167), *Actocetor* n. g. (*Ephydr.*) auf *Ephydra margaritata* Wied. (169), *Glenanthe fasciventris* (170), *Hydrellia poecilogastra*, *approximata*, *limosina* (172), *Hyadina fenestrata*, *Scoliocephalus* n. g. (*Ephydr.*) *pallidiseta*, *Asmeringa* n. g. *incernis* (174), *Homalometopus* n. g. (*Ephydr.*) *albiditinctus* (175), *Scutella varifemorata*, *Scatophila farinae* (177), *Oedenops* n. g. (*Ephydr.*) *Isis*, *Elephantinosoma* n. g. (*Ephydr.*) *Chummi*, *perspicendum* (180). *Ochthera pilimana*, *angustitarsis* (182) mit Bestimmungstabelle! *Rhinoessa pictipes* (185), *Aphaniosoma* n. g. (*Geomyz.*) *approximatum* (186), *Ochthiphila inconstans* (187), *Desmameetopa niloticum* (188), *Leptometeopa* n. g. (*Agromyz.*) *rufifrons*, *Agromyza squamata*, *tuberculata*, *piliseta*, *congesta* (190), *Psallidolus* n. g. (*Agromyz.*) *primus* (192).

B. Lichtwardt.

Litteratur. (Hym.)

In *Anales del Museo Nac. de Buenos Aires*, Tomo 7, Ser. 2 (1902) beschreibt C. Schrottky folgende südamerikanische Hymenoptern als neu: *Macroceros argentina* p. 309, *mephistophelia* p. 310; *Meliphila* n. g. *Ipomoeae* p. 311; *Centris Lynchi* p. 312; *Agapostemon aeneus* p. 313; *Pepsis Venturii* p. 313, *intermedia* p. 314; *Megacilissa metatarsalis* p. 317; *Campeoleuca mystica* p. 318; *Epicharis Burmeisteri* p. 320; *Meliphila mattogrossensis* p. 326.

Ebenda Tercera Serie, Tom I (1902) werden von J. Brèthes folgende neue Chrysiden beschrieben: *Ellampus minutissimus* p. 265; *Holopyga Boutheryi* p. 267; *Chrysis Schrottkyi* p. 270, *missionera* p. 273, *Ameglinoi* p. 274, *Boutheryi* p. 278, *mattogrossensis* p. 279, *Lynchi* p. 282, *charruana* p. 283, *Bruchi* p. 285; *Parnopes Boutheryi* p. 287.

Fr. W. Konow.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterologie](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Lichtwardt Bernhard

Artikel/Article: [Litteratur. \(Hym.\). 47-48](#)