

## Neue Bienen der orientalischen Region. (Hym.)

Von H. Friese, Jena.

1. *Megachile bigibbosa* n. sp. ♀. *Nigra, vix nigro-hirta, ut M. biroï, sed thorace postice et segmento 1. vix albo-hirtis; clypeo apice truncato, medio bigibboso; capite thoraceque evidenter rugulosis; scopa albida, apice nigra; metatarso angustiore et cylindrico.*

Der *M. biroï* ähnlich, aber die weisse Behaarung auf Mittelsegment und Segment 1 nur angedeutet; Clypeusrand ganz gerade, aber mitten mit 2 Höckern; Kopf und Thorax grob gerunzelt; Mesonotum wie bei *M. rugicollis* tief und quergerunzelt, matt. Segment 1 mit nur einzelnen langen weissen Haaren, an der Basis grob und einzeln punktirt, Endrand fast glatt; Scopa weissborstig, auf der Endhälfte von Segment 5 und das 6. ganz schwarz. Beine schwarz, weisslich behaart, Metatarsus cylindrisch, kaum  $\frac{1}{2}$  so breit als die Tibie. Flügel schwarzbraun, mit violettem Schimmer und hyaliner Basis. — L. 12–13 mm. Br.  $3\frac{1}{2}$  mm.

♀ von Lombok durch *Fruhstorfer* erhalten.  
Sunda-Archip.

2. *Megachile amputata*, var. *rufescens* n. var. ♀. Wie *M. amputata*, aber Abdomen ganz rotgelb befilzt, auf Segment 5 nur noch einzelne schwarze Haare hervorragend. — L. 13–13 $\frac{1}{2}$  mm.

♀ von Deli auf Sumatra (*Martin*) im Mus. Berlin.

3. *Megachile semperi* n. sp. ♀. *Nigra, sparsim fulvo-hirta; capite thoraceque punctatis, nitidis; clypeo sinuato; segmento 1. piloso. 2.–5. albido-fimbriatis, scopa albida, apice nigro; alis flavidis.*

Schwarz, sparsam gelbbraun behaart; Kopf und Thorax sparsam punktirt, glänzend; Clypeus schwach ausgebuchtet, ganzrandig, mit gerundeten Ecken und glattem Mittelfeld; Mandibel stumpf 4-zählig; Segment 1 lang gelblich behaart, 2–6 sparsam schwarz behaart, 2–5 mit weisslicher Fransenbinde, die mitten meist schmaler ist; Scopa weisslich, auf dem Endrand vom 5. und das ganze 6. schwarzbraun. Beine schwarz, weisslich behaart, Calcar gelblich, Metatarsus von Tibienbreite. Flügel gelblich, mit dunklem Rande, Adern und Tegulä braun. — L. 11–12 mm. Br. 4 mm.

♀ von den Karolinen [Yap]; im Mus. Berlin 2 ♀ von den Palau-Inseln (*Semper*).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterologie](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Friese Heinrich [Friedrich August Karl Ludwig]

Artikel/Article: [Neue Bienen der orientalischen Region. \(Hym.\). 17](#)