© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Neue Bienen der orientalischen Region. (Hym.)

Von H. Friese, Jena.

1. **Megachile bigibbosa** n. sp. ♀. *Nigra, vix nigro-hirta, ut M. biroi, sed thorace postice et segmento* 1. *vix albo-hirtis; clypeo apice truncato, medio bigibboso; capite thoraceque evidenter rugulosis; scopa albida, apice nigra; metatarso angustiore et cylindrico.*

Der *M. biroi* ähnlich, aber die weisse Behaarung auf Mittelsegment und Segment 1 nur angedeutet; Clypeusrand ganz gerade, aber mitten mit 2 Höckern; Kopf und Thorax grob gerunzelt; Mesonotum wie bei *M. rugicollis* tief und quergerunzelt, matt. Segment 1 mit nur einzelnen langen weissen Haaren, an der Basis grob und einzeln punktirt, Endrand fast glatt; Scopa weissborstig, auf der Endhälfte von Segment 5 und das 6. ganz schwarz. Beine schwarz, weisslich behaart, Metatarsus cylindrisch, kaum $^1/_2$ so breit als die Tibie. Flügel schwarzbraun, mit violettem Schimmer und hyaliner Basis. — L. 12—13 mm. Br. $3^1/_2$ mm.

♀ von Lombock durch *Fruhstorfer* erhalten.

Sunda-Archip.

2. *Megachile amputata*, var. **rufescens** n. var. ♀. Wie *M. amputata*, aber Abdomen ganz rotgelb befilzt, auf Segment 5 nur noch einzelne schwarze Haare hervorragend. — L. 13—$13^1/_2$ mm.

♀ von Deli auf Sumatra *(Martin)* im Mus. Berlin.

3. **Megachile semperi** n. sp. ♀. *Nigra, sparsim fulvo-hirta; capite thoraceque punctatis, nitidis; clypeo sinuato; segmento* 1. *piloso.* 2.—5. *albido-fimbriatis, scopa albida, apice nigro; alis flavidis.*

Schwarz, sparsam gelbbraun behaart; Kopf und Thorax sparsam punktirt, glänzend; Clypeus schwach ausgebuchtet, ganzrandig, mit gerundeten Ecken und glattem Mittelfeld; Mandibel stumpf 4-zähnig; Segment 1 lang gelblich behaart, 2—6 sparsam schwarz behaart, 2—5 mit weisslicher Fransenbinde, die mitten meist schmaler ist; Scopa weisslich, auf dem Endrand vom 5. und das ganze 6. schwarzbraun. Beine schwarz, weisslich behaart, Calcar gelblich, Metatarsus von Tibienbreite. Flügel gelblich, mit dunklem Rande, Adern und Tegulä braun. — L. 11—12 mm. Br. 4 mm.

♀ von den Karolinen [Yap]; im Mus. Berlin 2 ♀ von den Palau-Inseln *(Semper)*.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterologie

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: 5

Autor(en)/Author(s): Friese Heinrich [Friedrich August Karl Ludwig]

Artikel/Article: Neue Bienen der orientalischen Region. (Hym.). 17