

## Neue südamerikanische Lophyrini. (Hym.)

Von Fr. W. K o n o w , p.-Teschendorf.

### 1. Gen. *Acorduleceros* Say.

1. *A. cestatus* n. sp. ♀. *Niger*; *mandibularum basi, labro, clypeo, antennarum articulo primo, abdominis basi (segmentis 1. et 2.), pedibus e luteo albidis; coxis basi nigro-maculatis; tarsorum apice et femoribus — genibus et summa basi exceptis — nigris; mesopleurorum summo apice albo; alarum superiorum dimidio basali hyalino, apicali fusco; venis et stigmatate nigris; alis inferioribus hyalinis, summo apice vix infuscatis.*

Elongatus, nitidus; facie et mesopleuris longius cano-, sincipite et pronoto fusco-pilosis; mesonoto fere glabro; capite pone oculos angustato; palpibus nigris, maxillaribus elongatis; clypeo late truncato; antennis nigro-pilosis, thoracem longitudine fere aequantibus; articulo tertio ceteris longiore, 4<sup>o</sup> et 5<sup>o</sup> inter se aequilongis; sexto paullo longiore et setam longiorem ferente; fovea supraantennali lata sed non profunda; vertice convexo, longitudine sua fere duplo latiore; scutello subconvexo, non marginato; alarum superiorum cellula 2. cubitali primum radii segmentum longitudine superante; nervo areali tertiam partem cellulae discoidalis decedente; vagina non exserta, valvulis apice contiguus. — Long. 7 mm.

Patria: Brasilia (Pará, Oyapock).

2. *A. thoracalis* n. sp. ♂ ♀. *Niger*; *ore, facie inferiore, antennarum 2 articulis basalibus, thorace, pedibus pallide rufis; palpibus, mesopleuris, tibiis, tarsorum basi albicantibus; tarsorum anticorum tribus, posteriorum 4 articulis apicalibus nigris; scutello magis minusve obscurato; feminae ventre — apice excepto — magis minusve pallido; alis fuscescentibus; venis et stigmatate fuscis.*

Ovatus, nitidus; facie longius albido-, sincipite nigro-, pronoto et mesonoto fusco-pilosulis; mesopleuris pallido-pubescentibus; capite pone oculos fortiter angustato, occipite emarginato; clypeo truncato; antennis thoracem longitudine fere aequantibus, nigro-pilosis, apicem versus

fortiter compressis, apice seta longiore ornatis; articulo secundo latitudine sua sesqui longiore; tertio quartum longitudine sesqui superante; 4., 5., 6. inter se aequilongis, fovea supraantennali profundiore; vertice longitudine sua triplo latiore; scutello subdeplanato, non marginato; abdominis fissura dorsali maxima; segmento primo fere nullo; alarum superiorum cellula 2. cubitali primum radii segmentum longitudine fere superante, nervum 2. medialem in medio excipiente; nervo areali cellulae discoidalis tertiam partem decedente; tarsorum posticorum metatarso ceteros articulos unitos longitudine maris aequante, feminae superante; maris articulo 4<sup>o</sup> tarsorum posticorum superne super unguem producto et tertium articulum longitudine fere superante; maris ventre nigropilosulo; valvula anali apicè truncata; feminae vagina subexserta, mediocri, apice rotundata. — Long. 4 mm.

Patria: Brasilia (Pará).

3. **A. illotus** n. sp. ♀. *Luteus; capite supraantennali, pronoti, mesopleurorum, pectoris lituris, metapleuris, abdominis dorso — ano excepto —, tarsorum posteriorum 3 articulis apicalibus nigris; tarsis anticis apicem versus fuscis; mesopleurorum superiore parte et pedum tibiis metatarsisque albicantibus; thoracis dorso rufescente; scutelli apice nigricante; antennarum 2 articulis basalibus luteis, tertio nigro, 3 ultimis obscure luteis; alis hyalinis, venis et stigmatibus fuscis.*

Ovatus, nitidus; facie albido-, sincipite, pronoto, mesonoto tenerrime fusco-, mesopleuris cano-pilosulis; capite pone oculos fere truncato; clypeo truncato; antennis fusco-pilosis, thorace brevioribus; articulo secundo fere cubico; articulis insequentibus inde a tertio gradatim longitudine decrescentibus; ultimo apice compresso et setam longiorem gerente; fovea supraantennali vix impressa; vertice longitudine sua plus quam duplo latiore; scutello subdeplanato et submarginato; abdominis fissura dorsali magna; segmento primo fere nullo; alarum superiorum cellula 2. cubitali primum radii segmentum longitudine superante, nervum 2. medialem ante medium excipiente; nervo areali ante medium cellulae discoidalis sito; feminae vagina non exserta. — Long. 3,5 mm.

Patria: Brasilia (B. Trombetas, Oriximiná).

4. **A. spathulatus** n. sp. ♂. *Niger; ore, antennarum 2 articulis basalibus, pectore toto, mesopleuris, ventris*

*basi, pedibus ex albido flavidis; tarsis apice fuscis; alis hyalinis, venis et stigmatibus fuscis.*

Ovatus, nitidus; facie et mesopleuris cano-, sincipite et mesonoto sparsim fusco-pilosulis; capite pone oculos fere truncato; clypeo apice late rotundato; antennis — articulis 2 basalibus luteis exceptis — fuscis, fusco-pilosis, non compressis, thorace brevioribus; articulo secundo latitudine sua paullo longiore; tertio quartum longitudine sesqui superante; quarto et sexto inter se aequilongis; quinto paullo brevioribus; ultimo longe acuminato et setam longam gerente; fovea supraantennali profundius impressa; vertice longitudine sua fere quadruplo latiore; scutello subdeplanato, non marginato; abdominis fissura dorsali magna, segmento primo fere nullo; alarum superiorum cellula 2. cubitali primum radii segmentum longitudine aequante, nervum secundum medialem mox ante medium excipiente; nervo areali paullo ante medium cellulae discoidalis sito; tarsis 4 posterioribus medio incrassatis, metatarso ceteros articulos unitos longitudine multo superante, articulo quarto superne ad spathae instar producto unguem longitudine aequantis; valvula anali apice anguste rotundata. — Long. 3,3 mm.

Patria: Brasilia (Oyapock).

5. **A. calceolatus** n. sp. ♀. *Sulphureus; capite supraantennali, antennis — articulo primo excepto —, mesonoto, tegulis, abdominis dorso anoque, tarsorum 4 articulis apicalibus nigris; scutello et postscutello maiore parte pallidis; pedum intermediorum metatarso apicem versus infuscato; alis hyalinis, venis et stigmatibus fuscis.*

Elongato-ovatus, nitidus; facie et mesopleuris cano-, sincipite et mesonoto nigro-pilosulis; capite pone oculos fortiter angustato; occipite submarginato; clypeo truncato; antennis nigro-pilosis, abdomen longitudine aequantibus, apice compressis; articulo secundo nigro, latitudine sua sesqui longiore; tertio quartum longitudine paullo superante; 4., 5., 6. inter se fere aequilongis; ultimo apice acuminato et seta longiore ornato; fovea supraantennali deleta; vertice longitudine sua fere triplo latiore; abdominis fissura dorsali magna, segmento primo fere nullo; scutello subdeplanato, non marginato; alarum superiorum cellula 2. cubitali angusta, radii segmentum primum longitudine aequante, nervum 2, medialem ante medium excipiente; nervo areali paullo ante medium cellulae discoidalis sito; vagina non exserta. — Long. 5 mm.

Patria: Brasilia (Oyapock).

6. **A. lituratus** n. sp. ♀. *Pallide sulphureus; capite supraantennali, antennis — articulis 2 basalibus exceptis —, mesonoti lateribus, tegulis, abdominis dorso nigris; tarsorum apice subinfuscato; alis hyalinis, venis et stigmatibus fuscis, costae apice et stigmatibus basi dilutioribus, viridibus.*

Ovatus, nitidus; facie infraantennali et mesopleuris cano-, facie superiore, sincipite, pronoto, mesonoto nigro-pilosulis; capite pone oculos fere truncato, occipite subemarginato; clypeo truncato; antennis nigro-pilosis, thoracem longitudine aequantibus, apicem versus compressis; articulo secundo latitudine sua vix sesqui longiore; tertio quartum longitudine paullo superante; 4., 5., 6. inter se fere aequilongis; ultimo apicem versus acuminato, seta longa apicali gaudente; fovea supraantennali deleta; vertice utrobique vix determinato, longitudine sua plus quam duplo latiore; abdominis fissura dorsali magna, segmento primo fere nullo; alarum superiorum cellula 2. cubitali latitudine sua vix duplo longiore, nervum 2. medialem ante medium excipiente; nervo areali ante medium cellulae discoidalis sito; vagina pallida, non exserta, mediocri. — Long. 3 mm.

Patria: Brasilia (Oyapock).

7. **A. stigmaticus** n. sp. ♀. *Niger; ore, antennis — articulo tertio subinfuscato excepto —, pronoti angulis posterioribus, mesopleurorum parte superiore, abdomine — segmentis 2.—4. dorsalibus exceptis —, pedibus pallide luteis; tibiis posticis et tarsis anterioribus apicem versus, tarsis posticis totis paullulum infuscatis; tegulis fuscis; alis hyalinis, venis fuscis, stigmatibus dimidio basali luteo, apicali fusco.*

Ovatus, nitidus; ore, pronoto, mesopleuris cano-, capite supraantennali et mesonoto fusco-pilosulis; occipite emarginato; clypeo truncato; antennis tenuibus, thorace brevioribus, fusco-pilosis, apicem versus compressiusculis; articulo secundo latitudine sua sesqui longiore; tertio quartum longitudine fere sesqui superante; 4<sup>o</sup> et 6<sup>o</sup> inter se aequilongis; 5<sup>o</sup> brevior; ultimo apicem versus acuminato, apice setam longam gerente; fovea supraantennali deleta; vertice longitudine sua fere duplo latiore; scutello deplanato, acute marginato; abdominis fissura parva et brevi; alarum superiorum cellula 2. cubitali latitudine sua duplo longiore, nervum 2. medialem fere in medio excipiente; nervo areali ante medium cellulae discoidalis sito; vagina non exserta. — Long. 3,7 mm.

Patria: Brasilia (Pará).

8. **A. gregalis** n. sp. ♂. *Niger*; ore, antennarum 2 articulis basalibus, ventris basi, pedibus luteis; tarsis apice fuscis; alis fuscescenti-hyalinis; venis et stigmate fuscis.

Parvus, nitidus; ore et mesopleuris cano-, capite supraantennali, pronoto, mesonoto sparsim nigro-pilosulis; capite pone oculos fortiter angustato; occipite emarginato; clypeo apice late rotundato; antennis — articulis 2 basalibus exceptis — fuscis, nigro-pilosis, tenuibus, thorace brevioribus; articulo secundo latitudine sua parum longiore; tertio quartum longitudine non sesqui superante; 4., 5., 6. inter se aequilongis; ultimo apicem versus compresso; seta apicali brevi; fovea supraantennali deleta; vertice vix determinato, longitudine sua plus quam duplo latiore; scutello deplanato, vix marginato; abdominis fissura dorsali magna; tarsorum posteriorum articulis 3. et 4. subincrassatis; quarto non producto; alarum superiorum cellula 2. cubitali latitudine sua sesqui longiore, nervum 2. medialem in medio excipiente; nervo areali tertiam cellulae discoidalis partem decedente; valvula anali nigropilosa, apice rotundata. — Long. 3,3 mm.

Patria: Brasilia (Pará).

9. **A. rudis** n. sp. ♀. *Niger*; ore, antennarum 2 articulis basalibus, pronoti marginibus, tegulis, pectore medio, ventre, pedibus testaceis; abdominis dorso fusco, basin versus dilutiore, apicem versus obscuriore; tarsis apice fuscis; alis hyalinis; venis et stigmate fuscis.

Ovatus, nitidus; facie, mesonoto, mesopleuris cano-, sincipite et pronoti medio fusco-pilosulis; capite pone oculos fortiter angustato; occipite subemarginato; clypeo apice rotundato-truncato; antennis — articulis 2 basalibus exceptis — fuscis, breviter fusco-pilosulis, thorace brevioribus, non compressis et sine seta apicali; articulo secundo latitudine sua parum longiore; tertio 4<sup>o</sup> fere brevior; articulis 3 apicalibus longitudine paullulum decrescentibus; fovea supraantennali lata sed non profunde impressa; vertice crasso, sparsim punctulato, longitudine sua paullulum latiore; scutello subdeplanato, acute marginato; abdominis fissura dorsali maiore; segmento 1<sup>o</sup> brevi; alarum superiorum cellula 2. cubitali latitudine sua duplo longiore, radii segmento primo brevior, nervum 2. medialem fere in medio excipiente; nervo areali paullulum ante medium cellulae discoidalis sito; vagina non exserta, crassa, apice pilosa et late excisa. — Long. 4 mm.

Patria: Brasilia (Obidos).

10. **A. russatus** n. sp. ♂ ♀. *Rufus; capite cum palpis et antennis, mesonoti lobo medio maiore parte, loborum lateralium lateribus, scutelli apice, interdum toto mesonoto cum scutello, tegulis, abdominis apice, pedum tibiis tarsisque nigris; tibiis anticis antice magis minusve rufatis; labro et clypeo interdum magis minusve pallidis; alis obscure fuscis, venis et stigmatate concoloribus.*

Ovatus, nitidus; ore cano-, capite supraantennali, pronoto, mesonoto fusco-pilosulis; mesopleuris cano-pubescentibus; capite pone oculos brevi, fortiter angustato; occipite subemarginato; clypeo apice truncato; antennis crassiusculis, nigro-pilosis, thoracem longitudine aequantibus; articulo secundo cubico; tertio 4<sup>o</sup> brevior; quarto et quinto inter se aequilongis; ultimo brevior, apice oblique truncato; fovea supraantennali vix impressa; vertice longitudine sua plus quam duplo latiore; scutello subdeplanato, non marginato; abdominis fissura dorsali magna; alarum superiorum cellula 2. cubitali primam longitudine fere aequante, nervum 2. medialem ante medium excipiente; nervo areali fere medium cellulae discoidalis attingente; maris valvula anali breviter nigro-pilosa, apice truncata; feminae vagina crassiuscula, apice pilosa et late emarginata. — Long. 3–4 mm.

Patria: Brasilia (Pará, Obidos, Oyapock, Tabatinga).

11. **A. bigrammatus** n. sp. ♂ ♀. *Rufus; antennis — articulis 2 basalibus exceptis —, mesonoti 2 lineis lateralibus, tegulis, tarsis posticis nigris; tarsis anterioribus et tibiis posticis apicem versus fuscatis; maris abdominis dorso apicem versus infuscato; alis fuscis, venis et stigmatate concoloribus; costae apice et stigmatate pallidioribus.*

Ovatus, nitidus; facie et mesopleuris cano-, sincipite et mesonoto breviter fusco-pilosulis; capite pone oculos fortiter angustato; occipite fere truncato; clypeo apice rotundato-truncato; antennis crassiusculis, nigro-pilosis, thoracem longitudine aequantibus; articulo secundo cubico; tertio 4<sup>o</sup> brevior, ultimum longitudine aequante; quarto et quinto inter se fere aequilongis; fovea supraantennali lata, vix impressa; vertice longitudine sua sesqui latiore; scutello convexiusculo, non marginato; abdominis fissura dorsali magna; alarum superiorum cellula 2. cubitali latitudine sua plus quam duplo longiore, nervum 2. medialem ante medium excipiente; nervo areali ante medium cellulae discoidalis sito; maris valvula anali brevissime fusco-

pilosula, apice truncata; feminae vagina non exserta, crassiuscula, apice emarginata. — Long. 4–5 mm.

Patria: Brasilia (Pará).

12. **A. ricatus** n. sp. ♀. *Rufus; capitis maiore parte, antennis — articulis 2 basalibus exceptis —, mesonoti 2 vittis lateralibus, tegulis, segmentorum abdominis dorsalium 7. et 8. maculis lateralibus, tibiis posterioribus — summa basi excepta —, tarsis omnibus nigris; ore et facie — parte superiore excepta — rufis; alis fuscis; venis et stigmatate concoloribus.*

Elongato-ovatus, nitidus; facie cano-, sincipite, pronoto, mesonoto fusco-pilosulis; mesopleuris cano-pubescentibus; capite pone oculos fortiter angustato; occipite late emarginato; clypeo apice rotundato; antennis nigropilosis, thoracem longitudine aequantibus; articulo secundo cubico; tertio 4<sup>o</sup> fere brevior; ceteris inde a quarto longitudine decrescentibus; ultimo apice compresso; fovea supraantennali fere deleta; vertice longitudine sua plus quam duplo latiore; scutello non marginato; abdominis fissura dorsali brevi; alarum superiorum cellula secunda cubitali 1<sup>a</sup> vix brevior, nervum 2. medialem paullulum ante medium excipiente; nervo areali in medio cellulae discoidalis sito; vagina rufa, non exserta, crassa, apice late et profunde excisa. — Long. 6 mm.

Patria: Peru (Pachitea).

13. **A. inglorius** n. sp. ♂. *Niger; ore, pedibus, ventris basi pallide testaceis; tarsis anticis et tibiis posticis apicem versus infuscatis; tarsis intermediis apice et posticis totis nigris; tegulis pallide fuscis; alis hyalinis; venis et stigmatate fuscis.*

Parvus, minus nitidus; capite et mesonoto brevissime fusco-pilosulis; mesopleuris cano-pubescentibus; facie, sincipite, mesonoto subtiliter punctulatis; capite pone oculos fortiter angustato; occipite fere truncato; clypeo subemarginato-truncato; antennis thorace fere longioribus, breviter nigro-pilosis; articulo 2<sup>o</sup> latitudine sua vix longior; ceteris inter se fere aequilongis; ultimo apice obtuso; foveola supraantennali punctiformi; vertice longitudine sua plus quam duplo latiore; scutello deplanato, acute marginato; abdominis fissura dorsali parva; alarum superiorum cellula 2. cubitali angusta, 1<sup>a</sup> multo brevior, nervum 2. medialem ante medium excipiente; nervo areali paullulum

ante medium cellulae discoidalis sito; valvula anali cano-pubescente, apice rotundata. — Long. 3,5 mm.

Patria: Bolivia (Mapiri).

14. **A. cervicatus** n. sp. ♀. *Rufus; capite cum palpis et antennis, pronoti medio, mesonoti lobo medio — apice excepto —, abdominis apice extremo, pedum tibiis tarsisque nigris; scutelli apice, postscutello, abdominis dorso apicem versus, femoribus anticis magis minusve fuscatis; alis fuscis, venis et stigmatibus nigro-fuscis.*

Ovatus, nitidus; facie cano-, sincipite fusco-, mesonoti parte anteriore nigro-pilosulis; capite pone oculos fortiter angustato; occipite late emarginato; clypeo truncato; antennis nigro-pilosis, thoracem longitudine aequantibus; articulo secundo latitudine sua vix longiore; 3., 4., 5. inter se fere aequilongis; ultimo multo brevior, 2° vix longior; fovea supraantennali conspicua; vertice longitudine sua sesqui latiore; scutello non marginato; abdominis fissura dorsali magna; alarum superiorum cellula prima cubitali 2<sup>a</sup> sesqui longior; nervo 2. mediali paullo ante medium cellulae 2. cubitalis, nervo areali ante medium cellulae discoidalis sitis; vagina crassa, apice pilosula et late emarginata. — Long. 4 mm.

Patria: Brasilia (Itaituba).

15. **A. tegularis** n. sp. ♀. *Pallide testaceus; capite, antennis, tegulis, ano extremo, pedum tibiis tarsisque nigris; ore, palpis, antennarum articulo primo, scutelli apice obscure fuscis; tibiis anticis antice luteis; alis fuscis, venis nigricantibus, stigmatibus dilute fusco.*

Ovatus, nitidus; facie cano-, sincipite, pronoto, mesonoto nigro-, mesopleuris luteo-pilosulis; capite pone oculos fortiter angustato; occipite truncato; clypeo apice truncato-rotundato; antennis nigro-pilosis, thoracem longitudine aequantibus; articulo secundo cubico; tertio 4° brevior; 4° et 5° inter se aequilongis; ultimo quinti dimidium longitudine vix superante, apice oblique truncato; fovea supraantennali deleta; vertice longitudine sua sesqui latiore; scutello subdeplanato, acute marginato; alarum superiorum cellula 2. cubitali primam longitudine aequante, nervum 2. medialem ante medium excipiente; nervo areali paullulum ante medium cellulae discoidalis sito; vagina crassiuscula, apice pilosula et bis excisa. — Long. 5 mm.

Patria: Brasilia (Barcellos).



16. **A. pallidus** n. sp. ♂. *Pallide testaceus; abdominis dorso utrobique magis minusve fusco-liturato; tibiis tarsisque posticis fuscis; alis subfuscescenti-hyalinis; venis fuscis; costa et stigmatate pallide luteis.*

Ovatus, nitidus; facie et mesopleuris luteo-, sincipite et mesonoto fusco-pilosulis; capite pone oculos fortiter angustato; occipite truncato; mandibularum dimidio apicali brunneo; clypeo subrotundato-truncato; antennis fusco-pilosulis, thorace brevioribus; articulis 2 basalibus increasatis, secundo 1<sup>o</sup> fere longiore; 3<sup>o</sup>, 4<sup>o</sup>, 5<sup>o</sup> longitudine vix decrescentibus; ultimo praecedentem longitudine aequante, apice acuminato et pilo brevi apicali ornato; fovea supra-antennali deleta; sincipite acute punctulato; vertice longo, longitudine sua parum latiore, medio subcarinato; mesonoto sparsim punctulato; scutello acute marginato; abdominis fissura dorsali magna; segmento primo fere nullo; alarum superiorum cellula 2. cubitali angusta, 1<sup>a</sup> multo brevior, nervum 2. medialem mox pone basin excipiente; nervo areali ante medium cellulae discoidalis sito; pedum posteriorum metatarso ceteros articulos unitos longitudine superante; valvula anali apice rotundata. — Long. 4 mm.

Patria: Brasilia (Obidos).

17. **A. Schrottkyi** n. sp. ♀. *Niger; palpis, ore, pronoto, tegulis, abdominis segmentis 2–4 dorsalibus, quinti et sexti lateribus, ventris basi, pedibus testaceis; coxarum basi et pedum posteriorum tibiis — basi excepta — tarsisque nigris; femoribus medio magis minusve nigro-marginatis; tibiis anterioribus medio late, tarsis anterioribus apicem versus fuscis, anticis dilutioribus; sulcis verticalibus obscure testaceo-pellucetibus; alis nigricantibus, subhyalinis; venis nigris, stigmatate concolore, margine interiore pallido.*

Ovatus, nitidus; facie cano-, sincipite et mesonoto fusco-pilosulis; capite pone oculos non angustato; occipite emarginato; clypeo truncato; antennis crassiusculis, nigro-pilosis, capituli latitudinem longitudine aequantibus; articulis 2 basalibus inter se aequilongis, latitudine sua brevioribus; tertio sextum, quarto quintum longitudine aequantibus; tertio basi fortiter angustato; sexto fusiformi; fovea supra-antennali profunda; vertice crasso, longitudine sua paullulo latiore; scutello subdepresso, late et acute marginato; margine rufescente; abdominis fissura dorsali fere nulla; alarum superiorum cellula prima cubitali 2<sup>a</sup> plus quam duplo longiore, basi fortiter dilatata; secunda parva, nervum

2. medialem ante medium excipiente; nervo areali tertiam partem cellulae discoidalis decedente; vagina forcipiformi, apice pilosa. — Long. 5 mm.

Patria: Paraguay (Villa Encarnación).

Vielleicht gehört dazu ein ♂, das in folgenden Stücken abweicht: Rückenschildchen ganz und ein Mesopleuralstreif bräunlichgelb; Hinterleibsrücken ganz schwarz, und die Bauchseite ganz braungelb; Beine fast ganz gelb; nur die Hinterhüften an der äussersten Basis schwärzlich; das Ende der Hintertibien und der hinteren Tarsen braun; Flügel licht gelbbraunlich; Geäder braun, Costa und Stigma gelb, das letztere gegen das Ende bräunlich; Kopf und Thorax kurz bleich behaart. Die plastischen Merkmale sind dieselben wie beim ♀. — L. 4 mm. — Besonders auffällig ist die verschiedene Färbung der Flügel. Gleichwol glaube ich in der Zusammenstellung beider Geschlechter nicht zu irren.

Die Nummern 1—11 und 14—16 sind von Herrn A. *Ducke* gesammelt und mir freundlichst mitgeteilt; No. 17 ist von Herrn *Schrottky* erbeutet und demselben zu Ehren benannt.

## 2. Gen. **Loboceros** Kirby.

1. **L. trinotatus** n. sp. ♀. *Pallide testaceus; antennis — articulis 2 basalibus exceptis —, sincipite, 3 mesonoti vittis trium loborum medium tegentibus, ano, tibiis posticis — tertia parte basali excepta —, tarsis posticis totis nigris; tarsis intermediis apice fuscis; mandibularum apice piceo; alis flavescenti-hyalinis, superiorum quarta parte apicali fusca; venis et stigmatibus testaceis, his apice fuscis; alis inferioribus apicem versus vix infuscatis.*

Elongato-ovatus, nitidus; facie inferiore et mesopleuris cano-, sincipite, pronoto, mesonoto nigro-pilosulis; capite pone oculos fortiter angustato; clypeo apice truncato-rotundato; antennis abdomen longitudine aequantibus, dense nigro-pilosis, apicem versus subincrassatis, apice oblique truncatis; articulis inde a tertio longitudine decrescentibus; vertice longitudine sua duplo latiore; scutello subconvexo, apice submarginato; alarum superiorum cellulis 2. et 3. cubitalibus inter se fere aequilongis; nervo primo mediali cubitum non frangente; nervo areali quartam partem cellulae discoidalis decedente. — Long. 10 mm.

Patria: Brasilia (Oyapock).

Wie die folgende Art von Herrn A. *Ducke* erbeutet. Das Tier stimmt einigermaßen zu der Abbildung, die *W. F. Kirby* von seinem *L. Hippolyte* giebt. Die Beschreibung lautet: „testaceous; antennae except the two basal joints, cheeks, front and centre of mesothorax, the two last joints of the abdomen and the hind tarsi and extremities of the hind tibiae black“. Wo die cheeks liegen, ist nicht ganz klar; wahrscheinlich sind die Schläfen gemeint; wenn aber die cheeks, wo immer sie auch liegen mögen, schwarz sind, so kann der ganze übrige Kopf nicht bleich sein; und die Abbildung zeigt den Oberkopf schwarz; hier wird also wol das „front“ zu suchen sein; denn mancher englische Entomologe hat seinen Scheitel ungefähr auf der Nase und folglich die Stirn am Nacken. Den Thorax trägt in England das Tier auf dem Rücken; mesothorax meint also das Mesonotum; und „the centre black“ soll wol heissen, dass sich schwarze Flecke auf der Scheibe des Mesonotum befinden, denn die Abbildung zeigt einen schwarzen Fleck auf dem Mittellappen, und auf den Seitenlappen 2 am Schildchen zusammenfliessende schwarze Streifen. Bei einigem guten Willen lässt sich also die *Kirbysche* Beschreibung auf die obige Art deuten; aber da auch die cheeks schwarz sein sollen, obige Art aber ausser dem Oberkopf nirgends schwarze Farbe am Kopfe besitzt, die Abbildung auch nicht die Hintertibien bis auf das Basaldrittel schwarz zeigt, so ziehe ich vor, der obigen Art einen besonderen Namen beizulegen.

(Fortsetzung folgt.)

## Ueber die Larve von *Rhadinoceraea nodicornis* *Knw.* (Hym.)

Von Fr. W. K o n o w , p.-Teschendorf.

Herr *H. Klene* in Feldkirch, Vorarlberg hat die Larve der *Rhadinoceraea nodicornis* *Knw.* im dortigen botanischen Garten aufgefunden und mir freundlichst mitgeteilt, sodass es nun möglich ist, dieselbe zu beschreiben. Die Larve lebt auf *Veratrum album* L. und *nigrum* L., sitzt ausgestreckt an den Blättern und zerfrisst dieselben, indem sie zunächst Löcher in der Blattfläche verursacht und die Rippen verschont; später werden auch die Rippen angegriffen und vom Blatt bleiben nur noch Fetzen übrig. Sie ist 22-beinig und wird 14 mm lang. Kopf klein, schwarz, mit sehr kurzen steifen grauen Birst-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterologie](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Konow Friedrich Wilhelm

Artikel/Article: [Neue südamerikanische Lophyrini. \(Hym.\). 337-347](#)