

Eine neue Varietät von *Aspicera scutellata* Vill.

Von Prof. Dr. J. J. Kieffer (Bitsch).

Aspicera scutellata var. **ruficollis** n. var. Von der typischen Art unterscheidet sich diese neue Varietät wie folgt: Stirn von den Antennen bis zu den Ocellen dicht und grob gerunzelt; Kopf ohne andere Leisten als die Stirnleisten; die Leisten des Gesichts nur durch eine grobe unregelmässige Runzel angedeutet; 3. Glied der Antenne dem 4. gleich, 2 mal so lang als dick; Pronotum mit Ausnahme einer Stelle vorn, Propleure, Scutellum mit Ausnahme des Dornes, rot. Körperlänge ♀: 5 mm.
— Spanien (Madrid).

Im Verlage von **Frankenstein & Wagner** in
Leipzig erschien:

Entomologisches Jahrbuch 1907.

— **Kalender für alle Insekten-Sammler.** —

Herausgegeben von Dr. **O. Kranich**, Leipzig.

16. Jahrgang. — Preis geb. 1,60 Mk.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und bei
Einsendung von 1,60 Mk. franko von der Verlagsbuch-
handlung (Leipzig, Lange Strasse 14).

**Die grosse Reichhaltigkeit und Gediegenheit
der Aufsätze sichern diesem Buche einen dauernden
Platz in der entomologischen Literatur.**

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterologie](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Kieffer Jean-Jacques

Artikel/Article: [Eine neue Varietät von *Aspicera scutellata* Vill. 97](#)