

Förster hat wenigstens gefunden, dass *Xorides* ungezähnte Oberkiefer hat, überträgt das nun aber ohne weiteres auch auf *Poemenia*, denn er schreibt auf Seite 170 bei dieser: „Mandibeln ungezähnt, von ungleicher Länge,” während in Wirklichkeit die gleichlangen Oberkiefer von *Poemenia* mit zwei deutlichen Zähnen enden, wovon der untere länger ist. Dieser *Förstersche* Fehler schleppt sich nun bis auf den heutigen Tag in der Literatur fort. Bei *Schmiedeknecht* findet er sich nicht weniger als dreimal (Zool. Jahrbücher, Abt. f. Syst. etc. III. 1888 p. 440 für *Calliclisis* und p. 444 für *Poemenia*; — Opuscula Ichneumonol., Fasc. XVII. 1907 p. 1337 für *Calliclisis*; — Die Hymenopteren Mitteleuropas, 1907 p. 588 für *Calliclisis* und p. 590 für *Poemenia*). Ebenso heisst es bei *Ashmead* (Proc. U. S. Nat. Mus., XXIII, 1900 p. 61 für *Calliclisis* und p. 62 für *Poemenia*): „Mandibles of an unequal length.”

Wie derartige Angaben einen Anfänger, der doch wohl gerade zuerst nach den Arbeiten *Schmiedeknechts* und *Ashmeads* greifen wird, verwirren müssen, ist ohne weiteres klar. Ich möchte daher an die Fachgenossen, ganz besonders aber an die, welche Bestimmungstabellen veröffentlichen, die dringende Bitte richten, weniger nach der Literatur und mehr nach der Natur zu arbeiten, namentlich aber den Angaben in den Arbeiten *Försters* nicht zu sehr zu trauen. Auch wäre es mit grossem Danke zu begrüssen, wenn, vor allem in den Bestimmungstabellen, alle Angaben, die nicht auf eigener Anschauung beruhen, durch den Druck, durch Klammern, durch Anführungsstriche oder sonst auf geeignete Weise kenntlich gemacht würden.

Un Mutillide nouveau d'Afrique.

Par le D. Paul Magretti.

Dans un petit lot d'Hyménoptères provenant du haut Sénégal, propriété de M. Escher-Kündig de Zurich et communiqué à moi pour la détermination par le bien estimé collègue dipterologue Prof. M. Bezzì de Turin, j'ai pu reconnaître une nouvelle espèce de *Mutilla* subg. *Myrmilla*, représentée par un exemplaire unique de sexe femelle dont je viens de donner la description :

Mutilla Lin. subg. *Myrmilla* Wesm.**M. ilgiformis** n. sp. ♀.

Nigro-brunneo-rufa; capite, antennarum scapo et flagelli articulo primo, mandibulis (apice excepto), thorace, segmenti primi abdominalis dimidio basali, ventre maxima parte, pedibusque totis laete rufo-ferrugineo-pictis. Macula subrectangulari in medio margine apicali segmenti primi abdominalis, alteraque ovali mediana, parce distincta in parte postica segmenti secundi dorsali sita, segmento tertio toto, fascia lata quarti segmentoque anali pilis densis aureo-rufescentibus tectis. — Occipite, metanoto, metapleuris pedibusque sparse et magis vel minus longe argenteo-villosis. — Capite thorace latiore, postice in medio occipite fortiter arcuato-excavato, toto longitudinaliter dense et distincte canaliculato-striato; antennarum articulo tertio quartum parum longitudine superante; oculis parvis, ovali-subreniformibus, a mandibularum basi sat remotis; thorace subrectangulari, marginibus laevissime dentato-undulatis, sicut capite longitudinaliter striato-canaliculato; pleuris laevibus, nitidis, postice oblique terminatis, muticis. Abdomine in dorso minutissima punctulato-striato, in ventre laevi et nitido; segmento anali convexo, nitido, area pygidiali nulla; tibiarum spinulis rufescentibus, calcaribus albis. — Long. 6 mm.

Mutillae Ilgi André (Rev. d' Ent. Oct. 1893 pag. 220 n. 11) valde similis et affinis.

Hab. Sénégal superum.

Petite jolie espèce qui pourrait bien se référer au premier coup d'œil à *M. Ilgi André* (loc. cit.), appartenant aussi au subg. *Myrmilla* Wesm., caractérisée par les grandes dimensions transversales de la tête, par l'absence d'onglet scutellaire et d'aire pygidiale, etc. etc. Cette nouvelle espèce diffère de *M. Ilgi* par les dimensions bien plus petites du troisième article des antennes, qui est à peine un peu plus long que le quatrième, par ses yeux pas très grands, ovalaires, légèrement réniformes; par les bords latéraux du thorax parallèles avec des dentelures à peine prononcées dans la moitié antérieure; par le thorax obliquement descendant en arrière, sans aucune dent spiniforme sur la ligne de jonction (à peine remarquable) entre la face dorsale et la postérieure, et enfin par la face ventrale du premier segment abdominal sans dent saillante.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipteronologie](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Magretti Paul

Artikel/Article: [Un Mutillide nouveau d'Afrique. 175-176](#)