

## Aberrative Formen von *P. apollo* Eversm.

Es besteht hier nicht die Absicht das Lepi-  
topteren Register mit neuen Namen zu belasten, son-  
dern unseren Mitglieder und Lesern die Aberra-  
tivität des Spezies vor zu führen. Auf unserer Ab-  
bildung Tafel 1 sind die Adern zu stark hervor-  
tretend. Die Färbung stammen vom Naryn und  
sind zu 50% die Var. decolor Schultz, mit einfar-  
big schwarzen Vflgl. Flecken. Figur 2 und 3 zeigt  
uns diese Abart. Unsere 4 Abbildungen sind  
männl. Exemplare und im Besitze des Herrn  
E. Mayer aus Strebersdorf b. Wien, welcher so  
freundlich war, uns dieselben zur Verfügung  
zu stellen.

Fig. 1 Hat gedrungeneren runden Vflgl. Schnitt und  
grosse nahe beieinander stehende Costalflecke  
in der Zelle. Submarginalflecken nicht beson-  
ders groß. Der Habitus dieses Falters erinnert  
uns an den, von *P. apollo*.

Fig. 2 Zeigt ein Exemplar mit grossen radial  
verlängerten Submarginalflecken.

Fig. 3 Ein Zwerg Exemplar mit wenig schwar-  
zer Zeichnung. Der mittlere Costalfleck je-  
seits der Zelle fehlt.

Fig. 4 Hat ziemlich starke schwarze Zeich-  
nung mit rotgekernten Costalflecken. Von  
zirka 100 männl. Exemplaren wies nur  
1 Stück diese Eigenschaft auf.

## *Callinorpha dominula* L. und sein Formenkreis. Tafel 2.

Um von den interessanteren Abar-  
ten und Variationen dieser Art ein einfas-  
sendes Bild zu geben, wollen wir nach Mög-  
lichkeit versuchen sämtliche markant  
hervortretende Formen dieser Art aus

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift der Entomologischen Tischgesellschaft Meidling](#)

Jahr/Year: 1924

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Aberrative Formen von P. apollonius Eversm. 2](#)