

Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1907.

Von **J. Gerhardt** — Liegnitz.

Abkürzungen: G. = Gerhardt. K. = Rektor Kolbe — Liegnitz.

Rtrr. = Kaiserlicher Rat Reitter — Paskau i. Mähren. Schr. = Lehrer Schreiber
in Neusalz. v. V. = Amtsrichter von Varendorff — Guhrau.

1. *Dyschirius bacillus* Schaum. Guhrau (v. V.) 1 Ex.
Fleischer det.
2. *Tachys micros* Fisch. Im feinen Ufersande der Katz-
bach b. Liegnitz n. s. und wohl weiter verbreitet. Bisher als
unausgefärbte Stücke des *Tachys bistriatus* angesehen. (G.)
Tachys bistriatus a. *rufulus* Rey. An gleichem Ort wie
voriger; auch an den Seen b. Liegnitz. Seltener als *micros*. (G.)
Dytiscus circumcinctus v. *♀ dubius* Gyll. Liegnitz (G.).
Dytiscus circumflexus v. *perplexus* Lac. Liegnitz (G.).
3. *Tachinus marginatus* Gyll. Spindelmühl i. Riesengeb.
(G.). Rodeland (Lehrer Tischler) unter Laub von Sträuchern
in Gärten. s. s.
Atheta fungi a. *fuscicornis* Kolbe. Liegnitz (K.).
Die meisten Stücke des Wiener Hofmuseums von *A. orbata*
gehören hierher (G.).
4. *Agathidium bescidium* Rtrr. Beskiden (Rtrr.).
5. *Ptiliolum Sahlbergi* Flach. An Wildfutter, Pilzen
und Rehaas n. s. Kiewewald i. Rsg. (K.).
6. *Ptiliolum fuscum* Er. Galt bisher als Var. v. *Spencei*
Allib. Liegnitz: Vorderheide (5. K.), Rabengeb.: Ullers-
dorf, in Wildfutterresten (G. 7).

7. *Ptiliolum Schwarzii* Flach. An ausgelegtem Aase kleinerer Tiere. Liegnitz: Forst Rehberg (5. 6.) hfg. und Riesengeb.: Kiewald (7.) einzeln. (K.).
Cercyon pygmaeus v. *merdarius* Sturm. Liegnitz: Pantener Höhen, aus Kiefernadeln gesiebt. (G.)
8. *Trichodes favarius* Illig. Lüben und Freistadt, auf Schirmblüten s. 6. 7. (Schr.).
Trichodes favarius a. *Schreiberi* Gerh. Die ganze Oberseite rotgelb behaart. Größe der Stammform. Lüben: Groß-Krichen 1 Stck. (Schr.). Nach meinem lieben Collegen Lehrer Schreiber in Neusalz benannt.
9. *Monotoma testacea* Motsch. Liegnitz, in Gras- und Stroh-Composthaufen, in Petersilienjäte, zuweilen zahlreich. 7—9 (G.).
Monotoma longicollis v. *quadrioveolata* m. Das Halsschild besitzt außer den beiden Basal-Eindrücken noch 2 Apical-Eindrücke. Mit der Stammform in verschimmeltem Compost. Liegnitz: vor Weißenrode. 10. (G.). 1 Stck., sehr klein.
11. *Cis punctulatus* Gyll. Beskiden (v. V.).
12. *Anommatus duodecimstriatus* Müll. Unter faulendem Stroh. Liegnitz: Weißenrode. 1 Stck. 6. (K.).
13. *Cardiophorus rufipes* Geoffr. Unter Buchenrinde. Groß-Wartenberg b. Neusalz. 1 Stck. 28. 3. 07. (Schr.).
14. *Ptinus bescidicus* Rtrr. Beskiden (Rtrr.).
Psylliodes picina v. *bicolor* m. Halsschild rotgelb, Decken schwarzbraun. 1 Stck. Liegnitz. (G.)
15. *Aphthona Czwalinae* Ws. Guhrau, auf *Euphorbia esula*, mehrfach (v. V.).
16. *Dibolia rugulosa* Rdtb. Guhrau ss. (v. V.).
17. *Microcopes uncatu*s Friv. Früher für *Cotaster uncipes* gehalten. Lähn, unter schimmelndem Weißbuchenlaub. (G.).
Cotaster ist nicht schlesisch.
Gymnetron veronicae Germ. a. *nigrum* Hardy. mit der Stammform b. Liegnitz (G.).

Nachtrag:

18. *Cryptophagus punctipennis* Bris. Quanzendorf (Gb.).
 Galt früher als v. von *C. pilosus* Gyll.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [JH_1](#)

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: [Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1907 7-8](#)