

Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1907,

geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae von 1906.

Von **J. Gerhardt** — Liegnitz.

Abkürzungen: Gb. = Gabriel, Generalmajor z. D.—Neisse. G. = Gerhardt, Oberlehrer a. D.—Liegnitz. Schr. = Schreiber, Lehrer—Neusalz. Sch. = Schubert, Dr. med.—Hirschberg. S. = Sokolowsky, Rentner—Liegnitz. T. = Tischler, Lehrer—Rodeland, Kr. Ohlau. v. V. = von Varendorff, Amtsrichter — Guhrau.

Vorbemerkung. Es sind nur Arten aufgenommen, die mir vorlagen oder deren richtige Bestimmung zweifellos erschien.

Bei Guhrau (v. V.):

Dyschirius politus Dej.; *Coelambus impressopunctatus* v. *lineellus* Gyll.; *Phyllodrepa ioptera* Steph.; *Stenus fornicatus* Steph.; *Quedius scintillans* Grav.; *Euryporus picipes* Payk.; *Bolitobius speciosus* Er.; *Bryocharis cingulata* Mnnh., *formosa* Grav.; *Habrocérus capillaricornis* Grav.; *Falagria thoracica* Curt.; *Calodera uliginosa* Er., *riparia* Er.; *Aleochara ruficornis* Grav., *erythroptera* Grav.; *Colon affine* Strm., *muri-num* Kr., *viennense* Hbst.; *Triarthron Märkeli* Schmidt; *Liodes cinnamomea* Pz., *flavescens* Schmidt; *Saprinus virescens* Payk., *metallicus* Hbst.; *Acritus minutus* Hbst.; *Spercheus emarginatus* Schall.; *Cantharis pulicaria* F.; *Troglops*

albicans L.; Haplocnemus impressus; Cryptophagus Thoms. Rtt., umbratus Er.; Enicmus brevicornis Mnnh.; Coxelus pictus Strm.; Pryonocyphon serricornis Müll.; Globicornis marginata Payk.; Dicerca alni Fisch.; Phaenops cyanea F.; Anthaxia morio F.; Coraebus undatus F.; Agrilus aurichalceus Rdtb.; Xyletinus ater Pz., laticollis Dft.; Anitys rubens Hoffm.; Sphaeriestes bimaculatus Gyll., foveolatus Ljungh; Mordellistena abdominalis F.; Orchesia fasciata Payk.; Melandria caraboides L.; Tribolium madens Charp.; Rhamnusium bicolor Schnrk.; Leptura revestita L.; Axinopalpis gracilis Kryn.; Callidium aeneum Deg.; Saperda scalaris L.; Stenostola nigripes Fbr.; Phytoecia ephippium F., coerulescens Scop.; Lema Erichsoni Sffr.; Cryptocephalus coryli L., janthinus Germ., coerulescens Sahlb.; Melasoma cuprea F., 20-punctata Scop.; Galeruca interrupta Oliv.; Lythrarina salicariae Payk.; Chaetocnema confusa Boh., Sahlbergi Gyll.; Tropideres undulatus Pz.; Cneorrhinus plagiatus Schall.; Pachycerus madidus Ol.; Lixus sanguineus Rossi; Phytonomus fasciculatus Hbst.; Notaris Märkeli Boh.; Bagous binodulus Hbst., lutulosus Gyll.; Eremotes reflexus Boh.; Ceutorrhynchus terminatus Hbst., pulvinatus Gyll., melanarius Steph., crucifer Ol., Javeti Bris., albosignatus Gyll., campestris Gyll., rugulosus Hbst., denticulatus Schnrk., marginatus Payk., pollinarius Forst., nanus Gyll.; Orobitis cyaneus L.; Orchestes pilosus F.; Cionus pulchellus Hbst.; Diodyrhynchus austriacus Ol.; Eccoptogaster Ratzeburgi Jans.; Carphoborus minimus F.; Xyleborus cryptophagus Ratzeb., dryographus Ratzeb., dispar F.; Trox hispidus Laichart.; Aphodius Zenkeri Germ.; Serica brunnea L.

Bythinus validus Aub. Schweinsdorfer Park (Gb.).

Scydmaenus Hellwigi Hbst. Carolath, in einem Bohrloche von Cerambyx cerdo. (Schr.)

Liodes cinnamomea Panz. Schweinsdorfer Park (Zwergstück) (Gb.).

Hister neglectus Germ. und H. 12-striatus Schrk. Neusalz (Schr.).

Trichocele fulvohirta Bris. Oderwald b. Neusalz (Schr.).

- Opilo pallidus* Oliv. *ibid*, an einer alten Eiche. 8. (Schr.).
Orthopleura sanguinicollis F. Carolath, an alter Eiche (Schr.). 5.
Meligethes obscurus Er. Oberf. Panten, gestrichen. 5. (G.).
Silvanus bidentatus Fbr. Carolath, an alter entrindeter Eiche. (Schr.) 5.
C. distinguendus Strm. Quanzendorf, unter faulendem Stroh (Gb.). *C. badius* Strm. Riesengeb. (Coll., Klette).
C. Milleri Rtt. Quanzendorf in faul. Stroh (Gb.).
C. Schmidt Strm. Schweinsdorf (Gb.).
Atomaria gravidula Er. Riesengeb. (Coll. Klette). *A. nitidula* Heer. Kottwitz (Gb.). *A. peltata* Kr. Neisse in Reisigbündeln und Str. (Gb.). *A. Zetterstedti* Zett. Liegnitz (G.), Hochwald Kr. Brieg. (Gb.) *A. ornata* Heer. Altvatergeb. und Wölfelsgrund in trockenem Fichtenreisig (Gb.).
Lathridius Pandellei Bris. Paskau (Rtt.); *L. rugicollis* Oliv. Beskiden (Rtt.); *L. Bergrothi* Beskiden (Rtt.).
Enicmus consimilis Mannh. Altvatergeb. (Gb.).
Corticaria umbilicata Beck Glatzer Geb. (Gb.), *C. longicollis* Zett. Neisse an einem Hopfenzaune mit *Cuscuta* (Gb.).
Melanophthalma distinguenda Motsch. Hochwald b. Brieg und *M. similata* Gyll. Schweinsdorf, Neisse in Kirchhofs-Abraum 5 (Gb.).
Colydium elongatum F. Neusalz: Oderwald an alter Eiche (Schr.) 6.
Dermestes undulatus Brahm. Beuthen a. O. an einem Hause (Schr.) 5.
Globicornis marginata Payk. Neusalz: an alter Weide (Schr.) 5.
Chalcophora mariana Lap. Königshütte: Bärhofer Forst, massenhaft. (Scholz.)
Xyletinus ater Panz. Ohlau: Rodeland (T.).
Calopus serraticornis L. Lehmwasser (Langner).
Acimerus Schaefferi Laich. Neusalz. an Weißbuchenstock. (Schr.) 6.
Grammoptera variegata Germ. Neusalz: Oderwald, von blühendem Weißdorn (Schr.) 5.

Phymatodes rufipes F. Wie Vorhergehende.

Cryptocephalus imperialis Laich. Charlottenbrunn
(Langner).

Ceuthorrhynchus angulosus Boh. Lähn (G.).

Gymnetron melas Boh. Liegnitz (G.). Heßberge, Blei-
berge (G.).

Pityophthorus glabratus Eichh. Heßberge (G.).

Ips cembrae Heer. Königshütte: Bobrownik; auf *Larix*
(Scholz).

Xyleborus cryptophagus Ratzeb. Neisse (Gb.).



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [JH_1](#)

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: [Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1907, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae von 1906 9-12](#)