

Neuheiten*) der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1908.

Von **J. Gerhardt.**

Geordnet nach dem Katalog europ. Käfer von 1906.

Abkürzungen: Gb. = Gabriel, Generalmajor z. D., Neisse. G. = Gerhardt, Oberl. a. D., Liegnitz. L. = Liegnitz. Schr. = Schreiber, Lehrer, Neusalz. v. V. = von Varendorff, Landrichter, Hirschberg i. Schles.

Vorbemerkung.

Im einmütigen Zusammenwirken nach gleichen Zielen strebender Fachgenossen liegt die Ursache zu der so bedeutend angeschwollenen Ziffer der diesjährigen Neuheiten unserer heimatlichen Käferfauna. Herr Generalmajor Gabriel — Neisse ordnete sein gesamtes Käfermaterial nach dem neuesten Cataloge europäischer Käfer vom Jahre 1906, und ich unterzog sämtliche Arten meiner Sammlung zum Zwecke der Geschlechtertrennung einer Revision, gleichzeitig eine dem neuen Cataloge angepaßte Änderung der Nomenclatur einschließend. Es konnte nicht fehlen, daß dadurch mancher verborgene Schatz gehoben und ans Licht gebracht wurde, auch einige Irrtümer zur Berichtigung gelangten.

Eine bereits druckfertige III. Auflage unseres »Verzeichnisses der Käfer Schlesiens« dürfte jetzt den Inhalt unsers heimatlichen

*) Sämtlich mir vorgelegen.

Gebietes, wozu bekanntlich auch Österreich-Schlesien zählt, in seltener Vollständigkeit und Korrektheit enthalten. Möchten nur dem Druck finanzielle Schwierigkeiten erspart bleiben.

J. Gerhardt, Oberlehrer a. D.

-
- Cicindela germanica* a. *obscura* F. L. Weißenrode
1 Stck. (G.).
- Carabus nitens hermaphroditus* m. Das linke Vorderbein zeigt die deutliche Tarsenerweiterung des ♂, das rechte die einfache Tarsenbildung des ♀. Gefunden am Aufstieg zum Gröditzberg mit zahlreichen normalen Stücken.
- Chlaenius nigricornis* a. *obscuripes* m. Beine mehr oder weniger dunkelbraun, z. T. schwarz, Fühlerglied 1 gelb. L.: Bruch 1 Ex. (G.).
- Badister bipustulatus* a. *binotatus* Fisch. L.: unter Laub 2 Stck. (G.).
- Pterostichus diligens* v. *anomalis* m. Halsschildbildung von *diligens*, Punktierung der Vorderbrust wie bei *strenuus* Pz. L. 1 Ex. (G.).
- Bidens unistriatus monstr. opacus* m. Flügeldecken ganz matt, ohne deutliche Punktierung. (G.). Die Aberr. *Vorbringeri* mit sehr stark punktierten Fld. könnte vielleicht auch in Schlesien gefunden werden. Fehlt im Katalog.
- H. granularis* v. *fenestratus* Schilsky, L.: Bruch s. a. *unicolor* m. Decken einfarbig gelb, erhärtet. L. Bruch s.
- H. bilineatus* a. *varians* m. So nenne ich alle Formen, welche weder der Stammform noch der einfarbig schwarzen a. *Hopfgarteni* angehören, also Formen, bei denen der helle Medianstreifen in der Mitte unterbrochen, oder nur vorn angedeutet ist. L.: Bruch, n. s.
- H. erythrocephalus* v. *subcostatus* m. Flügeldecken schwach, aber deutlich gerippt. z. s.
- H. umbrosus* a. *luteipennis* m. Decken einfarbig gelb, aber erhärtet. 1 Ex. L.: Bruch.
1. *Phyllodrepa puberula* Bernh. L. n. ss. Mit *floralis* und *nigra*. An den ganz roten Fühlern leicht kenntlich.

- Phloeonomus pusillus* v. *punctipennis* Thoms. fehlt im Katalog v. 1906, stellt aber eine gute Var. dar, wenn die Punkte der Fld. deutlich hervortreten. Waldenb. Geb. (G.).
2. *Baptolinus longiceps* Fauv. Glatzer Geb. (Gb.). Spindelmühl (G.). s.
- Philonthus marginatus* a. *rubromarginatus* Gabriel. Nat lebhaft rot, Glatzer Geb. ss.
3. *Staphylinus tenebricosus* Grav. Galt als Var. von *olens* und ist wie dieser verbreitet.
- Tachyporus hypnorum* a. *armeniacus* Kolen. L. 1 Stck. (G.).
4. *Atheta puberula* Sharp. Waldenb. Geb.: Neuhaus, aus Pilzen. 2 Ex. (♂ und ♀) (G.).
5. *Callicerus Kaufmanni* Epp. Ein Pärchen im Wasserwalde bei Kaltwasser Kr. Lüben in einem Rehlager unter dem Rhizom von *Carex brizoides*. Neu für das deutsche Reich. (G.)
6. *O. pilosicollis* Bernh., *rufescens* Baudi, Rabengeb. unter Wildfutter (G.). Glatzer Geb. (Gb.) ss.
- Trimium brevicorne* a. *atrum* m. Ganz schwarz. L.: Lindenbusch. 1 Ex.
7. *Brachygluta Lefebvrei* Aub. Ein schlesisches Stück in der Kletteschen Sammlung. (Gb.).
8. *Cyrtusa subferruginea* Rtt. L.: in einer Sandgrube auf *Sisymbrium Sophiae* 2 Stck. (G.). Das Letznersche Stck. war *pauilla* Schmidt (G.).
9. *Trichopteryx ambigua* v. *bovina* Motsch. nicht selten mit *sericans*, der er bisher als Var. angehörte.
10. *Helophorus nivalis* Giraud. Altvater (Dr. Lokay). Riesengeb. (v. Rottenb.). Früher bei glacialis.
- Anacaena limbata* a. *ochracea* Steph. und a. *nitida* Heer. Beide n. s. *A. bipustulata* fehlt z. Z. in Schlesien.
- Cymbiodyta marginella* a. *testacea* Speiser. L. s. (G.), Kottwitz (Gb.).
11. *Pachysternum pusillum* Kuw. Beskiden (Rtt.).
- Homalisus fontisbellaquei* a. *monochloros* Torre. s. Altvater, Zuckmantel (Gb.). Görbersdorf (Schilsky).

- C. fusca* a. *conjuncta* Schilsky z. s. L. (G.), Quanzendorf (Gb.).
- C. discoidea* a. *flavicollis* m. Halsschild ganz gelb. s. Waldenb. Geb., Buchwald i. Rsg. (G.).
- Malachius viridis* a. ♀ *elegans* F. n. s. mit der Stammform.
- Cateretes pedicularius* a. *scutellaris* Leinb. und a. *nigriventris* Leinb. Beide n. s.
- C. rufilabris* a. *junci* Steph. und a. *pallidus* Heer. Beide z. s.
- Omosiphora limbata* a. *Skalitzkyi* Rtrr. s. Waldenb. Geb. (G.).
- Meligethes aeneus* a. *dauricus* Motsch. Neisse, Kottwitz (Gb.).
- M. viridescens* a. *discolor* Rtrr. z. s.
- Rhizophagus politus* a. *Brucki* Rtrr. L. 1 Ex. (G.). Glatzer Geb. (Gb.).
- Grobbernia fimetarii* a. *brunnea* m.: Oberseite einfarbig braun, und a. *flavescens* m.: Obers. einfarbig gelb. m. *opaca* m.: Flügeldecken ganz matt. Die Aberr. mit der Stammform im N.-Park zu L. von Gras gestrichen, die 2te ss., auch *opaca*. In der Nähe wächst der Tintenpilz (*Coprinus porcellanus*), der nach Schilsky in Beziehung zu *Grobbernia* steht.
- Ephistemus globulus* a. *dubius* Fowler L. (G.).
- Tritoma bipunctata* a. *binotata* F. Häufiger fast als die Stammform.
- Phalacrus fimetarius* a. *Humberti* Rye und a. *picipes* Steph. Beide n. s.
- Olibrus corticalis* a. *adustus* Fisch. n. s.
- O. affinis* a. *discoideus* Küst. Neisse und Quanzendorf (Gb.).
- O. bicolor* a. *apicatus* Guilleb. und a. *obscurus* Guilleb. Beide n. s.
- Stilbus testaceus* a. *unicolor* Flach. Wohl überall n. s. (G.).
- St. atomarius* v. *sulcatus* m. Jede Flügeldecke mit

2—4 furchenartig vertieften Längsstreifen zwischen Mitte und Seitenrand. s.

St. oblongus a. *uniformis* Flach L. 2 Ex. (G.).

Mycetophagus 4-pustulatus a. *ruficollis* Schilsky. L. 1 Stck. (G.).

M. piceus a. 8-punctulatus m.: außer den 2 großen Humeralpusteln noch 8 sehr kleine. a. 6-punctulatus m.: mit noch 5—6 kleinen und a. 2-punctulatus m. mit noch 1 2 kleinen Pusteln. Schlesisch sind außerdem noch die von Ganglb. aufgeführten Arten.

Scymnus frontalis a. *Suffriani* Ws. ss. (G.). a. *immaculatus* Sffr. Nimptsch (Gb.).

Microcara testacea a. *obscura* Steph. Peist bei Panten 1 Ex. (G.).

Cyphon variabilis a. *nigriceps* Ksw. Wohl die häufigste Aberr., meist ♀. a. *nigricornis* Schilsky n. s., namentlich unter ♀.

C. variabilis m. *rugulosus* m. Nur 1 ♀: Schwarz, Beine, Fühlerwurzel (3 Glieder) und Halsschild gelb, Kopf, Schulterbeule und Scheibe der Fld. wenig dunkler. Basis der Fld., ein vorn und hinten abgekürzter Wisch an der Nat und ein breiter Seitenwisch schwarz; Halsschild glänzend, Decken matt, dicht, anliegend und grau behaart, ganz undeutlich punktiert, überall dicht quer gerunzelt. Jakobsdorfer See. (G.)

Adrastus nitidulus a. *pallens* Er. L. s. (G.).

Meloë violaceus a. *montanus* m. Nur das Halsschild mit schwachem bläulichen Schimmer und ebenso die letzten Dorsalsegmente des Hinterleibes, sonst ganz schwarz, höchstens mit schwachem Metallschimmer. Riesengeb. (G.).

12. *M. cicatricosus* Leach. Carolath (Schr.) 1 Stck. 17. 5. 08. *Mordellistena lateralis* a. *atricollis* Schilsky. Buchwald i. Rsg. 1 Stck. (G.).

Gonodera arenaria a. *testaceipennis* m. So nenne ich die Form mit den gelben Fld.

Cortodera femorata a. *flavipennis* Rtt. Vorderheide b. L. z. s. (G.)

- Pidonia lurida* a. *Ganglbaueri* Ormag.
- Evodinus clathralus* a. *brunnipes* Muls. Riesengeb.
- Leptura revestita* a. *rufomarginata* Gabriel. Basalbinde wie bei *interrupta* Heyd. unterbrochen, aber die Medianbinde weder die Nat noch den Seitenrand erreichend. Lähn (G.), Schmiedeberg (Klettesche Sammlung. Gb.).
- Tetropium castaneum* a. *luridum* L. Glatzer- und Riesengeb. (Gb.).
- Phymatodes testaceus* a. *melanocephalus* Ponza und a. *similaris* Küst. Schlesien (Klettesche Samml. Gb.).
- Hylotrupes bajulus* a. *lividus* Muls. L. (G.).
13. *Clysanthus varius* F. Schlesien (Klettesche Samml. Gb.).
- Tetrops praeusta* a. *nigra* Kr. Wie Vorige.
- Zeugophora flavicollis* a. *australis* Ws. Altvater (Gb.).
- Lema cyanella* a. *obscura* Steph. Schlesien (Gb. G.).
- L. melanopus* a. *atrata* Walzl. Riesengeb. und Ebene. (Gb. v. V.)
- Coptocephala unifasciata* a. *4-maculata* Lac. n. s.
- Cryptocephalus coryli* a. *temesiensis* Sffr. Riesengebirge (Gb.).
- Cr. 6-punctatus* a. *thoracicus* Ws. Wie Voriger.
- Cr. aureolus* a. *discolor* m. Decken grün, Halsschild goldglänzend. Riesen- und Waldenb. Geb.
- Cr. sericeus* a. *pratorum* Sffr. Waldenb. Geb. (G.). a. *purpurascens* Ws. Vorderheide (G.).
- Cr. cristula* a. *auratus* m. Oberseite goldfarbig. s. a. *violaceus* m. Oberseite blau. ss. a. *bicolor* m. Halsschild goldglänzend, Decken grün. z. s. a. *frigidus* Jakobs. Riesengeb. (Klettesche Samml. Gb.).
- Cr. parvulus* a. Klettei Gabriel. Von oben gesehen rein schwarz, seitlich blau. Riesengeb. 3 Ex.
- Cr. 10-maculatus* a. *scenicus* Ws. n. s. (G.).
- Cr. Moraei* a. *vittiger* Mars. Ziegenhals, Quanzendorf (Gb.). a. *arquatus* Ws. ibid. und Altvater (Gb.).
- Cr. vittatus* a. *lineellus* Gabriel. Mitten durch die schwarze Binde der Fld. zieht eine gelbe Linie. (Gb.)

Cr. labiatus a. *exilis* Steph. und a. *ocularis* Heydn.

Die letzte Aberr. ss. Ebene und Vorgeb. (G.).

Cr. pygmaeus a. *orientalis* Ws. Neisse (Gb.).

Cr. ocellatus a. *nigifrons* Bedel. ss. L. (G.).

Chrysomela marcasitica a. *cupreo-purpurea* m. Altvater (Kobmann) 1 Ex. Mehr purpurfarbig.

Chr. purpurascens a. *picea* Ws. Altvater (Kobmann.).

Chr. göttingensis a. *Sturmi* Westh. Ebene und Gebirge n. s.

Chr. geminata a. *cuprina* Dft. Glatzer- und Altvatergeb., Neisse (Gb.). a. *nigra* Ws. Lähn 1 Ex. (G.).

Chr. hyperici a. *privigna* Ws. Kottwitz (Gb.), L. (G.).

Chr. cerealis a. *8-vittata* Schrnk. und a. *livonica* Motsch. Gebirge und Ebene n. hfg.

Chr. graminis a. *fulgida* Fbr. Neisse 1 Ex. (Gb.).

Chr. menthastri a. *herbacea* Dft. Quanzendorf, Neisse (Gb.), Liegnitz (G.).

Chr. varians a. *aethiops* Fbr. Liegnitz (Kobmann, G.).

Chrysochlora cacaliae a. *coeruleo-lineata* Dft. Riesengeb. (Gb.). Bisher nur Alpenform.

Phytodecta 5-punctata Fbr. Außer der bekannten Aberr. *obscura* sind zu vermerken: *nigriventris* Penecke, *unicolor* Ws., *flavicollis* Dft., *aucupariae* Jakobs, *padi* und *melanopterus* Penecke.

Ph. pallidus a. *decipiens* Ws., a. *borealis* Oliv. und *frontalis* Oliv. Bewohner der Sudeten.

Phaedon cochleariae a. *neglectus* Sahlb. hfg.; a. *hederae* Sffr. Waldenb. Geb. s. (G.).

Melasoma aenea a. *vitellinae* Scop. Waldenb. Geb. (G.).

Lochmaea capreae a. *scutellata* Chev. Riesengeb. (Gb.), Liegnitz (G.). ss.

Crepidodera femorata a. *infuscipes* Foudr. Glatzer Geb. (Gb.).

Chalcoides aurea a. *laeta* Ws. und a. *cyanea* Marsh. Beide n. s.

Chaetocnema semicoerulea a. *femoralis* Ws. (Gb.), a. *saliceti* Ws. 1 Stck. (G.).

- Psylliodes chrysocephala* a. *erythrocephala* L.
 Quanzendorf und Schweinsdorf (Gb.).
Ps. hyoseyami a. *cupreonitens* Först. Neisse (Gb.).
Haltica brevicollis a. *azurea* Ws. Liegnitz hfg.
 (G.), Quanzendorf (Gb.).
H. lythri a. *aenescens* Ws. Altvater (Gb.).
H. oleracea a. *nobilis* Ws. n. s. a. *lugubris* Ws.
 Riesengeb., Liegnitz hfg. (Gb.).
Phyllotreta exclamationis a. *vibex* Ws. Riesengeb.,
 Kottwitz, Neisse (Gb.), L. (G.).
Ph. flexuosa a. *fenestrata* Ws. Kottwitz (Gb.), L. (G.).
Longitarsus echii a. *tibialis* Dft. hfg.; a. *coerules-*
cens Ws. z. s.; a. *dimidiatus* All. ss. L. (G.).
L. apicalis a. *4-maculata* Ws. Riesen- und Altvater-
 geb. (Gb.).
L. luridus a. *nigricans* Ws. n. s.; a. *cognatus* Ws.
 hfg.; a. *4-signatus* Dft. 1 Stck. (G.).
L. suturellus v. *paludosus* Ws. Beskiden, Kottwitz,
 Neisse (Gb.).
L. melanocephalus a. *atriceps* Kutsch. Liegn. (G.).
L. rubiginosus a. *fumigatus* Ws. Neisse 1 Stck. (Von
 Weise determ.) Gb.
L. pellucidus a. *nigriventris* Ws. Quanzendorf (Gb.)
 und L. je 1 Stck. (G.).
Cassida hemisphaerica a. *nigriventris* Heyd.
 Quanzendorf und Liegnitz ss. (Gb., G.).
C. vibex a. *discoidea* Ws. n. s.
C. margaritacea a. *melanocephala* Sffr. n. s. Neisse.
 L. (Gb., G.).
C. Murraea a. *maculata* L. n. s.
Anthribus fasciatus a. *ventralis* Rey. Neisse (Gb.).
 L. (G.).
Otiorrhynchus inflatus a. *salebrosus* Boh. Rot-
 beinig häufiger.
Phyllobius glaucus v. *ater* Stierl. hfg., besonders
 auf dem Hochgebirge; *densatus* Schilsky, namentlich ♂♂.
 Verbreitet.

Polydrosus cervinus a. *maculosus* Hbst. s. Riesen-
geb. Peist bei L.

P. tereticollis a. *uniformis* Stierl. Quanzendorf,
Hochwald Kr. Brieg. s. (Gb.).

Plinthus Tischeri v. *germanicus* Rtt. und v. *anceps*
Boh. Riesengeb., je 1 Stck. (G.).

14. *Limnobaris pilistriatus* Steph. Mit *T. album* Linn.
vorkommend. n. ss. Neisse (Gb.), L. (G.).

Tychius junceus a. *metallescens* m. Alle Schuppen
der Oberseite messingglänzend. 1 Ex. L.

Gymnetron bipustulatum a. *fuliginosum* Rosh.
Schlesien (Gb.).

G. tetrum v. *subrotundatum* Rtt. z. hfg.

Apion aeneum a. *obscurum* Gabriel und a. *chal-*
ceum Marsh. Neisse, Quanzendorf (Gb.), L. (G.). Bei
a. *obscurum* die Fld. fast schwarz.

A. flavipes a. *Lederi* Kirsch. (*apicerostre* Desbr.) s.,
mit der Stammform.

A. violaceum a. *cuprinum* Gabriel. Decken kupfrig.
Neisse.

Rhynchites aeneo-virens a. *virens* Gabriel. Fld.
grün. a. *fragariae* Gyll. hfg.

Byctiscus populi a. *cuprifer* Schilsky n. s.

B. betulae a. *violaceus* Scop. hfg. a. *nitens* Marsh. s.

Apoderes coryli a. *nigricollis* Esch. Fehlt im
Katalog von 1906. Halssch. ganz schwarz. ss.

Aphodius erraticus a. *fumigatus* Muls. n. s.

A. subterraneus a. *fuscipennis* Muls. n. s.

A. sordidus a. *4-punctatus* Pz. Ellgut (Gb.).

A. rufus a. *arcuatus* Moll. z. s.

A. pusillus a. *rufulus* Muls. ss. a. *subturalis* m. Dek-
ken hell rotbraun, Nat und ein Seitenwisch schwarz. (G.)

A. punctato-sulcatus a. *marginalis* Steph. L. (G.).

A. luridus a. *nigripes* F. n. s. a. *nigrosulcatus*
Marsh. ss. (G.).

Onthophagus vacca v. *medius* Pz. L. n. s. (G.),
1 schlesisches Stck. in der Kletteschen Sammlung (Gb.).

Melolontha hippocastani a. *rex* Torre (Gb.); a. *fusci-*
collis Kr. L. (G.).

M. melolontha a. *obscuripes* Gabriel. Beine dunkel.
1 Stck. Neisse.

Polyphylla fullo a. *marmorata* Muls. Sammlung
Klette (Gb.), L.: Pantener Höhen mit der Stammform
und ebenso hfg. (G.).

Anomala aenea a. *Frischi* F., a. *tricolor* Torre,
a. *bicolor* Torre, a. *cyanea* Torre, alle schlesisch.

Phyllopertha horticola a. *maculata* Torre (Gb.) s.
a. *ustulatipennis* Villa n. s.

Trichius fasciatus a. *scutellaris* Kr. N. s. mit der
Stammform.

Schlesien zählt gegenwärtig **4421** selbständige Käferarten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [JH_2](#)

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: [Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1908 1-10](#)