© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Zu Anthonomus varians Payk.

Von **J. Gerhardt.**

In der Knieholzregion der Hochsudeten herrscht die Stammform vor: schwarz, Fühler incl. Keule, Beine, Halsschild und Decken rot, letztere an den Seiten und meist auch an der Nat schwarz. Dagegen waltet in der Ebene die Form mit einfarbig roten Decken — ich nenne sie rufipennis — vor. Ihr schließen sich die sehr seltenen Stücke an, die ein ganz schwarzes Halsschild haben, sonst aber der Stammform gleichen; Herr Rektor Kolbe führte sie als Aberr. suturalis ein. Ein Uralstück dieser Aberr. in meiner Sammlung hat fast einfarbig rote Decken, seine Seiten sowie die Nat sind kaum dunkler und die Beine mit Ausschluß der Hinterschienen gelb. Am meisten weicht die bekannte Aberr. perforator Hbst. von der Stammform ab, da sie ganz schwarz ist.

Das Pygidium tritt beim ♂ immer vor und hat eine tiefe, breite Mittelfurche. Beim ♀ ist das Pygidium verdeckt, seine Mittelfurche ist viel dürftiger, seichter und kleiner.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift für Entomologie Breslau

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: JH_5

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: Zu Anthonomus varians Payk. 4