

# Beiträge zur schlesischen Käferfauna.

Von **W. Kolbe.**

## Staphylinidae.

- Ancyrophorus longipennis* Fairm. unter Steingeröll in Flußbetten. Grafsch. Glatz: Bett der Wölfel bei der Sperrmauer (10/10).  
*Scopaeus cognatus* Rey. Liegnitz: Heßberge (10/09).  
*Medon obscurella* Er. in faulenden Laubhaufen. Riesengebirge: Ober-Petersdorf (7/10).  
*Philonthus astutus* Er. wie vor. Art.  
*Aleuonota pallens* Rey im Anspülicht. Liegnitz: Katzbachufer (8/88, 5/96).  
*Atheta debilicornis* Er. im Anspülicht. Liegnitz: Katzbach bei dem Alt-Beckerner Wehr (9/11). Bisher aus den Beskiden aufgeführt. *A. subterranea* Rey unter feuchtem Laub. Liegnitz: Wasserwald bei Kaltwasser (6/93, 6/07), Peist bei Panten (6/01). Fehlt in der letzten Auflage des Verzeichnisses der schlesischen Käfer. *A. divisa* Thoms. und *nigricornis* Thoms. an Wildfutterresten. Riesengebirge: Kiesewald (7/10).  
*Stichoglossa corticina* Er. in faulenden Buchenstöcken. Glatzergebirge: Spitzberg zu Maria Schnee (10/10).

## Pselaphidae.

- Trimium carpathicum* Saulcy wie vor. Art (10/10).  
*Bythinus nodicornis* Aub. Liegnitz: Heßberge (10/09).

## Liodidae.

- Anisotoma humeralis* ab. *globosa* Payk. Liegnitz: Peist bei Panten (7/02). *A. orbicularis* Hbst. Riesengebirge: Kiesewald (7/06, 7/10), Bober-Katzbachgebirge: Lähn (7/90).

*Agathidium mandibulare* Strm. Glatzergebirge: Grundwald unter der Mense (10/09). Meine Angaben im Jahresheft 1908, 19 sind auf *A. sphaerula* Reitt. zu beziehen; ich fand letzteres bisher: Isergebirge: Kammhäuser (7/88), Waldenburgergebirge: Hochwald (8/95), Heßberge (10/97, 10/09), Bober-Katzbachgebirge: Jannowitz (5/02), Riesengebirge: Seidorf (5/04), Kiewewald (7/10) und oberer Schnee grubenweg (7/10). *A. marginatum* Strm. Die ♂♂ mit Hörnchen auf der linken Mandibel sind selten; ich sammelte solche in 2 Stück aus dem Anspüllicht der Katzbach bei Liegnitz (9/99, 9/10).

### Leptinidae.

*Leptinus testaceus* Müll. in einer hohlen Weißbuche. Glatzergebirge: Grunwalden an der Mense (10/09).

### Trichopterygidae.

*Ptenidium turgidum* Thoms. in faulenden Fichtenstöcken. Liegnitz: Heßberg (10/09) ziemlich zahlreich.

*Ptinella testacea* Heer in modernden Eichenstöcken. Liegnitz: Oderwald bei Maltsch (5/. 8/09, 7/10). Fehlt in der III. Auflage des Verzeichnisses der schlesischen Käfer.

*Trichopteryx Chevrolati* Allib. in faulenden Baumstöcken einmal zahlreich. Liegnitz: Heßberge (6/09). *T. brevipennis* v. *Waterhousi* Matth. unter faulendem Kartoffelkraut. Liegnitz: Rehberg bei Panten (4/06).

### Hydrophilidae.

*Anacaena bipustulata* Marsh. ist auch schlesisch. Ich sammelte bisher je 1 Stück aus Anspüllicht der Katzbach. Liegnitz: Wehr bei Alt-Beckern (9/10, 6/12).

*Philydrus fuscipennis* Thoms. (neu für Schlesien!) fand sich in 1 Stück aus der Liegnitzer Gegend in meiner Sammlung.

### Cantharidae.

*Cantharis fulvicollis* ab. *maculata* Schilsky. Liegnitz: Peist bei Panten (6/89, 6/95), Oderwald bei Maltsch (6/08).

*Rhagonycha translucida* Kryn. Liegnitz: Heßberge (7/03).

*Malthodes debilis* Kiesw. (neu für Schlesien!). Liegnitz: Oderwald bei Maltsh (6/08).

*Dasytes aerosus* Kiesw. ab. *variicornis* Schilsky zog ich mit der Stammform zahlreich aus trockenen Eichenästen, die ich bei der Oberförsterei Panten, Kr. Liegnitz, gesammelt hatte. Die ♂♂ erscheinen einige Tage vor den ♀♀.

*Danacaea morosa* Kiesw. auch im Glatzergebirge (7/85).

### Cleridae.

*Necrobia ruficollis* Fbr. ab. Knochei m. Auch die Spitze der Flügeldecken ist ausgedehnt rot, so daß nur eine breite blaue Mittelbinde verbleibt. Ich erhielt 1 Stück dieser auffallenden Abart mit zahlreichen Exemplaren der Stammform von Herrn Knoche in Antwerpen.

### Byturidae.

*Byturus fumatus* ab. *bicolor* Reitt. bei Liegnitz nicht selten.

### Nitidulidae.

*Epuraea neglecta* ab. *convergens* Reitt. mit der Stammform zahlreich an einem Eichenschwammé. Liegnitz: Peist bei Panten (8/05). *E. thoracica* Tourn. Beskiden: Weißes Kreuz (7/07), Altvatergebirge: Roter Berg (7/08). Dafür *E. Deubeli* Ganglb. für diese Orte zu streichen (Jahresh. 1908, 1909). Ebenso letztere für das Riesengebirge (Jahresh. 1911).

*Meligethes atramentarius* ab. *Kirschi* Reitt. Liegnitz: Wasserwald bei Kaltwasser (5/92).

### Chrysomelidae.

Zu der Verwandlung der *Luperus*-Arten, über die bisher sichere Angaben fehlten, machte mir Herr Dr. Urban—Schönebeck a. E. freundlichst folgende Mitteilungen: Die *Luperus*-Larven leben ganz ähnlich wie die von *Phyllobrotica* in der Erde und überwintern auch dort. Die Puppen fanden sich Ende April vor. Die Käfer erschienen im Mai.

### Curculionidae.

*Gymnetron pascuorum* ab. *bicolor* Gyll. Liegnitz: Peistwiesen bei Panten (8/00).

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [JH\\_5](#)

Autor(en)/Author(s): Kolbe Wilhelm

Artikel/Article: [Beiträge zur schlesischen Käferfaunä 9-11](#)