Beiträge zur schlesischen Käferfauna.

Von **W. Kolbe**.*)

Die folgenden Mitteilungen sind in erster Linie als Ergänzungen zur 3. Auflage des Letzner-Gerhardt'schen Verzeichnisses zu betrachten. Herr Generalmajor Gabriel (G.) beteiligte sich an der Arbeit mit zahlreichen Aufzeichnungen, besonders nach Reiters Fauna germanica Bd. I—III. Die Aufzeichnungen haben Herrn Reiter zur Bestätigung seiner Angaben vorgelegen.

Tachys bisulcatus Nic. Liegnitz: Katzbachwehr bei Alt-Beckern im Anspülicht (6/12).

Acupalpus luteatus Dft. (neu). Paskau auf Sumpfterrain nach Rtrr. 1 Stück steckte in der Klette'schen Sammlung mit der Bezeichnung »Schlesien« (G.).

Amara Quenseli Schönh. (neu). Rtrr. besitzt 2 Stck. aus dem Altvatergebirge (G.).

Halplus fluviatilis ab. *striatus* Sharp. Liegnitz: Arnsdorfer Grundsee (9/95), Katzbach ober- und unterhalb der Stadt (6/12).

Hydroporus semirufus Germ. (wieder hinzu). Riesengebirge nach Ganglbauer und Rtrr. (G.).

Agabus Solieri Aubé. Riesengebirge. Gerhardt führt diese Art nicht mehr auf; Rtrr. dagegen gibt an, schles. Stücke gesehen zu haben (G.). Die Angelegenheit erscheint noch nicht spruchreif.

*) Der Verein spricht den Wunsch aus, daß die schlesischen Herren Koleopterologen ihre neuen Entdeckungen in Zukunft Herrn Rektor W. Kolbe in Liegnitz anstelle des verstorbenen Herrn Oberlehrer Gerhardt mitteilen möchten.

Micropeplus longipennis Kr. (neu). Lissa hora nach Rtrr. (G.). — *M. fulvus* Er. Glatzergebirge: Maria Schnee in einem Holzschuppen (10/12).

Olistherus substriatus Gyll. (neu). Lissa hora-Gebiet nach Rtrr. (G.).

Anthobium aucupariae Kiesw. Liegnitz: Heßberge (5/89), Riesengeb.: Gr. Schneegrube in Sorbusblüten nicht selten (7/12).

Geodromicus suturalis Boisd. (Verzeichn. p. 416.) Lissa hora im Angeschwemnten nach Rtrr. (G.).

Thinobius Klimai Bernh. (neu) und *minutissimus* Fauv. (neu). Paskau: Ostrawitza nach Rtrr. (G.).

Trogophloeus memnonius Er. Riesengebirge: Zackenbett b. Ob. Petersdorf (7/12). — *Tr. fuliginosus* Grav. Liegnitz: Oderwald b. Maltch unter feuchtem Laub (4/11). — *Tr. corticinus* v. *planicollis* m. Die Eindrücke des Halsschildes sind kaum angedeutet. Liegnitz: Katzbach b. Alt-Beckern im Anspülicht (6/12). — *Tr. nitidus* Baudi (neu). Liegnitz: Katzbach b. Alt-Beckern und Schimmelwitz im Anspülicht (5/. 6/12), Riesengebirge: Zackenbett b. Ob. Petersdorf (7/12).

Stenus fossulatus Er. Glatzergebirge: Wölfelsgrund und Maria Schnee (10/12). — *St. neglectus* Gerh. Herr L. Benick-Lübeck behandelt die Art eingehend in d. Entom. Mitteilungen Bd. II pag. 44—48 und spricht sie als *St. morio* Grav. v. *neglectus* Gerh. (brachyptere Form) an, teilt mir jedoch unter dem 9. 4. d. J. freundlichst mit, daß die Meinungen über seine Auffassung geteilt seien. Gerhardt selbst schrieb ihm: »Es wollte mir für den Augenblick nicht recht einleuchten, daß es nur eine brachyptere Form von *morio* sei, doch habe ich nach längerem Vergleichen aller meiner beiden Arten die Zweifel fast fallen gelassen.« Das Tier wird zunächst noch als Art weiterzuführen sein.

Paederus sanguinicollis Steph. und *ruficollis* Fabr. trennt Rtrr. mit Recht als besondere Arten; *sanguinicollis* ist in den schles. Beskiden an der Ostrawitza (G.), Rzeka (Olsagebiet) und Weichsel (K.) nicht selten; das Vorkommen von *ruficollis* wäre noch festzustellen (G.). Die II. Aufl. d. Verz. führt beide Arten getrennt auf.

Lathrobium bicolor Er. (neu). Ostrawitza im Anspülicht nach Rtrr. (G.).

Cryptobium fracticorne v. *brevipenne* Rey (brachyptere Form) in Schlesien auch nicht selten.

Xantholinus meridionalis Nordm. v. *pascoriensis* Reitt. (neu). Ostrawitza im Anspülicht nach Rtrr. (G.).

Gauropterus fulgidus Fbr. Riesengebirge: Ob. Petersdorf in einem faul. Laubhaufen (7/12).

Baptolinus longiceps Fauv. Glatzergebirge: Maria Schnee unter Fichtenrinde (10/10), Riesengebirge: Ob. Petersdorf in einer Holzschleife unter Abfällen (7/12).

Quedius ochripennis Mén. Stammform. Liegnitz: Heßberge in faul. Heu (9/12); a. *nigrocoeruleus* Fauv. Liegnitz: Peist b. Panten (8/94). — *Qu. xanthopus* Er. Riesengebirge: Kiewald an grünem Fichtenreisicht (7/12).

Mycetoporus flavicornis Luze. Glatzer Schneegebirge: Heuberg in einem faul. Fichtenstumpfe (10/12). — *M. solidicornis* Woll. = *Reichei* Pand. v. *subpronus* Reitt. (neu). Paskau in Schlesien nach Rtrr. (G.).

Placusa complanata Er. Liegnitz: Heßberge (9/90), Riesengebirge: Kiewald unter Fichtenrinde (7/12).

Cyphaea curtula Er. (neu). (Verzeichn. p. 416). 1 Stck. b. Paskau i. Schlesien von Dr. Graf gefangen nach Rtrr. (G.).

Aleuonota gracilentata Er. Riesengebirge: Zackenbett b. Ob. Petersdorf in Moos (7/12).

Atheta longula Heer. Wie vor. — *A. cambrica* Woll. Wie vor. — *A. currax* Kr. Wie vor. — *A. boletophila* Thoms. (neu). Beskiden nach Rtrr. und Gabr.

Chilopora longitarsis Er. Riesengebirge: Zackenbett b. Ob. Petersdorf in Moos (7/12).

Ocalca rivularis Mill. Wie vor.

Oxipoda Skalitzkyi Bernh. (Verzeichn. p. 417). Riesengebirge (Dr. Skalitzky), Beskiden (G.). — *O. funebris* Kr. Waldenburger Gebirge: Neuhaus (7/93), Riesengebirge: Schmiedeberg (7/99), Kiewald (7/12).

Stichoglossa corticina Er. Riesengebirge: Kiewald (7/12).

Euplectus brunneus Grimm. Riesengebirge: Ob. Petersdorf in einer Holzschleife unter faulenden Abfällen (7/12). — *E. punctatus* Muls. Liegnitz: Heßberge (6/11).

Bibloporus bicolor Denny. Riesengebirge: Kiesewald in dem Moos eines faul. Bretterdaches zahlreich mit sehr vielen Exemplaren von *Oxypoda planipennis* Thoms. (7/12).

Batrisodes adnexus Hampe (Verzeichn. p. 417). Teschen nach Rtr. (G.). — *B. venustus* Rchb. Riesengebirge: Ob. Petersdorf in einer Holzschleife unter faul. Resten (7/12).

Bythinus clavicornis Panz. nebst v. *inflatipes* Reitt. Liegnitz: Oderwald unter feuchtem Laub (7/10, 4/11). — *B. puncticollis* Denny. Riesengebirge: Kiesewald (7/12).

Cephennium carnicum Reitt. (ab). Nicht schlesisch nach Rtr. (G.).

Neuraphus bescidicus Reitt. (ab). Nach Fauna germanica = *rubicundus* Schaum (G.).

Stenichus exilis Er. Riesengebirge: Ob. Petersdorf wie *Eupl. brunneus* (7/12).

Euconnus styriacus Grimm. (neu). Lissa hora: Rzesitzatal nach Rtr. (G.).

Catops coracinus Kelln. Riesengebirge: Kiesewald an faul. Bananenschalen (7/12).

Necrophorus antennatus Reitt. (Verzeichn. p. 417). Paskau nach Rtr. (G.).

Liodes parvula Sahlb. Riesengebirge: Kiesewald (7/12).

Agathidium badium Er. Riesengebirge: Ob. Petersdorf in einer Holzschleife (7/12).

Orthoperus punctulatus Reitt. (neu). Lissa hora: Rzesitzatal nach Rtr. (G.).

Ptenidium laevigatum Er. Riesengebirge: Ob. Petersdorf in einer Holzschleife (7/12), Glatzergebirge: Maria Schnee in einem Holzschuppen (10/12).

Actidium aterrimum Motsch. (neu). Lissa hora: Rzesitzatal nach Rtr. (G.).

Micrus filicornis Fairm. Liegnitz: Katzbach b. Schimmelwitz und Alt-Beckern in Anspülicht (6/12).

Ochthebius exculptus Germ. Riesengebirge: Zacken bei Ob. Petersdorf (7/12).

Hydraena dentipes Germ. Wie vor.

Laccobius alternans Motsch. (Verzeichn. p. 417). Paskau nach Rtrr. (G.).

Cercyon subsulcatus Rey. Liegnitz: Katzbach bei Schimmelwitz und Alt-Beckern nicht selten (5/. 6/12).

Dictyopterus Fiedleri Reitt. (neu). Bei Teschen von Th. v. Wanka gesammelt nach Rtrr. (G.).

Thaneroclerus Buqueti Lef. (eingeschleppt). Diese ostasiatische Cleride fand ich in 2 Exemplaren in einer Liegn. Kolonialwarenhandlung in Java-Kaffee, der von *Araecerus fascicularis* massenhaft besetzt war (8/88). Die Bestimmung übernahm freundlichst Herr Kustos Sigm. Schenkling. Der Käfers teilt mit seiner hochroten Larve offenbar den *Araecerus*-Larven nach.

Epuraea angustata Strm. Glatzergebirge: Maria Schnee (10/10).

Meligethes coeruleovirens Först. (neu). Liegnitz: Oderwald bei Maltsch (6/12), Riesengebirge: Kiesewald (7/12) in den Blüten von *Chrysanthemum Leucanthemum*, selten. Ich verdanke die Auffindung einer freundlichen Mitteilung des Herrn W. Reinecke in Gernrode a. Harz, welcher den Käfer in der dortigen Gegend ebenfalls von der Margaretenblume sammelte. — *M. Czwalinai* Reitt. (wieder hinzu). Schlesisch nach Rtrr. (G.).

Rhizophagus puncticollis Sahlb. (neu). Rzesitzatal a. d. Lissa hora nach Rtrr. (G.).

Laemophloeus duplicatus Waltl. Liegnitz: Peist b. Panten (6/11).

Telmatophilus caricis a. *longicollis* Reitt. Liegnitz: Hummel. — *T. brevicollis* a. *fulvus* Reitt. Liegnitz: Schwarzwasserbruch (3/96).

Micrambe abietis Payk. Riesengebirge: Kiesewald an grünem Fichtenreisicht (7/12).

Chryptophagus Milleri Reitt. Glatzergebirge: Maria Schnee in Holz- und Heuschuppen nicht selten (10/10, 10/12), Beskiden: Jaworowy in einer Heuhütte (7/07).

Atomaria Herminae Reitt. (wiederhinzu). Paskau: Zarien nach Rtrr. (G.). — *A. alpina* Heer. Liegnitz: Forst Rehberg bei Panten unter abgeschälter Kiefernrinde, z. zahlr., frisch entw. (9/10).

Enicmus brevicollis Reitt. (neu). Lissa hora an schimmlicher Baumrinde nach Rtrr. (G.).

Cis fissicollis Mell. (neu). Südabhang der Lissa hora. 1 Stck. an Buchenschwamm nach Rtrr. (G.). — *C. reflexicollis* Ab. (neu). In Schlesien einzeln nach Rtrr. (G.). — *C. restitus* Mell. (neu). Paskau nach Rtrr. (G.). — *C. bicornis* Mell. (neu). Beskiden. 2 Stck. v. Rtrr. (G.).

Diphyllocis opaculus Reitt. (neu). Beskiden. 1 Stck. v. einem dürr. Ast nach Rtrr. (G.).

Ennearthron pruinolum Perris (neu). Paskau in den Gängen des *Cryphalus tiliae* Panz. nach Rtrr. (G.).

Aglenus brunneus Gyll. Liegnitz: Schimmelwitz in einem faul. Grashaufen (9/10).

Cerylon biscidicum Reitt. (neu). Lissa hora. Unicum nach Rtrr. (G.).

Cyphon padi L. kommt bei uns in folgenden Farbenabstufungen vor: 1) Decken dunkelbraun mit heller Spitze (a. *discolor* Panz.), am häufigsten und wohl Stammform, 2) Decken hellbraun, Nat und Seiten dunkler (a. *gratiosus* Kol.), 3) Decken ganz hellbraun, Spitzenmakel verwischt (a. *simplex* Schilsky). — *C. Paykulli* a. *alpinus* Bourg. mit heller Deckenspitze und a. *macer* Kiesw. klein, hellbraun, beide ebenfalls schlesisch.

Eubria palustris Germ. Riesengebirge: Kiesewald auf einer feucht. Waldblöße (7/12).

Latelmis Mülleri Er. (neu). Beskiden. 1 Stck. bei Rtrr. (G.).

Attagenus Schaefferi Hbst. Riesengebirge: Kiesewald (7/12).

Heterocerus pruinolum Kiesw. (neu). Breslau und Paskau nach Rtrr. (G.).

Selastosomus aeneus v. *bescidicus* Reitt. Beskiden bei Althammer nach Rtrr. (G.).

Hypnoidus flavipes Aubé (neu). Ostrawitzaufer nach Rtrr. (G.).

Cardiophorus Erichsoni Buyss. für *C. rufipes* Geoffr. einzustellen. Letzter im Rheinland (G.).

Athous villosus Geoffr. (neu). Lissa hora einzeln nach Rtrr. (G.).

Xylobius Seidlitzii Cziki (neu). Altvater. 1 Stück b. Rtrr. (G.).

Agrilus pseudocyaneus Kiesw. (Verzeichn. p. 417). Ostrawitzaufer b. Paskau auf Weidenschößlingen oft in Unzahl nach Rtrr. (G.).

Ptinus Edmundi Pic. (neu). Schlesische Beskiden nach Rtrr. (G.).

Anobium Thomsoni Kr. (neu). Paskau nach Rtrr. (G.).

Dorcatoma setosella Muls. (neu). Schlesien ohne Fundortsangabe v. Rtrr. (G.).

Anitys cognata Muls. (neu). Bei Paskau einmal an einem anbrüchigen Tulpenbaume mit *rubens* v. Rtrr. gesammelt (G.).

Orchesia acicularis Reitt. (neu). Schles. Beskiden an dürren Zäunen nach Rtrr. (G.).

Phloeotrya subtilis Reitt. (neu). Beskiden b. Teschen nach Rtrr. (G.).

Lagria atripes Muls. (neu). Paskau, Nimptsch, je 1 Stck. (Gabriel).

Otiorrhynchus spoliatus Stierl. = *chalceus* Stierl. (ab). Gehört nach Rtrrs. Tabelle in der Wiener entom. Zeitg. 1913 dem Salzkammergute an (G.).

Rhytidostoma fallax Otto (neu). Riesen- und Glatzergebirge (Gabriel).

Apion subulatum Kirby wurde von Herrn Sokolowsky aus den Samen von *Lathyrus sylvester* (Wölfelsgrund) gezogen.

Gegenwärtiger Stand:

74 Familien, 1061 Gattungen, 4521 Arten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [JH_6](#)

Autor(en)/Author(s): Kolbe Wilhelm

Artikel/Article: [Beiträge zur schlesischen Käferfauna 5-11](#)