

Beiträge zur schlesischen Käferfauna.

Von **W. Kolbe.**

Zugänge.

Medon piceus Kr. (Verz. II S. 122) ist wieder einzusetzen. Liegnitz: Elbrandtshöhe bei Dohnau unter Eichenlaub in Mehrzahl (5/89, 10/14). Die Heßberge sind als Fundort zu streichen.

Psylliodes chalcomera Ill. (Verz. III S. 326) ist von *Ps. hyoscyami* L. zu trennen (Reitter, Fauna germ. IV S. 210).

Ceutorrhynchus angulicollis Schultze auf *Lithospermum arvense*. Glatzgebirge: Kunzendorf bei Neurode (6/13). Von Herrn Generalmajor Gabriel festgestellt.

Ceutorrhynchus 4-punctatus Stierl. auf *Pulmonaria officinalis* und *Symphytum tuberosum*. Brieg: Hochwald (5/02), Schweinsdorf (5/98—5/10), Glatzgebirge (6/13), Neisse (5/15). Von Herrn Generalmajor Gabriel festgestellt. Liegnitz: Heßberge (coll. Gerh.).

Abgänge.

Lesteva Pandellei Fauv. (Verz. III S. 54) ist irrthümliche Bestimmung. Das Belagstück, an dem leider der Vorderkörper fehlt, gehört zweifellos zu *L. pubescens* Mannh.

Ceutorrhynchus rugulosus Hbst. (Verz. III S. 369) ist als Abart zu *C. chrysanthemi* Germ. zu stellen. Dr. Tyl, Wien. entomol. Zeit. 1914 S. 113 (Gabriel).

Weitere Ergänzungen.

Carabus auronitens a. *subcatenulatus* Westh. Riesengebirge: Kiesewald (7/13). *C. arvensis* v. *alpicola* Heer. Riesengebirgskamm 6/05 (R. Scholz).

Notiophilus pusillus Waterh. Altvatergebirge: Schäferei (7/14).

Amara cursitans Zimm. Bober-Katzbachgebirge: Jannowitz 7/14 (R. Scholz).

Pterostichus sudeticus Gerh. ist wieder durch *Pt. Illigeri* Panz. zu ersetzen, da sich die Typen als verhältnismäßig große und dunkle, aber nicht rein schwarze Stücke der letzteren Art erwiesen haben.

Halipus fulvus Fbr. n. var. *multistriatus* R. Scholz. Die Zwischenräume der Flügeldecken nahezu ebenso stark als die der Hauptreihen. Nach einem Exemplar aus Ungarn mitgeteilt vom Autor. Könnte auch bei uns vorkommen.

Lathrimacum atrocephalum Gyll. a. *nigripenne* m. Kopf, Flügeldecken und Abdomen schwarz. Liegnitz: Heßberge (5/13).

Anthophagus bicornis Block a. *marginicollis* Epp. Altvatergebirge: Schäferei (7/14).

Eudectus Giraudi Rdtb. auch im Riesengebirge: Breiter Berg bei Kiesewald (7/13).

Medon dilutus Er. ist für Liegnitz zu streichen. Die in coll. Gerh. vorhandenen Exemplare gehören zu *M. piceus* Kr.

Xantholinus glabratus Grav. Lüben: Brauchitschdorf 6/13 (Hinke). *X. glaber* Nordm. a. *angularis* Ganglb. in einer hohlen Pappel. Liegnitz: Jakobsdorfer Weg (4/14).

Philonthus rubripennis Ksw. Neisse 4/14 (Gabriel).

Gymnusa variegata Ksw. unter Laub auf quelligem Grunde. Liegnitz: Beckengrund bei Dohnau (4/13).

Myllaena elongata Matth. (Jahresheft 1914 S. 1) in Moos an Moortümpeln. Altvatergebirge: Abhang des Altvater mehrfach (7/14). Kommt also in der Ebene und auf dem Gebirge vor.

Aleuonota macella Er. unter Laub auf quelligem Grunde. Liegnitz: Beckengrund bei Dohnau (4/13).

Ocyusida rufescens Kr. an bemoosten Stämmen. Riesengebirge: Kiesewald (7/13).

Oxypoda funebris Kr. Altvatergebirge: Abhang des Altvater (7/14).

Dinarda dentata v. *pygmaea* Wsm. bei *Formica rufibarbis*. Liegnitz: Rehberg bei Panten 4/05 (R. Scholz).

Euplectus punctatus Muls. unter Eichenrinde. Neisse 4/15 (Gabriel).

Agyrtes bicolor Fbr. 2 Stück im Grase kriechend. Glatzergebirge: Wölfelsgrund 11/14 (Gabriel).

Anisotoma humeralis a. *globosa* Payk. Liegnitz: Wasserwald bei Kaltwasser 6/95 (R. Scholz).

Leptinus testaceus Müll. in einer Waldhütte unter modernem Heu. Altvatergebirge: Karlsbrunn (7/14).

Hister merdarius Hoffm. Liegnitz: Dohnau 5/14 (R. Scholz), Panten (6/91).

Rhizophagus acneus Richt. im Anspülicht. Liegnitz: Katzbach bei Dohnau (8/13).

Psamoecus bipunctatus Fbr. a. *unicolor* n. Flügeldecken einfarbig gelb, ohne Spur eines schwarzen Punktes. Liegnitz: Jakobsdorfer See (4/14).

Laemophloeus duplicatus Waltl. unter Eichenrinde. Neisse 5/15 (Gabriel).

Pteryngium crenatum Gyll. Glatzergebirge: Schmelze bei Reinerz 6/14 (R. Scholz).

Cryptophagus cylindricus Ksw. an Wildfutter. Bober-Katzbachgebirge: Rohrlach 7/14 (R. Scholz). *C. quercinus* Kr. in faulendem Heu. Altvatergebirge: Alte Schäferei (7/14). *C. Milleri* Rtrr. unter modernem Stroh. Liegnitz: Seichau (5/13), Leschwitz (5/13), Riesengebirge: Kieseewald (7/13).

Olibrus pygmaeus Strm. einmal sehr häufig auf Schimmelkraut (*Filago minima*). Liegnitz: Kohlhaus a. d. O. (5/13).

Corticaria abietinum Motsch. an Fichten. Riesengebirge: Kieseewald (7/13).

Rhinosimus ruficollis L. Ein bemerkenswertes Stück mit messingfarbenen Decken. Glatzergebirge: Wölfelsgrund 6/14 (Gabriel).

Hylophilus populneus Panz. Neisse 4/14 (Gabriel).

Tetratoma ancora Fbr. Glatzergebirge: Schmelze bei Reinerz 6/14 (R. Scholz).

Conopalpus testaceus Oliv. an einem Eichenstumpf. Lüben: Koslitz 7/13 (Hinke).

Scaphidema metallicum Fbr. a. *bicolor* Fbr. bei uns selten. Liegnitz: Peist bei Panten (5/06).

Diaperis boleti L. a. *fungi* Motsch. fast ebenso häufig als die Stammform.

Alphitobius piceus Ol. unter Laub 3 Exemplare. Bischofskoppe: Hubertusplatz 7/10 (Hinke). Wohl durch Touristen mit Südfrüchten verschleppt.

Donacia Malinowskyi Ahr. ist wieder durch *D. fennica* Payk. a. *Malinowskyi* Ahr. zu ersetzen. Die a. *arundinis* Ahr. fällt ganz weg, da das Fühlerwurzelglied der schlesischen Stücke wenigstens unten teilweise gelb ist (Reitter, F. g. IV, S. 76).

Cryptocephalus violaceus Laich. Liegnitz: Oderwald bei Malsch (5/14).

Chrysomela hyperici Forst. a. *privigna* Wse. weniger selten, besonders im Wasserwalde bei Kaltwasser (6/94).

Phytodecra viminalis L. a. *cincta* Wse. Liegnitz: Heßberge (Kossmann); a. *Gradli* Heyd. Liegnitz: Peist bei Panten (5/86).

Sclaerophaedon carniolicus Germ. a. *obscurus* Wse. Glatzergebirge: Grunwald a. d. Mense (10/09).

Luperus pinicola Dft. a. *sylvestris* Wse. Riesengebirge: Kiese Wald (7/13).

Lochmaea crataegi Forst. a. ♂ *binotata* Dft. Goldberg (5/86).

Galerucella calvariensis L. a. *lythri* Gyll. Liegnitz: Jeschkendorfer See (4/08).

Epithrix atropae Foudr. a. *nigritula* Wse. (selten) und *4-maculata* Wse. (fast ebenso häufig als die Stammform). Liegnitz: Heßberge (10/85, 6/86).

Hippuriphila Moderi L. a. *praescutellaris* Pic. Liegnitz: Jakobsdorfer See (4/86), Rehberg b. Panten (5/08).

Mantura chrysanthemi Koch a. *Crotchi* All. Liegnitz: Hummel (6/99), Panten (6/05).

Chaetocnema compressa Letz. Liegnitz: Oderdamm bei Malsch (4. 8/15).

Psylliodes napi Fbr. a. *Brisouti* Bed. nicht ganz selten. Liegnitz und Jannowitz.

Phyllotreta diademata Foudr. auf *Nasturtium amphibicum*. Liegnitz: Oderwald bei Maltsh häufig (7/. 8/11).

Aphthona pallida Bach a. *geranii* Wse. Liegnitz: Karthauswiesen (8/97). *A. violacea* Koch auf *Ephorbia palustris*. Liegnitz: Kohlhaus a. d. Oder nicht selten (6/13). *A. coerulea* Geoff. a. *metallescens* Wse. Liegnitz: Vorderheide (5/91).

Tropiphorus obtusus BOND. (Jahresheft 1914 S. 2). Glatzergebirge: Grunwald a. d. Mense 6/14 (R. Scholz). Scheint durch den ganzen Sudetenzug verbreitet zu sein.

Balaninus pellitus Boh. an Ahlkirsche. Neisse 4/15 (Gabriel).

Aphodius granarius L. a. *Ragusanus* Rtrr. und *brunnescens* Rtrr. Ersterer bei uns vorherrschend und von der Stammform nicht abgrenzbar; letzterer selten (R. Scholz).

Aphodius corvinus Er. n. a. *rufipennis* R. Scholz. Die Flügeldecken rotbraun. Liegnitz: Kl. Reichen. Vom Autor mitgeteilt.

Potosia cuprea Fbr. v. *sternohirta* Seidl. Riesengebirge: Ziegenrücken (R. Scholz).

Gegenwärtiger Stand:

74 Familien, 1061 Gattungen, 4524 Arten.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [JH_8](#)

Autor(en)/Author(s): Kolbe Wilhelm

Artikel/Article: [Beiträge zur schlesischen Käferfauna 16-20](#)