

Beiträge zur schlesischen Käferfauna.

Von **W. Kolbe.**

Zugänge.

Medon piceus Kr. (Verz. II S. 122) ist wieder einzusetzen. Liegnitz: Elbrandtshöhe bei Dohnau unter Eichenlaub in Mehrzahl (5/89, 10/14). Die Heßberge sind als Fundort zu streichen.

Psylliodes chalcomera Ill. (Verz. III S. 326) ist von *Ps. hyoscyami* L. zu trennen (Reitter, Fauna germ. IV S. 210).

Ceutorrhynchus angulicollis Schultze auf *Lithospermum arvense*. Glatzergebirge: Kunzendorf bei Neurode (6/13). Von Herrn Generalmajor Gabriel festgestellt.

Ceutorrhynchus 4-punctatus Stierl. auf *Pulmonaria officinalis* und *Sympytum tuberosum*. Brieg: Hochwald (5/02), Schweinsdorf (5/98—5/10), Glatzergebirge (6/13), Neisse (5/15). Von Herrn Generalmajor Gabriel festgestellt. Liegnitz: Heßberge (coll. Gerh.).

Abgänge.

Lesteva Pandellei Fauv. (Verz. III S. 54) ist irrtümliche Bestimmung. Das Belagstück, an dem leider der Vorderkörper fehlt, gehört zweifellos zu *L. pubescens* Mannh.

Ceutorrhynchus rugulosus Hbst. (Verz. III S. 369) ist als Abart zu *C. chrysanthemi* Germ. zu stellen. Dr. Tyl, Wien. entomol. Zeit. 1914 S. 113 (Gabriel).

Weitere Ergänzungen.

Carabus auronitens a. *subcatenulatus* Westh. Riesen-gebirge: Kiesewald (7/13). *C. arvensis* v. *alpicola* Heer. Riesengebirgskamm 6/05 (R. Scholz).

Notiophilus pusillus Waterh. Altvatergebirge: Schäferei (7/14).

Amara cursitans Zimm. Bober-Katzbachgebirge: Jannowitz 7/14 (R. Scholz).

Pterostichus sudeticus Gerh. ist wieder durch *Pt. Illigeri* Panz. zu ersetzen, da sich die Typen als verhältnismäßig große und dunkle, aber nicht rein schwarze Stücke der letzteren Art erwiesen haben.

Haliplus fulvus Fbr. n. var. *multistriatus* R. Scholz. Die Zwischenräume der Flügeldecken nahezu ebenso stark als die der Hauptreihen. Nach einem Exemplar aus Ungarn mitgeteilt vom Autor. Könnte auch bei uns vorkommen.

Lathrimaeum atrocephalum Gyll. a. *nigripenne* m. Kopf, Flügeldecken und Abdomen schwarz. Liegnitz: Heßberge (5/13).

Anthophagus bicornis Block a. *marginicollis* Epp. Altvatergebirge: Schäferei (7/14).

Eudectus Giraudi Rdtb. auch im Riesengebirge: Breiter Berg bei Kiesewald (7/13).

Medon dilutus Er. ist für Liegnitz zu streichen. Die in coll. Gerh. vorhandenen Exemplare gehören zu *M. piceus* Kr.

Xantholinus glabratus Grav. Lüben: Brauchitschdorf 6/13 (Hinke). *X. glaber* Nordm. a. *angularis* Ganglb. in einer hohlen Pappel. Liegnitz: Jakobsdorfer Weg (4/14).

Philonthus rubripennis Ksw. Neisse 4/14 (Gabriel).

Gymnusa variegata Ksw. unter Laub auf quelligem Grunde. Liegnitz: Beckengrund bei Dohnau (4/13).

Myllaena elongata Matth. (Jahresheft 1914 S. 1) in Moos an Moortümpeln. Altvatergebirge: Abhang des Altvater mehrfach (7/14). Kommt also in der Ebene und auf dem Gebirge vor.

Aleuonota macella Er. unter Laub auf quelligem Grunde. Liegnitz: Beckengrund bei Dohnau (4/13).

Ocyusida rufescens Kr. an bemoosten Stämmen. Riesengebirge: Kiesewald (7/13).

Oxypoda funebris Kr. Altvatergebirge: Abhang des Altvater (7/14).

Dinarda dentata v. *pygmaea* Wsm. bei *Formica rufibarbis*. Liegnitz: Rehberg bei Panten 4/05 (R. Scholz).

Euplectus punctatus Muls. unter Eichenrinde. Neisse 4/15 (Gabriel).

Agyrtes bicolor Fbr. 2 Stück im Grase kriechend. Glatzergebirge: Wölfelsgrund 11/14 (Gabriel).

Anisotoma humeralis a. *globosa* Payk. Liegnitz: Wasserdwald bei Kaltwasser 6/95 (R. Scholz).

Leptinus testaceus Müll. in einer Waldhütte unter modernem Heu. Altvatergebirge: Karlsbrunn (7/14).

Hister merdarius Hoffm. Liegnitz: Dohnau 5/14 (R. Scholz), Panten (6/91).

Rhizophagus aeneus Richt. im Anspüllicht. Liegnitz: Katzbach bei Dohnau (8/13).

Psamoeicus bipunctatus Fbr. a. *unicolor* m. Flügeldecken einfarbig gelb, ohne Spur eines schwarzen Punktes. Liegnitz: Jakobsdorfer See (4/14).

Laemophloeus duplicatus Waltl. unter Eichenrinde. Neisse 5/15 (Gabriel).

Pteryngium crenatum Gyll. Glatzergebirge: Schmelze bei Reinerz 6/14 (R. Scholz).

Cryptophagus cylindricus Ksw. an Wildfutter. Bober-Katzbachgebirge: Rohrlach 7/14 (R. Scholz). *C. quercinus* Kr. in faulendem Heu. Altvatergebirge: Alte Schäferei (7/14). *C. Milleri* Rtr. unter moderndem Stroh. Liegnitz: Seichau (5/13), Leschwitz (5/13), Riesengebirge: Kiesewald (7/13).

Olibrus pygmaeus Strm. einmal sehr häufig auf Schimmelkraut (*Filago minima*). Liegnitz: Kohlhaus a. d. O. (5/13).

Corticaria abietinum Motsch. an Fichten. Riesengebirge: Kiesewald (7/13).

Rhinosimus ruficollis L. Ein bemerkenswertes Stück mit messingfarbenen Decken. Glatzergebirge: Wölfelsgrund 6/14 (Gabriel).

Hylophilus populneus Panz. Neisse 4/14 (Gabriel).

Tetratoma ancora Fbr. Glatzgebirge: Schmelze bei Reinerz 6/14 (R. Scholz).

Conopalpus testaceus Oliv. an einem Eichenstumpf. Lüben: Koslitz 7/13 (Hinke).

Scaphidemina metallicum Fbr. a. bicolor Fbr. bei uns selten. Liegnitz: Peist bei Panten (5/06).

Diaperis boleti L. a. fungi Motsch. fast ebenso häufig als die Stammform.

Alphitobius piceus Ol. unter Laub 3 Exemplare. Bischofskoppe: Hubertusplatz 7/10 (Hinke). Wohl durch Touristen mit Südfrüchten verschleppt.

Donacia Malinowskyi Ahr. ist wieder durch D. fennica Payk. a. Malinowskyi Ahr. zu ersetzen. Die a. arundinis Ahr. fällt ganz weg, da das Fühlerwurzelglied der schlesischen Stücke wenigstens unten teilweise gelb ist (Reitter, F. g. IV, S. 76).

Cryptocephalus violaceus Laich. Liegnitz: Oderwald bei Maltsch (5/14).

Chrysomela hyperici Forst. a. privigna Wse. weniger selten, besonders im Wasserwalde bei Kaltwasser (6/94).

Phytodecta viminalis L. a. cincta Wse. Liegnitz: Heßberge (Koßmann); a. Gradli Heyd. Liegnitz: Peist bei Panten (5/86).

Sclerophaedon carniolicus Germ. a. obscurus Wse. Glatzgebirge: Grunwald a. d. Mense (10/09).

Luperus pinicola Dft. a. sylvestris Wse. Riesengebirge: Kiesewald (7/13).

Lochmaea crataegi Forst. a. ♂ binotata Dft. Goldberg (5/86).

Galerucella calmariensis L. a. lythri Gyll. Liegnitz: Jeschkendorfer See (4/08).

Epithrix atropae Foudr. a. nigritula Wse. (selten) und +maculata Wse. (fast ebenso häufig als die Stammform). Liegnitz: Heßberge (10/85, 6/86).

Hippuriphila Moderi L. a. praescutellaris Pic. Liegnitz: Jakobsdorfer See (4/86), Rehberg b. Panten (5/08).

Mantura chrysanthemi Koch a. Crotchi All. Liegnitz: Hummel (6/99), Panten (6/05).

Chaetocnema compressa Letz. Liegnitz: Oderdamm bei Maltsch (4./ 8/15).

— 20 —

Psylliodes napi Fbr. a. *Brisouti* Bed. nicht ganz selten. Liegnitz und Jannowitz.

Phyllotreta diademata Foudr. auf *Nasturtium amphibicum*. Liegnitz: Oderwald bei Maltsch häufig (7/. 8/11).

Aphthona pallida Bach a. *geranii* Wse. Liegnitz: Karthauswiesen (8/97). *A. violacea* Koch auf *Ephorbia palustris*. Liegnitz: Kohlhaus a. d. Oder nicht selten (6/13). *A. coerulea* Geoff. a. *metallescens* Wsc. Liegnitz: Vorderheide (5/91).

Tropiphorus obtusus Bonsd. (Jahresheft 1914 S. 2). Glatzergebirge: Grunwald a. d. Mense 6/14 (R. Scholz). Scheint durch den ganzen Sudetenzug verbreitet zu sein.

Balaninus pellitus Boh. an Ahlkirsche. Neisse 4/15 (Gabriel).

Aphodius granarius L. a. *Ragusanus* Rtr. und *brunnescens* Rtr. Ersterer bei uns vorherrschend und von der Stammform nicht abgrenzbar; letzterer selten (R. Scholz).

Aphodius corvinus Er. n. a. *rufipennis* R. Scholz. Die Flügeldecken rotbraun. Liegnitz: Kl. Reichen. Vom Autor mitgeteilt.

Potosia cuprea Fbr. v. *sternohirta* Seidl. Riesengebirge: Ziegenrücken (R. Scholz).

Gegenwärtiger Stand:

74 Familien, 1061 Gattungen, 4524 Arten.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [JH_8](#)

Autor(en)/Author(s): Kolbe Wilhelm

Artikel/Article: [Beiträge zur schlesischen Käferfauna 16-20](#)