

Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1897.

Von **J. Gerhardt**—Liegnitz.

Beiträge zu diesen Aufzeichnungen lieferten die Herren: Landesbau-Inспекtor Ansorge—Breslau (A.), Generalmajor Gabriel—Neisse (Gb.), Oberlehrer Gerhardt (G.), Rektor Kolbe (Klb.), und Landgerichtsrath Kossmann (Ks.)—Liegnitz, Oberamtmann Müller—Breslau (M.), Steuerinspektor Pietsch—Ohlau (P.), Lehrer Scholz—Liegnitz (Sch.), Kaufmann Schwarz *ibid.* (Schw.).

Oefters wiederkehrende Fundorte sind: Kr. Breslau: Kottwitz, Masselwitz, Ransern; Kr. Liegnitz: Altbeckern, Arnsdorf, Dohnau, Hummel, Johnsdorf, Panten, Rüstern, Schmochwitz; Kr. Lüben: Kaltwasser, Vorderhaide, Krummlinde; Kr. Namslau: Simmelwitz; Kr. Oppeln: Karlsruhe; Kr. Nimptsch: Quanzendorf; Kr. Neumarkt: Stephansdorf, Lissa; Kr. Trebnitz: Mahlen, Pappelhof; Kr. Schönau: Bleiberge, Ketschdorf, Jannowitz.

Cicindela sylvatica L. Simmelwitz, Mahlen (M.).

Calosoma auropunctatum Payk. Zwischen Daubitz und Rietschen in der Oberlausitz (Oberlehrer Sommer).

Carabus intricatus L. Simmelwitz (M.).

Alle Stücke von *Nebria Jockischi* St., welche auf dem Riesengebirge gesammelt wurden, gehören, soweit ich solche gesehen, zu *nigricornis* Villa = *Höpfneri* Heer. Es ist fraglich, ob die echte *Jockischi* überhaupt in Schlesien vorkommt, da sie von Ganglbaur als Alpenbewohner aufgeführt wird.

Omophron limbatum F. und *Elaphrus cupreus* Dft. Pappelhof (M.).

Bembidium Mannerheimii Sahlb. Bei Liegnitz unter Laub fast überall n. s.; an der Katzbach dagegen ist das so ähnliche *B. obtusum* z. hfg. (K. G.).

An der Katzbach bei Liegnitz kommt *Ophonus ripicola* nicht vor. Hiernach ist die Bemerkung aus dem Berichte von 1897 zu berichtigen. *O. brevicollis* Dej. ist dagegen häufig.

Ophonus signaticornis Dej. und *Stelonophus mixtus* Hbst. Pappelhof. *Amara rufipes* Dej. in 1 Ex. Masselwitz, *A. montivaga* St. ibid., *A. nitida* St. Simmelwitz, *A. bifrons* Gyll. Pappelhof und *A. brunnea* Gyll. Simmelwitz (M.).

Bradycellus verbasci Dft. Im Angeschwemmten des Bobers bei Jannowitz (Klb.) 30. 7.

Poecilus punctulatus Schall. Simmelwitz, *Sphodrus leucophthalmus* L., *Laemosthenus inaequalis* Pz. und *Dolichus halensis* Schall. Pappelhof, *Synuchus nivalis* Pz. Lissa-Hora, Ratibor, Simmelwitz (M.).

Agonum gracilipes Dft. Neisse (Gb.).

Demetrius imperialis Germ. Pappelhof und *Dromius quadrinotatus* Pz. Simmelwitz (M.), *Dr. nigriventris* Th. Hummel, an einem Gartenzaune (Klb.) 9.

Haliplus immaculatus Gerh. Jannowitz im Angeschwemmten des Bobers (Klb.) 7.

Hydroporus notatus St., *elongatulus* St., *neglectus* Schaum und *oblongus* Steph. (ss.) in den Tümpeln des verlorenen Wassers bei Panten (Klb.).

Agabus nitidus F. Zwischen Lindenruh und der Siegeshöhe bei Liegnitz in einem Graben hfg. 6. (Klb.)

Agabus subtilis Er. Panten (Klb.).

Dytiscus latissimus L. Karlsruhe (M.).

Mitte August fand sich *Helophorus strigifrons* Thoms., früher als s. s. bezeichnet, zu Hunderten im Angeschwemmten des Schwarzwassers und zwar unvermischt mit anderen Arten seiner Gattung. (G.)

Cercyon obsoletus Gyll. Pappelhof (M.).

Heterocerus hispidulus Ksw. Einzeln im Angeschwemmten der Katzbach (Klb. G.).

Bolitochara bella Mrkl. In den Hessbergen (10) und an einem *Agaricus caudicinus* bei Dohnau (Kr. Liegnitz) mit *Bolitobius lunulatus* und *Magacronus striatus* in je 1 Stck. (Klb.) 6.

Leptusa haemorrhoidalis Heer. Bleiberge. In Rothbuchenschwämmen (G.) 6. Im Peist unter Birkenrinde (Klb.) 4.

Aleochara ruficornis Gr. Verlorenes Wasser bei Panten. (Klb.) 5. *A. erythroptera* Gr. Riesengeb. und *A. spadicea* Er. (Gb.) *A. fumata* Gr. Kottwitz, im Detritus der Oder (Gb.). *A. inconspicua* Aubé. Jannowitz, im Angeschwemmten des Bobers (Kb.) 7.

Die von Liegnitz publizirten Fundorte für *Aleochara villosa* beziehen sich sämmtlich auf *A. rufitarsis* Heer.

Ocalea rivularis Mill. Ketschdorf, unter Wassermoos der Katzbach und seiner Zuflüsse. (G.) 6.

Falagria thoracica Curt. Jannowitz, bei Hochwasser. (Klb.) 7.

Tachyusa flavitarsis Sahlb. Neisse (Gb.). Bei der Oberförsterei Panten an den Katzbachufern n. s. (Klb.) 5—7.

Homalota velox Kr. Jannowitz, bei Hochwasser (Klb.) 7.

H. granigera Ksw. Ketschdorf, aus Laub (G.). *H. crassicornis* Gyll. Riesengeb. Spindelmühl, in Pilzen (Dr. Rodt, Prag). *H. oblita* Er. Bleiberge (G.) 6. *H. corvina* Th. und *subtilis* Scriba Riesengeb. (Gb.). *H. occulta* Er. Hessberge, an faulenden Pilzen n. s. (Klb.) 10.

Thectura plana Gyll. Bleiberge, unter Tannenrinde (G.) 7.

Th. immersa Er. Kaltwasser (6), Peist (Klb.) 5.

Gyrophæna strictula Er. Neisse, Briesener Wald (Gb.).

Phloeopora corticalis Gr. Neisse (Gb.), Liegnitz unter Platanenrinde (G.) 1.

Tachinus subterraneus L. Hessberge (Klb.) 10. N. s.

Tachyporus ruficeps Kr. Neisse (Gb.).

Conurus immaculatus Steph. Riesengeb. und *C. pedicularius* Gr. Nimptsch (Gb.).

Megacronus formosus Gr. Quanzendorf (Gb.).

Mycetoporus punctus Gyll. Pappelhof (M.). *M. niger* Fairm. Altvater (Gb.).

- Quedius lucidulus* Er. Hessberge, an faulenden Pilzen n. s. (Klb.) 10. *Q. paradisianus* Heer. mit goldgelber Behaarung. Bleiberge, Schwarzer Berg im Waldenb. Geb., je 1 Stck. (Klb.) 7. 8.
- Staphylinus stercorarius* Ol. Krummlinde, in einem Fanggraben des herrsch. Forstes (G.) 8. *St. ater* Gr. Pappelhof (M.).
- Philonthus punctus* Gr. Pappelhof (M.). *Ph. laminatus* Creutz. und *Ph. lucens* Er. Jannowitz bei Hochwasser (Klb.) 7.
- Xantholinus fulgidus* F. Pappelhof (M.)
- Lathrobium multipunctatum* Gr. Jannowitz, im Angeschwemmten des Bobers (Klb.) 7.
- Paederus brevipennis* Lac. und *P. limnophilus* Er. Pappelhof (M.).
- Stenus lustrator* Er. Im Angeschwemmten der Oder bei Kottwitz (Gb.). *St. brunnipes* Steph., *pubescens* Steph. und *picipes* Steph. Riesengeb. (Gb.).
- Bledius crassicollis* Lac. 1 Stck. im Katzbachdetritus bei Liegnitz (G.) 7.
- Platysthetus capito* Heer. Glatzer Geb. und *nodifrons* Sahlb. Kottwitz im Angeschwemmten der Oder (Gb.)
- Syntomium aeneum* Müll. Hessberge, in mit Moos überwucherten Baumstümpfen n. s., auch die schwarze, hochgewölbte Larve (Klb.) 10.
- Lesteva pubescens* Mnnh. und *punctata* Er. Jannowitz, im Rolfengrunde (Klb.) 7.
- Arpedium quadrum* Gr. Pappelhof (M.).
- Biblioporus bicolor* Denny. Johnsdorf (5), Dohnau (4), Katzbach b. L. (5), Neuhaus b. Waldenb. (8), in Stubben (Klb.).
- Cephennium laticolle* Aub. Jannowitz, im Rolfengrunde unter Laub (Klb.) 7.
- Ptomaphagus fumatus* Spence. Bleiberge (G.) 6.
- Blitophaga opaca* L. trat besonders im Larvenzustande während des Frühjahres 1897 auf den Liegnitzer Rieselfeldern bei Hummel als Rübenschildling auf. Ende Juni war die Zeit der Larven nahezu zu Ende (Klb.) Im Septbr.

- finden sich fertige Käfer in ihren Winterquartieren unter Moos der benachbarten Kieferwäldungen (G.).
- Sphaerites glabratus* F. Riesengeb. (M. Dr. Rodt.).
- Hydnobius multistriatus* Gyll. und *Liodes picea* Ill. Bleiberge bei Jannowitz, L. Triepkei Schmdt., *silesiaca* Kr. und *ovalis* Schmdt. bei Hochwasser am Bober bei Jannowitz (Klb.) 7.
- Agaricophagus cephalotes* Sch. Bleiberge (Südseite) 7 Klb.
- Anisotoma glabra* Kug. In Peist an Baumschwämmen (Klb.) 5.
- Agathidium rotundatum* Gyll. Krummlinde (G.) 9, Hesseberge unter Ahornrinde, in Stubben (Klb. u. Sch.) 10. *A. marginatum* St. Bremberg, Pahlowitz (5), Schwarzwasserbruch b. L. (4), Dohnau (8), stets einzeln (Klb., Sch.). Als Kuriosum erscheint 1 Stck. von *Olibrus millefolii* aus der Gegend von Nimptsch mit 2 sehr kräftigen Basalgruben des Halsschildes, die bei ihrer gleichmässigen Vertheilung zu beiden Seiten der Mitte ganz den Eindruck einer besonderen Art hervorrufen. (Gb.)
- Cyrtotriplax bipustulata* Var. *bipunctata*. Breslau (A.), Kaltwasser (G.) s.
- Antherophagus silaceus* Hbst. Nimptsch (Gb.)
- Atomaria turgida* Er. Glatzer Gebirge und *diluta* Er. Riesengeb. (Gb.), *A. gibbula* Er. Jannowitz, unter Laub (Klb.) 7.
- Tritoma populi* F. Glatzer Schneeberg (M.).
- Brachypterus glaber* Neum. Ebendas. (M.).
- Epuraea variegata* Hbst. Bleiberge (Klb.) 7.
- Meligethes viridescens* F. mit bronzefarbenen Decken. Quanzendorf (Gb.). *M. maurus* St. In den Blüten der *Nepeta cataria* z. s. Hummel, Liegnitz, Prinkendorf b. L. (G.) 8.
- Attagenus vigintiguttatus* F. Neisse (Gb.).
- Nosodendron fasciculare* Ol. Pappelhof (M.).
- Cistela arietinus* Steff. Im Hochwald b. Brieg von einer Weide an einem Wasserloche geklopft. Der erste Fundort für die schlesische Ebene.

- Simplocaria metallica* St. Ein Stück dieser ss. schles. Art
fing Schw. auf dem Gipfel der Schneekoppe Anfang 9.
Hister ventralis Mars. und *marginatus* Er. Pappelhof (M.)
Dorcus parallelepipedus L. Simmelwitz (M.)
Odontaeus armiger Scop. Ketschdorf, gegen Abend (G.) 6.
Oryctes nasicornis L., *Polyphylla fullo* L. und *Homa-*
lophia ruricola F. Simmelwitz, *Osmoderma eremita*
Scop. Simmelwitz und Pappelhof, *Anthaxia morio* F.
Simmelwitz (M.).
Agrius integerrimus Ratzb. Nimptsch, Altvater (Gb.).
Elater elongatulus F. Nimptsch (Gb.)
Cryptohypnus maritimus Curt. Lissa-Hora (P.) 6.
Athous mutilatus Rosh. 1 Stck. an einer alten Eiche bei
Dohnau (Klb.) 6.
Cardiophorus ruficollis L. Simmelwitz (M.).
Der Vorderrand des Halsschildes ist bei *Athous* Zebei nicht,
wie angegeben wird, ganz grade, sondern beiderseits der
Mitte ein wenig ausgebuchtet. (Gb., G.).
Corymbites pectinicornis L. Mahlen, Stephansdorf (M.).
Corymbites serraticornis Payk. An der Wölfel, An-
fang 6 (Gb.).
Corymbites cruciatus L. Simmelwitz, Betarmon pici-
pennis Bach. Glatzer Schneeberg (M.).
Hydrocyphon deflexicollis Müll. Ketschdorf, an einem
Wiesenbach, von Erlen, namentlich aber von den unteren
Blättern des *Cirsium oleraceum* geklopft, n. s. (G.) 6.
Eubria palustris Germ. Ketschdorf (G.).
Eros Aurora Hbst. Zobtenberg (M.).
Ein deformirtes Stück der *Cantharis fusca*, Neisse (Gb.).
An der Deformation nimmt nur die linke Seite des Thieres
theil, sie ist wahrnehmbar an einem Fühler, einer Mandibel
und einem Vorder- und Mittelbein.
Cantharis pulicaria F. Neisse, auf einem Ex. der *Euphorbia*
cyparissias zahlreich (Gb.).
Rhagonycha translucida Kryn. Bleiberge, n. s. (G.) 6.
Malthodes nigellus Ksw. Bleiberge, hfg., namentlich auf
Blaubeeren. Der aufstehende Zahn in der Mitte der breiten

Ausrandung des letzten Abdominalsegments beim ♂ kann leicht übersehen werden, wenn dieses nicht etwas aufgebogen wird — denn gewöhnlich liegt es an — und man kommt dann auf *M. lunifer*.

Malthodes brevicollis Payk. muss in Aufl. II d. Verz. schles. Käfer in *brevicollis* Ksw. umgeändert werden (s. Seidlitz), *brevicollis* Payk. kommt zu *nigellus* und *atomus* Th. ist eine nordische Art. Es glückte mir durch Köschern von Blaubeeren endlich nach 49jährigem vergeblichen Suchen ein ♂ des Kiesenwetter'schen *brevicollis* aufzufinden. Fast möchte ich Herrn v. Kiesenwetter Recht geben, wenn er meint, dass diese unansehnliche Art auf parthenogetische Weise sich fortpflanze. Er hat in seiner langen Sammelzeit auch nur 2 oder 3 ♂ gefangen. Oder kommt das ♂ vielleicht zur Nachtzeit oder sehr früh am Tage auf die Oberfläche der Erde, um sich zu paaren, während es am Tage im Verborgenen sich aufhält? Eine dahingehende Untersuchung dürfte zu empfehlen sein. (G.)

Malachius rubidus Er. Glatzer Schneeberg (M.).

Attalus analis Pz. Bleiberge, von Fichten geklopft (G.) 6.

Ebaeus flavicornis Var. *ater* Ksw. Neisse (Gb.).

Dasytes aerosus Ksw. Schweinsdorf bei Neustadt, Nimptsch (Gb.) 5.

Bruchus sexpunctatus Pz. Schmochwitz, von einer Eiche 1 Stck. (Klb.).

Dryophilus pusillus Gyll. Pappelhof (M.), Nimptsch (Gb.).

Gastrallus laevigatus Ol. 1 Stck. an einer alten Eiche bei Dohnau (Klb.) 7.

Ernobius abietinus Gyll., *E. angusticollis* Ratzb. und *E. parvicollis* Muls. Bleiberge (G.) 6. *E. nigrinus* St. Riesengeb. (Gb.).

Hedobia imperialis L. Riesengeb., Altvatergeb., Nimptsch (Gb.).

Xyletinus ater Pz. Bleiberge, 6 (G.).

Sphindus dubius Gyll. 1 Stck. in den Hessbergen (Sch.) 10.

Lyctus pubescens Pz. Pappelhof.

Cis micans F. Hessberge (Sch.) 10.

Ennearthron affine Gyll. Bunzlau (G.), Glatzer Geb. (Gb.), Mahlen (M.).

Opatrum riparium Scriba war nach der Juli-Ueberschwemmung des Schwarzwasserbruchs bei L. in den an der feuchten Nordseite des Bruchdammes lagernden Detritusmassen häufig, die entgegengesetzte trockene Dammseite zeigte nur *O. sabulosum*. 8. Ausnahmsweise kommt letzteres auch im Trockenem vor. So fand Klb. 1 Stck. auf einem Sandwege bei Schönborn b. L. unter vielen *sabulosum* (4).

Scaphidema metallicum F. Stephansdorf (M.).

Orchesia minor Walk. Wölfelsgrund (Gb.) 6, Bleiberge (Klb.) an trockenen Schlehensträuchern (7).

Xylita livida Sahlb. Lissa-Hora, n. s. (Schwab, durch P. mitgetheilt).

Pyrochroa pectinicornis L. Kaltwasser, an einem Baumstumpfe 5 (Ksw.), Peist (Klb. 2). Ihre Larve kam hier unter Rinde faulender Birken n. s. vor. Sie ist der von *coccinea* durchaus ähnlich, lässt aber wegen ihrer geringen Grösse sofort auf diese kleinere Art schliessen. Ich erzog aus ihnen bereits Ende April einige Käfer. (Klb.)

Cyrtanaspis phalerata Germ. Bleiberge b. Jannowitz von trockenen Schlehensträuchern (Klb.) 7.

Mordellistena abdominalis F. und *Cerocoma Schaefferi* L. Pappelhof, *Oedemera flavipes* F. und *Chrysanthia viridissima* L. Simmelwitz (M.).

Pytho abieticola J. Sahlb. Im Thale der schwarzen Wölfel ein Stük auf einer Fichtenklafter (Gb.). Zweiter schlesischer Fundort.

Salpingus castaneus Pz. Simmelwitz (M.).

Salpingus bimaculatus Gyll. Zahlreich von dürrn Kieferästen bei Ohlau (P.).

Liophloeus Schmidtii Boh. Neisse (Gb.).

Chlorophanus viridis L. An der Katzbach bei Dohnau auf Weiden nicht gerade s. (Klb.) 6.

Hypera contaminata Hbst. Ein Stück von Anthyllis auf den Pantener Höhen (G.) 8.

Trachodes hispidus L. Ohlau (Sokolowsky—Breslau).

- Pissodes piniphilus* Hbst. Mahlen (M.); *P. scabricollis* Mill. Wölfelsgrund (Gb.) 6.
- Erirrhinus nereis* Payk. und *scirrhosus* Gyll. Ransern (M.).
- Dorytomus Dejeani* Faust. Bei Lähn hfg. auf *Salix cinerea* (G.) 7.
- Acalles hypocrita* Boh. Hessberge, in faulenden Baumstümpfen (Klb.) 10.
- Magdalis carbonaria* L. Neisse, von Birken (Gb.), Riesengebirge. (Klette'sche Sammlung); *M. nitida* Gyll. Vorderhaide, von *Salix caprea*, Bleiberge (G.) 6; *M. barbicornis* Latr. Bleiberge, von Laubholz (G.) 6.
- Balaninus venosus* Gr. Nimptsch (Gb.).
- Anthonomus varians* Var. *perforator* Hbst. Simmelwitz (M.).
- Tychius aureolus* Var. *medicaginis* Bris. (mit schwarzer Fühlerkeule) Liegnitz, n. s. (G.).
- Gymnetron pascuorum* Gyll. Pappelhof (M.).
- Orchestes scutellaris* Var. *testaceus* Müll. Simmelwitz (M.).
- Rhitidosomus globulus* Hbst. Bleiberge (G.).
- Ceuthorrhynchidius pulvinatus* Gyll. Lebt als Imago auf *Berteroa incana*. Pantener Höhen, zahlreich (G.) 8. *C. nigrinus* Marsh. Nimptsch (Gb.) 8.
- Ceuthorrhynchus nanus* Gyll. Altvater (Gb.); *constrictus* Marsh. Bleiberge (G.); *Andreae* Germ. Dohnau (Klb.); *C. trimaculatus* F. Glatzer Schneeberg (G.); *C. ignitus* Germ. Altbeckern, Panten, von *Berteroa* (G.).
- Baris artemisiae* Hbst. Simmelwitz (M.).
- Sphenophorus abbreviatus* F. Pappelhof (M.).
- Apion cerdo* Gerst. Nimptsch (Gb.) 8; *A. scalptum* Muls. Quanzendorf (Gb.) Ende Mai; *A. atomarium* Kirby Riesengebirge, Neisse (Gb.) 8; *A. punctigerum* Thunb. Pappelhof (M.); *A. Gyllenhali* Kirby. Hummel (G.) 9; *A. angustatum* Kirby. Nimptsch (Gb.); *A. affine* Kirby. Neisse (Gb.).
- Rhynchites megacephalus* Germ. Pappelhof (M.), Bleiberge (G.); *R. pubescens* F. Stephansdorf (M.); *R. cyaneo-*

cephalus Hbst. Simmelwitz (M.); *olivaceus* Gyll. Hochwald bei Brieg (Gb.).

Mylabris marginalis F. Neisse (Gb.).

Hylesinus fraxini Fbr. Kleine Stücke etwa von halber Länge der Stammform, mit grauem Schuppenkleide, wahrscheinlich *H. varius* Fbr., fand Gb. in Neisse.

Phloeophthorus rhododactylus Marsh. Glatzer Geb. (Gb.), Bleiberge (G.) 6.

Scolytus Ratzeburgi Jans. Simmelwitz (M.).

Pityophthorus micrographus L. Wölfelsgrund (Gb.).

Xyleborus cryptophagus Ratzb. Kaltwasser (Ksw.) 6.

Grammoptera ruficornis F. Pappelhof und *G. variegata* Germ. Riesengeb. (M.).

Leptura rufipes Schaller Riesengeb., *L. dubia* Scop. und Var. *melanota* Fuld. Lissa-Hora, *L. nigra* L. und *attenuata* L. Simmelwitz (M.).

Necydalis Panzeri Harold Simmelwitz; *Malorchus umbellatarum* L. Pappelhof; *Obrium brunneum* F. ibid. (M.).

Pogonochaerus hispidus Schrank Pappelhof, *P. scutellaris* Muls. ibid. und *P. ovatus* Muls. Simmelwitz (M.).

Mesosa curculionoides L. Kaltwasser, an Eichenreisig (Klb.) 6.

Saperda octopunctata Scop. Hfg. auf alten Linden bei Dohnau (Klb., Sch.).

Phytoecia nigricornis F. Mehrere Stücke an alten Linden mit der vorigen (Klb., Sch.).

Labidostomis tridentata L. Peist, 1 Stck. von Gesträuch geklopft (Klb.) 5.

Cryptocephalus coryli L. und *sempunctatus* L. Pappelhof (M.); *C. violaceus* F. Bleiberge (G.); *C. hypochoeridis* L. in goldglänzenden Stücken, die als Var. *aureus* bezeichnet werden könnten, auf den Pantener Höhen (G.); *C. pini* L. Simmelwitz (M.); *C. frontalis* Marsh. Bleiberge (G.); *C. flavipes* F. von Gesträuch bei Kaltwasser, Dohnau und Panten (Klb.) 5, 6.

Chrysomela brunsvicensis Gr. Altvater: Würbenthal, von *Hypericum perforatum* (P.) 7; *C. menthastri* in der gold-

glänzenden Var. *fulminans* Suffr. auf *Mentha sylvestris* in Panten (G.).

Phytodecta Linneana Schrank. Breslau, im Anspülicht 1 Ex. (M.).

Melosoma vigintipunctata Scop. Pappelhof (M.).

Ochrosis salicariae Payk. Neisse, Kottwitz (Gb.).

Chalcoides nitidula L. Nimptsch (Gb.), Ketschdorf (G.) 6.

Psylliodes cuprea Koch. Hummel, von stark mit Mehlthau behaftetem Hopfengesträuch mehrfach (G.) 7, 8.

Haltica quercetorum Foudr. und Var. *brevicollis* Foudr. Rüstern, von Eichengesträuch, die Var. (Decken ohne Seitenfurche) viel häufiger als die Stammform. *H. ampelophaga* Guér., die dem S. Europas angehört, ist für Schlesien zu streichen. Die dafür gehaltenen Ex. zählen zur vorhergenannten Art.

Longitarsus flavicornis Steph. Neisse (Gb.).

Dibolia Försteri Bach. Im Beckergrunde bei Dohnau auf *Betonica officinalis* n. s. (Klb.) 8.

Cassida rufovirens Suffr. Im Schwarzwasserbruch b. L. 1 Stck. gesiebt (Klb.) 3.

Halysia 16-guttata L. Simmelwitz, Pappelhof; *H. 15-guttata* F. Pappelhof (M.).

Hyperaspis campestris Hbst. Nimptsch (Gb.) 5, Ketschdorf, aus Laub (G.) 6; *S. reppensis* Hbst. Neisse (Gb.) 5.

Rhizobius litura F. Hummel und Rüstern, von Hopfengesträuch (G.) 8, 9.

Scymnus bipunctatus Kug. Nimptsch (Gb.); *S. suturalis* v. *limbatus* Steph. 1 Stck. bei L. (G.); *S. Redtenbacheri* Muls. Nimptsch (Gb.).



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [NF_23](#)

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: [Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1897 1-11](#)