

Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1898.

Von **J. Gerhardt**—Liegnitz.

Der diesjährige Bericht greift auf eine Anzahl Arten zurück, welche während der mehrere Jahre andauernden Bearbeitung der II. Auflage des Letzner'schen Verzeichnisses der Käfer Schlesiens ihre Veröffentlichung in unserem Vereinsblatte nicht finden konnten und deshalb in der Deutschen entomologischen Zeitschrift und in den Jahresberichten der schles. Gesellschaft zur Publikation gelangten, ausserdem auch einige Arten, die früher als Varietäten galten und dann noch die vorjährigen Zugänge.

1. *Elaphrus smaragdinus* Rtrr. Bei Paskau an den Ufern der Ostrawitza im Frühjahr n. s. (Antonie Kubischtek). (Jahresber. d. schles. Ges. 1887.)
2. *Patrobus clavipes* Th., *excavatus* var. *assimilis* Chaud., *campestris* Motsch. Auf dem Riesenkamme häufiger als *excavatus* Payk., von dem er als Var. genommen wurde.

Panagaeus crux major v. *Schaumi* Ganglb. Von *P. bipustulatus* mit ähnlicher Zeichnung am besten an den stark vortretenden Augen zu erkennen. Liegnitz (Gerh.), Neisse (Gabriel).

3. *Stenolophus marginatus* Dej. var. *Klettei* Gabr. *) Im Riesengeb. von Herrn Generalmajor Gabriel in 1 Ex. gefangen. Die Var. unterscheidet sich hauptsächlich von der Stammform, die mehr dem mediterranen Süden angehört, durch die schwarzen Exipleuren und den Metallschimmer der Decken und ist von allen übrigen schlesischen *Stenolophus*-Arten durch die deutliche Zuspitzung des letzten Maxillartastergliedes leicht zu unterscheiden (*Egadroma* Motsch.). Neu für Mittel-Europa.
4. *Dromius 4-signatus* Dej. Von Letzner bei Breslau a. d. alten Oder im Mai gegen Abend ein Stück im Fluge gefangen, ausserdem 2 Stücke unter seinen Vorräthen von *4-notatus*. (Jahresber. d. schles. Ges. 1886.)
Hydroporus nivalis var. *Scholzei* Kolbe. Riesengeb. Die Decken zeigen zwischen Schildchen und Schulter einen hellgelben Fleck. (Scholz, Robert, eifriger Sammelkollege des Rektors Kolbe.)
5. *Agabus clypealis* Thoms. Im verlorenen Wasser bei Panten in 3 Ex. (Kolbe) 4. 10. Dafür zu streichen als Schlesier: *Agabus congener* v. *lapponicus*.
Hydaticus transversalis v. *interruptemaculatus* Gabr. Neisse 1 Ex. Die Basalbinde der Decken ist in Flecken aufgelöst, ähnlich der Var. *interruptus* von *Agabus abbreviatus*. (Gabriel.)
6. *Helochares dilutus* Er., *melanophthalmus* Muls. Zwischen Conferven in Lehmtümpeln, seltener in Sandgruben-Tümpeln. Bisher nur in der Ebene von Liegnitz um Ziegeleien von Gerh. gefunden. (Jauerstrasse, Gerichtsstrasse, Lindensch.) Selten. (s. D. E. Z. 1878 und 1887.)
7. *Helophorus elongatus* Kuw. Von der Ebene bis aufs Hochgebirge hfg. Im Verz. d. Käf. Schlesiens II. Aufl. p. 60 sub 9 mit *granularis* L. vermengt, grösser, Halsschild

*) Durch den Namen sei ein eifriger Fachgenosse geehrt, der bis in sein letztes Lebensjahr die Schmiedeberger Umgegend und das Riesengebirge untersuchte, seinerzeit auch ein Verzeichniß der dortigen *Cryptocephalen* veröffentlichte — Herr Kreisgerichtsrath Klette, der erste Entdecker von *Pachyta* Lamed in Schlesien.

- breiter, immer mit gelbem Seitenrand und meist mit grünem Erzglanz. Intervalle der Decken gewölbt.
8. *Callicerus rigidicornis* Er. In der Ebene und im Vorgebirge, ss., unter feuchtem Laube und Moos. Lähn, Bruch bei Liegnitz, Kaltwasser Wasserwald Kr. Lüben. (Gerh.) 7. (s. D. E. Z. 1888.)
 9. *Dilacra fallax* Kr. Bisher nur in der Ebene von Liegnitz: Weissenrode (Erlicht), Arnsdorf (Angeschwemmtes), Werder bei Seifersdorf (feuchtes Laub); Kaltwasser Wasserwald (feuchtes Moos). Selten häufig. 4. 5.
 10. *Homalota (Atheta) dilaticornis* Kr. Bisher nur in der Ebene. Vorderhaide, aus Pilzen gesiebt. ss. 10. (s. D. E. Z. 1890.)
 11. *Homalota (Dimetrota) villosula* Kr., *nigripes* Th. Spindelmühl im Riesengeb. in Pilzen. ss.
 12. *Homalota (Microdota) hodierna* Sharp. In der Ebene und im Vorgebirge s. Jakobsdorfer See bei Liegnitz im Angeschwemmten, unter Laub bei Brechelshof Kr. Jauer und im Waldenburger Geb. (Gerh.)
 13. *H. orbata* Er. ist sp. pr. nach Seidlitz und Ganglbaur. Ich besitze 1 Stück davon aus Spindelmühl.
 14. *Homalota clientula* Rey, *pulchra* Kr. In 1 Stck. von Gb. bei Neisse gefunden. Lähn, Vorderhaide (G.) ss.
 15. *Alaobia Heydeni* Epp. Diese von v. Heyden und Ritter in der hohen Capelle in Kroatien gesammelte interessante Art fand Herr Generalmajor Gabriel—Neisse im Wölfelsgrunde in 5 Ex. unter Ahornrinde. 9. Neu für Deutschland.
 16. *Oxypoda parvipennis* Fauv., *brachyptera* Kr. Von Dr. Skalitzky bei Spindelmühl im Riesengebirge. (D. E. Z. 1897, 197.)
 17. *Conurus lividus* Er. halte ich mit Seidlitz für sp. pr. Ich fand sie bei Lähn am Westabhange des Pfarrbusches unter Eichenlaub und bei der Oberförsterei Panten. ss. 7.
 18. *Mycetoporus longicornis* Maekl. ist sp. pr. und scheint im Vorgebirge vorzuherrschen, ist aber jedenfalls seltener als *splendidus* Gr. Ich fand sie bei Liegnitz (Boberau), Wasserwald bei Kuchelberg, Moisdorf Kr. Jauer, Lähn u. a. O.

19. *Mycetoporus Brucki* Pand. Bisher nur in 2 Ex. bei Vorderhaide aus Moos gesiebt. Dem *rufescens* Steph. nahe stehend und mit ihm vorkommend. (Gerh.)
20. *Mycetoporus forticornis* Fauv., *pronus* var. a. Kr. In der Ebene und dem Vorgebirge. Liegnitz: im Angeschwemnten der Katzbach, Oberförsterei Panten. (D. E. Z. 1888.) Fürstenstein (Jahresber. d. schles. Ges. 1887).
21. *Quedius fumatus* Fauv., *praecox* Heer., *peltatus* Er. Durch das Vorgebirge verbreitet. Goldberg, Lähn (hier z. hfg. unter feuchtem Laube), Spindelmühl. (D. E. Z. 1887. Jahresber. d. schles. Ges. 1886.)
Quedius paradisianus var. *flavopilus* Kolbe. Vor- und Hochgebirge, einzeln. Flügeldecken und Abdomen mit goldgelber Behaarung.
22. *Staphylinus (Ocypus) compressus* Marsh., *fulvipes* Motsch., *mutatus* Herold. Brechelshof 8 und Lähn 7, ss. unter Laub. (D. E. Z. 1887. Jahresber. d. schles. Ges. 1886.)
Philonthus micans var. *brunneipennis* m. Nach einem erhärteten Stück mit braunen Decken benannt. Spindelmühl (Gerh.).
23. *Stenus languidus* Er. Diese Art fand Herr Rektor Kolbe—Liegnitz 1889 in 1 Ex. im Riesengebirge.
Bledius opacus v. *sinuato-collis* Gabriel. Seitenrand des Halsschildes vor den Hinterwinkeln deutlich ausgebuchtet und dadurch dem mir unbekanntem *denticollis* Fauv. sehr ähnlich. Es kommen auch Ex. vor, bei denen nur eine Halsschildseite ausgebuchtet ist. Neisse (Gabr.).
24. *Homalium nigrum* Gr., *rufipes* var. In der Ebene und im Vorgebirge n. s. Liegnitz, Brechelshof, Lähn, Kaltwasser etc. Von Seidlitz und Ganglbauer mit Recht als sp. pr. betrachtet.
25. *Homalium amabile* Heer., *Hampei* Rdtb. Bei Spindelmühl im Riesengebirge aus Pilzen gesiebt (Dr. Skalitzky) s. Auch von Klette—Schmiedeberg im Riesengebirge gefunden. (Gabriel.)
26. *Cephennium Reitteri* Bris. In der Rottenberg'schen Sammlung befindet sich 1 Ex., bezeichnet mit dem Fundorte »Glatz.« (Jahresber. d. schles. Ges. 1887.)

27. *Neuraphes Antoniae* Reitt. In den Ausläufern der Beskiden bei Paskau an der Ostrawitza. (D. E. Z. 1887, 271. Jahresber. d. schles. Ges. 1887.)
28. *Eumicrus Perrisii* Rtrr. Unter Eichenlaub, an Dämmen etc. s. Breslau (Oswitz 6), Marienau (Dr. Schneider). (Jahresber. d. sches. Ges. 1887.)
29. *Cryptophagus bimaculatus* Pz. Spindelmühl, von Dr. Skalitzky aus Pilzen gesiebt. ss.
30. *Corticaria interstitialis* Mannh. Bisher nur in 1 Ex. bei Brechelshof aus Laub gesiebt (Gerh.), sp. pr. nach Seidlitz.
Anthrenus scrophulariae var. *gravidus* Rüst. Neisse (Gabriel).
31. *Dirrhagus lepidus* Rosh. In den schlesischen Beskiden am Rezicza-Bache an alten Buchenscheiten (Steuerinspektor Pietsch—Ohlau). 7. s.
32. *Hypocoelus procerulus* Mannh. Mit dem Vorigen (Pietsch) s. 7.
33. *Rhagonycha limbata* Th. ist sp. pr. Wie *testacea* n. s., besonders auf Eichen. Liegnitz, Bleiberge, Waldenburger Geb. — Galt früher als Var. von *testacea*.
34. *Corynetes ruficornis* St. Nicht Var. von *coeruleus*, sondern sp. pr. (Seidlitz, Fn. trs.). Bei Liegnitz fehlt *coeruleus*.
35. *Ernobius Mulsanti* Ksw., *anabaptista* Gozis. Bisher nur 2 Stck. aus der niederschlesischen Ebene von mir gefunden (Gerh.). (D. E. Z. 1890.)
36. *Cis rugulosus* Mell. Galt als Var. zu *boleti*; doch eigene Art (s. Seidl. Fn. trs.). Bisher nur in 2 Ex. bei Liegnitz gefunden (G.), Hochwald bei Brieg (Gb.).
37. *Mordellistena inaequalis* Muls. Galt als Var. zu *parvula*. Nach Seidlitz mit Recht sp. pr. Bei Liegnitz ss. Kaltwasser (Gerh.).

Anaspis thoracica v. *Gerhardti* Schilsky. Oberseite einfarbig gelb, ähnlich der *A. flava*. Bei Liegnitz z. s.

Hydronomus alismatis v. *aureomicans* Kolbe. Schwarzwasserbruch bei Liegnitz. Beschuppung schön goldgrün (Klb.).

- Ceutorrhynchus pyrrhorhynchus* Mannh. var. *suturalis* Gm. Nath deutlich weiss beschuppt, wie bei *floralis* (Gerh.).
38. *Apion cruentatum* Walt. Von der Ebene bis aufs Hochgebirge, n. s., bei Liegnitz häufiger als *frumentarium* L. — Gilt im Catalog von 1883 noch als Var. v. *frumentarium*. — Fundorte von ihr sind bereits angeführt in unserer Vereinschrift Jahrg. 1896 und 1897.

Apion aethiops var. *obscurum* Gabr. Völlig schwarz. Neisse 2 Stck. (Gabriel).

39. *Dryocoetes coryli* Perris. 1 Stck. am Unruhgraben oberhalb Lähn von Gesträuch (Kolbe) 7.

Toxotus meridianus v. *chrysogaster* Schrank. Stephansdorf (Graf Matuschka).

Cortodera humeralis v. *suturalis* F. Stephansdorf (Müller), Vorderhaide (Gerh.).

40. *Donacia brevicornis* Ahr., *platysterna* Thoms. Glogau, 1 Stck. (Pietsch) 3.

41. *Cryptocephalus imperialis* Laich., *bistripectatus* Germ. In der Ebene und dem niederen Gebirge, auf Eichen, ss. Grafschaft Glatz (Zebe), Wasserwald bei Kaltwasser (Kossmann, Schwarz). 8.

42. Ueber *Chrysomela carpathica* Fuss als sp. pr. wird Herr Weise—Berlin Näheres berichten. Altvater (Gabriel).

Phytodecta 5-punctata v. *obscura* Grimm. Lähn (Burgberg). Gabr. 6.

Nachtrag.

43. *Limnebius sericans* Muls., *Fussi* Gerh., *nitidus* Bedel. Liegnitz: Schwarzwasserbruch und im Angeschwemmten der Katzbach. (Berl. E. Z. 1876) Gerh.

Der Numerus selbstständiger Arten schlesischer Käfer betrug nach Abzug der in der Provinz nicht sicher nachgewiesenen am 10. Februar 1899

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [NF 24](#)

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: [Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1898 14-19](#)