

Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1900 und Bemerkungen.

Von **J. Gerhardt**—Liegnitz.

Beiträge lieferten die Herren: Generalmajor Gabriel—Neisse (Gb.), Oberlehrer Gerhardt—Liegnitz (G.), Rektor Kolbe—Liegnitz (Klb.), Landgerichtsrath Kossmann—Liegnitz (Ks.), Steuerinspektor Pietsch—Ohlau (P.), Lehrer Robert Scholz—Liegnitz (Sch.), Lokomotivführer a. D. Sokolowsky—Liegnitz (S.). Von Auswärtigen Dr. Lokay—Prag (Dr. L.).

Ofters genannte Sammelorte sind: L. = Liegnitz, Kaltwasser Kr. Lüben, Buchwald i. Rsgb., Quanzendorf Kr. Nimptsch, Waldenburg a. Altv., Schweinsdorf b. Neustadt, Hochwald b. Brieg, Ellguth b. Steinau i. Oberschles., Ullersdorf Kr. Landeshut i. Rabengebirge.

Bembidium obtusum Serv. Quanzendorf (Gb.).

Pterostichus interstinctus St. Schweinsdorf (Gb.).

Zuweilen, doch s. s., bildet sich bei *Lagarus vernalis* ein mehr oder weniger deutlicher Scutellarstreifen aus. Ein solches Stück lag vor aus der Gegend von Ohlau (P.).

Ochthebius Czwalinae ist im Letzner'schen Verzeichniss in *narentinus* Rtrr. umzuschreiben. Das einzige von mir bei L. entdeckte schlesische Stück lag Herrn L. Ganglbauer vor, der es mit böhmischen und ungarischen Stücken von *narentinus* identisch fand.

Creniphilus bipustulatus Marsh. Quanzendorf (Gb.)

Cercyon obsoletus Gyll. Waldenburg (Gb.).

Cryptopleurum crenatum Pz. An einem Komposthaufen in Buchwald z. hfg. (G.) 6.

Megasternum boletophagum Marsh. Ellgut (Gb.).

Leptusa analis Gyll. Rabengebirge (Ks.), *L. fumida* Er. ibid. (Ks.), *L. ruficollis* Er. n. s. unter Buchenmoos, ibid. (Ks.).

Ischnoglossa corticina Er. Liegnitz, unter Rinde eines alten Ulmenstumpfes (G. 5), Waldenburg (Gb.).

Microglossa pulla Gyll. Buchwald (G.), *nidicola* Fairm. 1 Stck. bei rothen Ameisen L. (Sch.).

Aleochara lygaea Kr. An Krähenaa. Buchwald (G. 6).

Ilyobates nigricollis Payk. Schweinsdorf (Gb.).

Gnypeta velata Er. Neisse (Gb.).

Homalota complana Manh. Quanzendorf (Gb.), *laticeps* Th. Neisse (Gb.), *tibialis* Heer. Ullersdorf (Ks.), *luridipennis* Mnh. Buchwald (G. 6), *oblonga* Er. Ullersdorf (Ks.), *granigera* Ksw. Waldenburg (Gb.), *montivagans* Epp. 1 Stck. in meiner Sammlung aus dem Riesengeb. (G.), 1 Stck. in einem faulen Pilz bei Waldenburg (Gb.), *nitidicollis* Fairm. 1 Stck. von Gb. gefunden, *gagatina* Baudi Ullersdorf (Ks.), *livida* Rey. Buchwald (G.), *parvula* Mnh. an Vogelaas, Buchwald (G.), Ellgut und Wölfelsgrund (Gb.), *atomaria* Kr. wurde bei Quanzendorf unter alten Maisstoppeln gef. (Gb.), *angusticollis* Th. und *ravilla* Th. non Kr. an faulen Pilzen bei Quanzendorf (Gb.), *celata* Er. ibid., *amica* Steph. ibid. und Ullersdorf (Ks.), *mortuorum* Th. Quanzendorf (Gb.), *subtilis* Scriba Altvater (Gb.), *parva* Sahlb. Quanzendorf unter Maisstoppeln (Gb.).

Oxypoda longipes Rey. An ausgelegten Taubenknochen Neisse (Gb.), *O. humidula* Kr. Quanzendorf (Gb.), *atricapilla* Märkl. Waldenburger Geb. (G.), Panten b. L. (Ks.), *sericea* Heer. Quanzendorf (Gb.), *formosa* Kr. Waldenburg, an Pilzen (Gb.), *testacea* Er. Lähn a. Bober, Waldenburger Geb. und Spindelmühl (G.), Waldenburg unter Ahornrindenmoos (Gb.).

Oxypoda rufescens Kr. ist 1889 in Zugang gekommen, daher als Zugang von 1900 zu streichen. An den mir vorliegenden

Stücken ist die Punktirung des Kopfes stark und ziemlich dicht, nicht spärlich (s. Ganglb. Bd. II).

Ocyusa incrassata Rey. Ullersdorf (Ks.) 9.

Gyrophæna affinis Sahlb. *ibid.* (Ks.), *boleti* L. *ibid.* (Ks.).

Hypocyptus seminulus Er. Schweinsdorf (Gb.), Planken der Lübener Bahn b. L. (G.).

Tachinus scapularis Steph. Quanzendorf (Gb.).

Conurus immaculatus Steph. Buchwald (G.), Ullersdorf (Ks.), *lividus* Er. Neisse (Gb.). Ich halte diese Art nicht für Abart von *pedicularius* Grav., sondern mit Seidlitz für sp. pr., da die Decken stets länger sind als bei *pedicularius*.

Conurus pedicularius Gr. Schweinsdorf (Gb.).

Bolitobius exoletus Er. Ullersdorf (Ks.) 9.

Megacronus rufus Er. Schweinsdorf (Gb.).

Quedius vexans Epp. Neisse (Gb.), *cinctus* Payk. Quanzendorf (Gb.), *limbatus* Heer. Hochwald (Gb.), *scintillans* Gr. und *lucidulus* Er. Ullersdorf (Ks.).

Philonthus addendus Rossi an faulenden Blätterpilzen bei Neisse (Gb.), *sordidus* Gr. Quanzendorf (Gb.), *thermarum* Aub. an warmem Pferdedünger-Kompost L. n. s. (G. Ks.), *longicornis* Steph. unter Laub, Neisse (Gb.), *fumarius* Gr. Neisse (Gb.).

Othius myrmecophilus Ksw. Ullersdorf (Ks.).

Baptolinus affinis Payk. Riesengebirge (Gb.).

Leptacinus parumpunctatus Gyll. n. s. an Pferdedünger-Kompost. Buchwald, L. (G.), *linearis* Gr. unter *batychnus* und z. T. ebenso gefärbt, mit Vor. bei L. 8. 9. (G.).

Xantholinus distans Rey. Quanzendorf und Hochwald (Gb.).

Lathrobium ripicola Czwalina Neisse (Gb.), *pallidum* Nordm. Schweinsdorf (Gb.).

Scopaeus cognatus Rey. Waldenburg aus faulen Pilzen (Gb.), Quanzendorf an Birkensaft (Gb.).

Stilicus orbiculatus Er. Neisse (Gb.), Quanzendorf aus Maisstoppeln (Gb.).

Sunius immaculatus Steph. Neisse (Gb.).

Paederus brevipennis Lac. Quanzendorf (Gb.).

Stenus crassus Steph. Neisse (Gb.), *brunnipes* Steph.

Buchwald (G. 6.), *fornicatus* Steph. Neisse (Gb.), Kolbei Germ. Hochwald (Gb.), *coarctatus* Epp. Altvatergipfel (Gb.).

Oxytelus Fairmairei Pand. Waldenburg, unter Ahornmoos (Gb.), *clypeonitens* Pand. Ellgut (Gb.).

Trogophloeus fuliginosus Gr. an einem Komposthaufen in Buchwald n. s. (G. 6.), *pusillus* Gr. *ibid.*, z. hfg. (G.).

Syntomium aeneum Müll. Waldenburg (Gb.).

Ein Stück des häufigen *Omalium rivulare* Payk. mit ganz dunklen Fühlern ist wohl s. s. Gb. fand ein solches.

Omalium exiguum Gyll. Schweinsdorf (Gb.), *pusillum* Gr. Ullersdorf (Ksm.) und zwar die var. *punctipenne* Th., welche, wie es scheint, die Berge bevorzugt; *monilicorne* Gyl. Mittelberg bei Wölfelsgrund unter Ahornrinde (Gb.), *scabriusculum* Kr. Ullersdorf, unter einer Wildraufe (Ks. 9), *excavatum* Steph. und *concinnum* Marsh. Ullersdorf (Ksw. 9.).

Anthobium aucupariae Ksw. Quanzendorf (Gb.), Marshami Fauv. Waldenburg (Gb.) 5.

Protinus atomarius Er. Ullersdorf (Ks.).

Megarthrus nitidulus Kr. Schweinsdorf (Gb.), *affinis* Mill. Quanzendorf (Gb.).

Phloeobium clypeatum Müll. Quanzendorf (Gb.).

Bythinus validus Aub. Hochwald (Gb.).

Tychus niger Payk. Wiesenberg i. Rsgb. (Gb.).

Euplectus sanguineus Denny in Kompost und unter faulem Heu, Liegnitz (G.), *piceus* Mot. unter morschen feuchten Holzspänen bei Waldenburg (Gb.).

Trichonyx sulcicollis Reichb. Weissenroder Damm b. L. unter Rinde eines morschen Ulmenstumpfes bei Ameisen (G. 5.).

Cephennium laticolle Aub. ist im Verzeichniss zu streichen und dafür zu setzen *C. Reitteri* Bris., *laticolle* Rtrr. Neisse und Quanzendorf (Gb.).

Euconnus denticornis Müll. Hochwald (Gb.), *nanus* Schaum. Buchwald (G. 6.).

Für *Choleva angustata* F. unseres Verzeichnisses ist Ch.

Sturmi Bris., *angustata* Er. Rtrr. zu setzen. An einer Mauer, Neisse (Oberstabsarzt Dr. Marx).

Ptomaphagus fuscus Pz. Schweinsdorf, Quanzendorf (Gb.). — Zu *nigricans* gehört als synonym (nach Ganglbauer) auch der 1889 im Verz. als sp. pr. publizierte *flavicornis* Th. Er lässt sich sehr wohl als unausgefärbter *nigricans* auffassen. Dagegen bildet der im Verz. mit *nigricans* vereinigte *fuliginosus* Er. (nach Ganglb.) gute Art und ist als var. zu streichen. — *P. grandicollis* Er. Quanzendorf (Gb.), *anisotomoides* Spence. Quanzendorf, unter Moosstoppeln, Schweinsdorf (Gb.).

Im Verzeichniss ist umzuändern (nach Ganglb.) *Hydnobius punctatissimus* Steph. in *punctatissimus* Er., *punctatus* Gyll., *multipunctatus* Gyll. und zu *H. punctatus* St. ist als synonym hinzuzufügen *punctatissimus* Steph.

Cyrtusa minuta Ahrens ist bei L. s. s., ziemlich häufig dagegen *C. pauxilla* Schmidt.

Agathidium mandibulare St. Glatzer Geb. (Gb.), *varians* Beck. Neisse (Gb.).

Cybocephalus politus Gyll. Riesengeb. (Gb.).

Clambus minutus St. Riesengeb., Neisse, Quanzendorf (Gb.), Ullersdorf (Ks.). *C. punctulum* Gyl. sieht Ganglb. nur als Zwergform von *minutum* an, wäre dann zu streichen.

Millidium minutissimum Motsch. Buchwald, an einem Düngerhaufen (G. 6.) z. s.

Ptilium Spencei Allib. und *excavatum* Gillm., beide n. s. mit Vor. (G. 6.), *affine* Er. Riesgb. (Gb.).

Nephanes Titan Newm. N. s. mit Vor. und im Bruch bei faulendem Heu, auch bei Kompost bei L. (G. 6–9).

Trichopteryx Chevrolati Allib. Buchwald bei Kompost (G. 6) Liegnitz im Bruch, an beiden Orten s. s. (G. 9), *brevipennis* Er. Buchwald (G.), Neisse (Gb.), *lata* Matth. Ullersdorf und *fascicularis* Mtth. *ibid.* (Ks.), *atomaria* var. *Oertzeni* Flach. Wölfelsgrund (Gb.), *thoracia* Walzl. L. im Bruch unter faulendem Heu (9) und Buchwald an Kompost (6 G.).

Eine *Orthoperus*-Art bleibt mir fraglich, die ich in keiner

der Beschreibungen von Kraatz, Reitter und Ganglbauer erwähnt finde, eine grössere 0,7 bis 0,8 mm lange braune Art, mit seitlich, hinten und an der Basis quer genetzten, in der Mitte gleichmässig, aber sehr flach rundlich-maschigen Decken und undicht stehenden, einfachen, graden Strichpunkten, die scheinbaren Striche von 3—4facher Länge der Doppelstriche von O. Kluki und nur unterm Mikroskop deutlich als Haare erkennbar. Ganglbauer hält sie für atomus; mir freundlichst von ihm später gesendete Stücke bestätigten es. Vorläufig möge darauf aufmerksam gemacht sein, dass Schlesien fünf gut unterschiedene *Orthoperus*-Arten zählt.

Im Verzeichniss ist *O. punctum* Marsh. als synonym zu *atomus* Gyl. zu setzen.

Phalacrus substriatus Gyll. Altvatergeb. (Gb.).

Myrmecoxenus vaporariorum Guér. Töpferberg bei L. in Kompost (9. G.).

Talmatophilus sparganii Ahrens. Neisse (Dr. Marx).

Für *Cryptophagus baldensis* ist im Verzeichniss zu setzen *C. silesiacus* Ganglb. — *C. Schmidtii* Sturm. Neisse (Gb.), *subfumatus* Kr. Wiesenbaude (Gb.).

Coenoscelis ferruginea Sahlb. Riesengeb. (Gb.).

Atomaria diluta Er. Quanzendorf, unter Maisstengeln und Schweinsdorf (Gb.). — *A. alpina* Heer ist im Verzeichniss zu *elongatula* zu ziehen, *atrata* Reitt. als var. zu *prolixa* Er., ebenso *pulchra* Er.; *A. pulchella* Heer soll heissen *pulchella* Rtt., diese dagegen tritt als synonym zu *munda* Er. und *pulchella* Heer zu *nigripennis* Payk. (Nach Ganglb.) *A. munda* bei L. nur in 1 Stck. (G.), *bicolor* Er. L. (G.), *turgida* Er. Schweinsdorf (Gb.).

Lathridius lardarius Deg. Quanzendorf und Neisse (Gb.), *angusticollis* Hummel. Riesengeb. (Klette's Sammlung nach Gb.), Neisse (Gb.), *Bergrothi* Reitt. Kottwitz bei Breslau (Gb.).

Enicmus hirtus Gyl. Riesengeb. (Gb.). — In unserm Verzeichniss steht *E. anthracinus* als synonym bei *minutus*, dahin zieht ihn auch Ganglb., Seidlitz dagegen zu *brevicollis*,

von dessen ♂ Ganglb. sagt, dass es 2 kräftige Höckerchen in der Mitte des Hinterrandes vom letzten Segment habe. Darnach fehlt uns der *brevicollis*, also der Seidlitz'sche *anthracinus*. Und doch möchte ich die im Gebirge so häufige Form des *minutus*, die bisher als *anthracinus* galt, genauerer Beachtung werth halten, da Hinterbrust und erster Bauchring nie dicht punktirt sind, wie bei unserm *minutus* der Ebene. Aber ich habe trotz eines sehr reichlichen Materials auch noch keine Höckerchen sehen können, so dass es wohl *brevicollis* nicht sein kann.

Corticaria linearis Payk. Riesengeb. (Gb.). — Nach Ganglb. ist *C. denticulata* Gyl. mit *impressa* Ol. zu vereinigen. — *C. foveola* Beck. Wölfelsgrund (Gb.).

Nach gefälliger brieflicher Mittheilung des Herrn Dr. Rodt—Prag ist von ihm *Epuraea Fussi* nicht bei Spindelmühl (Zeitschr. f. E. in Breslau 1900, p. 5) gefunden worden, sondern irrthümlich aufgeführt.

Meligethes lumbaris St. Quanzendorf (Gb.), *bidens* Bris. Buchwald (G. 6.), *bidentatus* Bris. Quanzendorf (Gb.).

Rhizophagus perforatus Er. Buchwald (G. 6), *bipustulatus* F. nur mit heller Spitze der Decken: Schweinsdorf (Gb.). So selten.

Laemophloeus alternans Er. Buchwald (G.). Zweiter schles. Fundort.

Monotoma subquadrifoveolata Waterh. ist als eigene Art zu cassiren und tritt als Var. zu *picipes* Hbst. (nach (Ganglb.)). Kommt bei L. unter *picipes* zuweilen vor (G.).

Hadratoma marginata Payk. Hochwald, von einem alten Knüppelzaune geklopft (Gb.).

Anthrenus verbasci L. Neisse (Gb.).

Acritus nigricornis Hoffm. und seine Var. *affinis* m., also die Form mit einfachen und Strichpunkten auf den Decken kommen bei L. mit einander und in ziemlich gleicher Zahl vor, es könnte daraus mit Wahrscheinlichkeit geschlossen werden, dass es die beiden Geschlechter der Art sind, zumal andere Unterschiede nicht bemerkt werden. Ein 2tes Stück der Var. *sulcipennis* Fuss in Kompost bei L. (G. 9.).

- Cryptohypnus rivularius* Gyll. Wiesenberg im Rieseng.
in trockenem Moose zwischen Steinen mehrfach (Gb. 7).
- Corymbites pectinicornis* L. Hochwald (Gb.).
- Dasytes fuscus* Ill. Hochwald (Gb.).
- Bruchus* (*Ptinus*) *subpilosus* var. *nigrescens* Gerh.
Waldenburg, unter Ahornrinde (Gb.), *bicinctus* St. Waldenburg (Gb.), *subpilosus* St. Ullersdorf (Ks. 9).
- Nach dem Kataloge von 1891 sind *B. bidens* Ol. und *raptor* St. 2 gute Arten.
- Anobium emarginatum* Dft. Quanzendorf (Gb.).
- Hedobia imperialis* L. Hochwald (Gb.).
- Cis festivus* Pz. Hochwald (Gb.), *lineatocribratus* Mell.
- Ennearthron cornutum* Gyl. Hochwald (Gb.).
- Scaphidema metallicum* F. Hochwald (Gb.).
- Omius forticornis* Boh. Schweinsdorf (Gb.).
- Ein Erkennungszeichen für *Hypera palumbaria* im Vergleich mit *comata* und *oxalydis* ist auch die Grundskulptur des Halsschildes: bei *palumbaria* besteht dieselbe aus dicht gestellten rundlichen, etwas gewölbten Felderchen, einem Lederwerk ähnlich, bei *comata* aus queren Runzeln und bei *oxalydis* aus glatten Flächen. *H. comata* Boh. Waldenburger Gebirge bei Lomnitz (Ks.).
- Liosoma cribrum* Gyll. Waldenburg, unter Ahornrinde (Gb.), Riesengeb. (Klette'sche Sammlung nach Gb.).
- Trachodes hispidus* L. Ohlau (S.) n. s. an abgefallenen Eichenästen, Schweinsdorf (Gb.).
- Dorytomus occalescens* Gyll. Buchwald (G.).
- Bagous tempestivus* Hbst. Quanzendorf (Gb.).
- Acalles lemur* Germ. Neisse und Quanzendorf (Gb.).
- Balaninus venosus* Grav. Schweinsdorf (Gb.).
- Anthonomus humeralis* Pz. Im v. J. hfg. auf Haseln, d. J. fast noch verbreiteter auf *Prunus padus*. Buchwald (um die Niederteiche) 6. (G.).
- Miarus graminis* Gyll. Das erste Stück für die L. Gegend an einem abgeschälten Weidenstamme (8) und Buchwald (G. 6).
- Orchestes subfasciatus* Gyll. Schweinsdorf und *erythropus* Germ. *ibid.* (Gb.).

Ceuthorrhynchus viduatus Gyll. Schweinsdorf (Gb.)
litura F. Neisse (Gb.), rugulosus Hbst. Quanzendorf
und Neisse (Gb.).

Apion assimile Kirb. Schweinsdorf (Gb.), filirostre Kirb.
ibid.

Rhynchites interpunctatus Steph. Schweinsdorf und
Brieg (Gb.), pauxillus Germ. Neisse und Quanzendorf,
(Gb.).

Xyleborus dryographus Ratzeb. Panten (Ks.).

Grammoptera ruficornis F. Schweinsdorf (Gb.).

Rhopalopus macropus Germ. Quanzendorf (Gb.)

Stenostola ferrea Schrank. Schweinsdorf, von einer Linde.
Schweinsdorf (Gb.).

Pachnephorus pilosus Rossi. Neisse (Gb.).



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [NF_26](#)

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: [Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1900 und Bemerkungen 6-14](#)