© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1900 und Bemerkungen.

Von **J. Gerhardt**—Liegnitz.

Beiträge lieferten die Herren: Generalmajor Gabriel—Neisse (Gb.), Oberlehrer Gerhardt—Liegnitz (G.), Rektor Kolbe—Liegnitz (Klb.), Landgerichtsrath Kossmann—Liegnitz (Ks.), Steuerinspektor Pietsch—Ohlau (P.), Lehrer Robert Scholz—Liegnitz (Sch.), Lokomotivführer a. D. Sokolowsky—Liegnitz (S.). Von Auswärtigen Dr. Lokay—Prag (Dr. L.).

Oefters genannte Sammelorte sind: L. = Liegnitz, Kaltwasser Kr. Lüben, Buchwald i. Rsgb., Quanzendorf Kr. Nimptsch, Waldenburg a. Altv., Schweinsdorf b. Neustadt, Hochwald b. Brieg, Ellguth b. Steinau i. Oberschles., Ullersdorf Kr. Landeshut i. Rabengebirge.

Bembidium obtusum Serv. Quanzendorf (Gb.).

Pterostichus interstinctus St. Schweinsdorf (Gb.).

Zuweilen, doch s. s., bildet sich bei Lagarus vernalis ein mehr oder weniger deutlicher Scutellarstreifen aus. Ein solches Stück lag vor aus der Gegend von Ohlau (P.).

Ochthebius Czwalinae ist im Letzner'schen Verzeichniss in narentinus Rttr. umzuschreiben. Das einzige von mir bei L. entdeckte schlesische Stück lag Herrn L. Ganglbauer vor, der es mit böhmischen und ungarischen Stücken von narentinus identisch fand.

Creniphilus bipustulatus Marsh. Quanzendorf (Gb.)

Cercyon obsoletus Gyll. Waldenburg (Gb.).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cryptopleurum crenatum Pz. An einem Komposthaufen in Buchwald z. hfg. (G.) 6.

Megasternum boletophagum Marsh. Ellgut (Gb.).

Leptusa analis Gyll. Rabengebirge (Ks.), L. fumida Er. ibid. (Ks.), L. ruficollis Er. n. s. unter Buchenmoos, ibid. (Ks.).

Ischnoglossa corticina Er. Liegnitz, unter Rinde eines alten Ulmenstumpfes (G. 5), Waldenburg (Gb.).

Microglossa pulla Gyll. Buchwald (G.), nidicola Fairm. 1 Stck. bei rothen Ameisen L. (Sch.).

Aleochara lygaea Kr. An Krähenaas. Buchwald (G. 6).

Ilyobates nigricollis Payk. Schweinsdorf (Gb.).

Gnypeta velata Er. Neisse (Gb.).

Homalota complana Manh. Quanzendorf (Gb.), laticeps Th. Neisse (Gb.), tibialis Heer. Ullersdorf (Ks.), luridipennis Mnh. Buchwald (G. 6), oblonga Er. Ullersdorf (Ks.), granigera Ksw. Waldenburg (Gb.), montivagans Epp. 1 Stck. in meiner Sammlung aus dem Riesengeb. (G.), 1 Stck. in einem faulen Pilz bei Waldenburg (Gb.), nitidicollis Fairm. 1 Stck. von Gb. gefunden, gagatina Baudi Ullersdorf (Ks.), livida Rey. Buchwald (G.), parvula Mnh. an Vogelaas, Buchwald (G.), Ellgut und Wölfelsgrund (Gb.), atomaria Kr. wurde bei Quanzendorf unter alten Maisstoppeln gef. (Gb.), angusticollis Th. und ravilla Th. non Kr. an faulen Pilzen bei Quanzendorf (Gb.), celata Er. ibid., amicula Steph. ibid. und Ullersdorf (Ks.), mortuorum Th. Quanzendorf (Gb.), subtilis Scriba Altvater (Gb.), parva Sahlb. Quanzendorf unter Maisstoppeln (Gb.).

Oxypoda longipes Rey. An ausgelegten Taubenknochen Neisse (Gb.), O. humidula Kr. Quanzendorf (Gb.), atricapilla Märkl. Waldenburger Geb. (G.), Panten b. L. (Ks.), sericea Heer. Quanzendorf (Gb.), formosa Kr. Waldenburg, an Pilzen (Gb.), testacea Er. Lähn a. Bober, Waldenburger Geb. und Spindelmühl (G.), Waldenburg unter Ahornrindenmoos (Gb.).

Oxypoda rufescens Kr. ist 1889 in Zugang gekommen, daher als Zugang von 1900 zu streichen. An den mir vorliegenden

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Stücken ist die Punktirung des Kopfes stark und ziemlich dicht, nicht spärlich (s. Ganglb. Bd. II).

Ocyusa incrassata Rey. Ullersdorf (Ks.) 9.

Gyrophaena affinis Sahlb. ibid. (Ks.), boleti L. ibid. (Ks.).

Hypocyptus seminulus Er. Schweinsdorf (Gb.), Planken der Lübener Bahn b. L. (G.).

Tachinus scapularis Steph. Quanzendorf (Gb.).

Conurus immaculatus Steph. Buchwald (G.), Ullersdorf (Ks.), lividus Er. Neisse (Gb.). Ich halte diese Art nicht für Abart von pedicularius Grav., sondern mit Seidlitz für sp. pr., da die Decken stets länger sind als bei pedicularius.

Conurus pedicularius Gr. Schweinsdorf (Gb.).

Bolitobius exoletus Er. Ullersdorf (Ks.) 9.

Megacronus rufus Er. Schweinsdorf (Gb.).

Quedius vexans Epp. Neisse (Gb.), cinctus Payk. Quanzendorf (Gb.), limbatus Heer. Hochwald (Gb.), scintillans Gr. und lucidulus Er. Ullersdorf (Ks.).

Philonthus addendus Rossi an faulenden Blätterpilzen bei Neisse (Gb.), sordidus Gr. Quanzendorf (Gb.), thermarum Aub. an warmem Pferdedünger-Kompost L. n. s. (G. Ks.), longicornis Steph. unter Laub, Neisse (Gb.), fumarius Gr. Neisse (Gb.).

Othius myrmecophilus Ksw. Ullersdorf (Ks.).

Baptolinus affinis Payk. Riesengebirge (Gb.).

Leptacinus parumpunctatus Gyll. n. s. an Pferdedünger-Kompost. Buchwald, L. (G.), linearis Gr. unter batychrus und z. T. ebenso gefärbt, mit Vor. bei L. 8. 9. (G.).

Xantholinus distans Rey. Quanzendorf und Hochwald (Gb.).

Lathrobium ripicola Czwalina Neisse (Gb.), pallidum Nordm. Schweinsdorf (Gb.).

Scopaeus cognatus Rey. Waldenburg aus faulen Pilzen (Gb.), Quanzendorf an Birkensaft (Gb.).

Stilicus orbiculatus Er. Neisse (Gb.), Quanzendorf aus Maisstoppeln (Gb.).

Sunius immaculatus Steph. Neisse (Gb.).

Paederus brevipennis Lac. Quanzendorf (Gb.).

Stenus crassus Steph. Neisse (Gb.), brunnipes Steph.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Buchwald (G. 6.), fornicatus Steph. Neisse (Gb.), Kolbei Germ. Hochwald (Gb.), coarctatus Epp. Altvatergipfel (Gb.).

Oxytelus Fairmairei Pand. Waldenburg, unter Ahornmoos (Gb.), clypeonitens Pand. Ellgut (Gb.).

Trogophloeus fuliginosus Gr. an einem Komposthaufen in Buchwald n. s. (G. 6.), pusillus Gr. ibid., z. hfg. (G.).

Syntomium aeneum Müll. Waldenburg (Gb.).

Ein Stück des häufigen Omalium rivulare Payk. mit ganz dunklen Fühlern ist wohl s. s. Gb. fand ein solches.

Omalium exiguum Gyll. Schweinsdorf (Gb.), pusillum Gr. Ullersdorf (Ksm.) und zwar die var. punctipenne Th., welche, wie es scheint, die Berge bevorzugt; monilicorne Gyl. Mittelberg bei Wölfelsgrund unter Ahornrinde (Gb.), scabriusculum Kr. Ullersdorf, unter einer Wildraufe (Ks. 9), excavatum Steph. und concinnum Marsh. Ullersdorf (Ksw. 9.).

Anthobium aucupariae Ksw. Quanzendorf (Gb.), Marshami Fauv. Waldenburg (Gb.) 5.

Protinus atomarius Er. Ullersdorf (Ks.).

Megarthrus nitidulus Kr. Schweinsdorf (Gb.), affinis Mill. Quanzendorf (Gb.).

Phloeobium clypeatum Müll. Quanzendorf (Gb.).

Bythinus validus Aub. Hochwald (Gb.).

Tychus niger Payk. Wiesenberg i. Rsgb. (Gb.).

Euplectus sanguineus Denny in Kompost und unter faulem Heu, Liegnitz (G.), piceus Mot. unter morschen feuchten Holzspänen bei Waldenburg (Gb.).

Trichonyx sulcicollis Reichb. Weissenroder Damm b. L. unter Rinde eines morschen Ulmenstumpfes bei Ameisen (G. 5.).

Cephennium laticolle Aub. ist im Verzeichniss zu streichen und dafür zu setzen C. Reitteri Bris., laticolle Rttr. Neisse und Quanzendorf (Gb.).

Euconnus denticornis Müll. Hochwald (Gb.), nanus Schaum. Buchwald (G. 6.).

Für Choleva angustata F. unseres Verzeichnisses ist Ch.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Sturmi Bris., angustata Er. Rttr. zu setzen. An einer Mauer, Neisse (Oberstabsarzt Dr. Marx).

Ptomaphagus fuscus Pz. Schweinsdorf, Quanzendorf (Gb.). — Zu nigricans gehört als synonym (nach Ganglbauer) auch der 1889 im Verz. als sp. pr. publizirte flavicornis Th. Er lässt sich sehr wohl als unausgefärbter nigricans auffassen. Dagegen bildet der im Verz. mit nigricans vereinigte fuliginosus Er. (nach Ganglb.) gute Art und ist als var. zu streichen. — P. grandicollis Er. Quanzendorf (Gb.), anisotomoides Spence. Quanzendorf, unter Moosstoppeln, Schweinsdorf (Gb.).

Im Verzeichniss ist umzuändern (nach Ganglb.) Hydnobius punctatissimus Steph. in punctatissimus Er., punctatus Gyll., multipunctatus Gyll. und zu H. punctatus St. ist als synonym hinzuzufügen punctatissimus Steph.

Cyrtusa minuta Ahrens ist bei L. s. s., ziemlich häufig dagegen C. pauxilla Schmidt.

Agathidium mandibulare St. Glatzer Geb. (Gb.), varians Beck. Neisse (Gb.).

Cybocephalus politus Gyll. Riesengeb. (Gb.).

Clambus minutus St. Riesengeb., Neisse, Quanzendorf (Gb.), Ullersdorf (Ks.). C. punctulum Gyl. sieht Ganglb. nur als Zwergform von minutum an, wäre dann zu streichen.

Millidium minutissimum Motsch. Buchwald, an einem Düngerhaufen (G. 6.) z. s.

Ptilium Spencei Allib. und excavatum Gillm., beide n. s. mit Vor. (G. 6.), affine Er. Riesgb. (Gb.).

Nephanes Titan Newm. N. s. mit Vor. und im Bruch bei faulendem Heu, auch bei Kompost bei L. (G. 6– 9).

Trichopteryx Chevrolati Allib. Buchwald bei Kompost (G. 6) Liegnitz im Bruch, an beiden Orten s. s. (G. 9), brevipennis Er. Buchwald (G.), Neisse (Gb.), lata Matth. Ullersdorf und fascicularis Mtth. ibid. (Ks.), atomaria var. Oertzeni Flach. Wölfelsgrund (Gb.), thoracia Waltl. L. im Bruch unter faulendem Heu (9) und Buchwald an Kompost (6 G.).

Eine Orthoperus-Art bleibt mir fraglich, die ich in keiner

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

der Beschreibungen von Kraatz, Reitter und Ganglbauer erwähnt finde, eine grössere 0,7 bis 0,8 mm lange braune Art, mit seitlich, hinten und an der Basis quer genetzten, in der Mitte gleichmässig, aber sehr flach rundlich-maschigen Decken und undicht stehenden, einfachen, graden Strichpunkten, die scheinbaren Striche von 3—4facher Länge der Doppelstriche von O. Kluki und nur unterm Mikroskop deutlich als Haare erkennbar. Ganglbauer hält sie für atomus; mir freundlichst von ihm später gesendete Stücke bestätigten es. Vorläufig möge darauf aufmerksam gemacht sein, dass Schlesien fünf gut unterschiedene Orthoperus-Arten zählt.

Im Verzeichniss ist O. punctum Marsh. als synonym zu atomus Gyl. zu setzen.

Phalacrus substriatus Gyll. Altvatergeb. (Gb.).

Myrmecoxenus vaporariorum Guér. Töpferberg bei L. in Kompost (9. G.).

Talmatophilus sparganii Ahrens. Neisse (Dr. Marx).

Für Cryptophagus baldensis ist im Verzeichniss zu setzen C. silesiacus Ganglb. — C. Schmidti Sturm. Neisse (Gb.), subfumatus Kr. Wiesenbaude (Gb.).

Coenoscelis ferruginea Sahlb. Riesengeb. (Gb.).

Atomaria diluta Er. Quanzendorf, unter Maisstengeln und Schweinsdorf (Gb.). — A. alpina Heer ist im Verzeichniss zu elongatula zu ziehen, atrata Reitt. als var. zu prolixa Er., ebenso pulchra Er.; A. pulchella Heer soll heissen pulchella Rttr., diese dagegen tritt als synonym zu munda Er. und pulchella Heer zu nigripennis Payk. (Nach Ganglb.) A. munda bei L. nur in 1 Stck. (G.), bicolor Er. L. (G.), turgida Er. Schweinsdorf (Gb.).

Lathridius lardarius Deg. Quanzendorf und Neisse (Gb.), angusticollis Hummel. Riesengeb. (Klette's Sammlung nach Gb.), Neisse (Gb.), Bergrothi Reitt. Kottwitz bei Breslau (Gb.).

Enicmus hirtus Gyl. Riesengeb. (Gb.). — In unserm Verzeichniss steht E. anthracinus als synonym bei minutus, dahin zieht ihn auch Ganglb., Seidlitz dagegen zu brevicollis,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

von dessen ♂ Ganglb. sagt, dass es 2 kräftige Höckerchen in der Mitte des Hinterrandes vom letzten Segment habe. Darnach fehlt uns der brevicollis, also der Seidlitz'sche anthracinus. Und doch möchte ich die im Gebirge so häufige Form des minutus, die bisher als anthracinus galt, genauerer Beachtung werth halten, da Hinterbrust und erster Bauchring nie dicht punktirt sind, wie bei unserm minutus der Ebene. Aber ich habe trotz eines sehr reichlichen Materials auch noch keine Höckerchen sehen können, so dass es wohl brevicollis nicht sein kann.

Corticaria linearis Payk. Riesengeb. (Gb.). — Nach Ganglb. ist C. denticulata Gyl. mit impressa Ol. zu vereinigen. — C. foveola Beck. Wölfelsgrund (Gb.).

Nach gefälliger brieflicher Mittheilung des Herrn Dr. Rodt—Prag ist von ihm Epuraea Fussi nicht bei Spindelmühl (Zeitschr. f. E. in Breslau 1900, p. 5) gefunden worden, sondern irrthümlich aufgeführt.

Meligethes lumbaris St. Quanzendorf (Gb.), bidens Bris. Buchwald (G. 6.), bidentatus Bris. Quanzendorf (Gb.).

Rhizophagus perforatus Er. Buchwald (G. 6), bipustulatus F. nur mit heller Spitze der Decken: Schweinsdorf (Gb.). So selten.

Laemophloeus alternans Er. Buchwald (G.). Zweiter schles. Fundort.

Monotoma subquadrifoveolata Waterh. ist als eigene Art zu cassiren und tritt als Var. zu picipes Hbst. (nach (Ganglb.). Kommt bei L. unter picipes zuweilen vor (G.).

Hadratoma marginata Payk. Hochwald, von einem alten Knüppelzaune geklopft (Gb.).

Anthrenus verbasci L. Neisse (Gb.).

Acritus nigricornis Hoffm. und seine Var. affinis m., also die Form mit einfachen und Strichpunkten auf den Decken kommen bei L. mit einander und in ziemlich gleicher Zahl vor, es könnte daraus mit Wahrscheinlichkeit geschlossen werden, dass es die beiden Geschlechter der Art sind, zumal andere Unterschiede nicht bemerkt werden. Ein 2tes Stück der Var. sulcipennis Fuss in Kompost bei L. (G. 9.).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cryptohypnus rivularius Gyll. Wiesenberg im Rieseng. in trockenem Moose zwischen Steinen mehrfach (Gb. 7).

Corymbites pectinicornis L. Hochwald (Gb.).

Dasytes fusculus Ill. Hochwald (Gb.).

Bruchus (Ptinus) subpilosus var. nigrescens Gerh. Waldenburg, unter Ahornrinde (Gb.), bicinctus St. Waldenburg (Gb.), subpilosus St. Ullersdorf (Ks. 9).

Nach dem Kataloge von 1891 sind B. bidens Ol. und raptor St. 2 gute Arten.

Anobium emarginatum Dft. Quanzendorf (Gb.).

Hedobia imperialis L. Hochwald (Gb.).

Cis festivus Pz. Hochwald (Gb.), lineatocribratus Mell.

Ennearthron cornutum Gyl. Hochwald (Gb.).

Scaphidema metallicum F. Hochwald (Gb.).

Omias forticornis Boh. Schweinsdorf (Gb.).

Ein Erkennungszeichen für Hypera palumbaria im Vergleich mit comata und oxalydis ist auch die Grundskulptur des Halsschildes: bei palumbaria besteht dieselbe aus dicht gestellten rundlichen, etwas gewölbten Felderchen, einem Lederwerk ähnlich, bei comata aus queren Runzeln und bei oxalydis aus glatten Flächen. H. comata Boh. Waldenburger Gebirge bei Lomnitz (Ks.).

Liosoma cribrum Gyll. Waldenburg, unter Ahornrinde (Gb.), Riesengeb. (Klette'sche Sammlung nach Gb.).

Trachodes hispidus L. Ohlau (S.) n. s. an abgefallenen Eichenästen, Schweinsdorf (Gb.).

Dorytomus occalescens Gyll. Buchwald (G.).

Bagous tempestivus Hbst. Quanzendorf (Gb.).

Acalles lemur Germ. Neisse und Quanzendorf (Gb.).

Balaninus venosus Grav. Schweinsdorf (Gb.).

Anthonomus humeralis Pz. Im v. J. hfg. auf Haseln, d. J. fast noch verbreiteter auf Prunus padus. Buchwald (um die Niederteiche) 6. (G.).

Miarus graminis Gyll. Das erste Stück für die L. Gegend an einem abgeschälten Weidenstamme (8) und Buchwald (G. 6).

Orchestes subfasciatus Gyll. Schweinsdorf und erythropus Germ. ibid. (Gb.).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Ceuthorrhynchus viduatus Gyll. Schweinsdorf (Gb.) litura F. Neisse (Gb.), rugulosus Hbst. Quanzendorf und Neisse (Gb.).

Apion assimile Kirb. Schweinsdorf (Gb.), filirostre Kirb. ibid.

Rhynchites interpunctatus Steph. Schweinsdorf und Brieg (Gb.), pauxillus Germ. Neisse und Quanzendorf, (Gb.).

Xyleborus dryographus Ratzeb. Panten (Ks.).

Grammoptera ruficornis F. Schweinsdorf (Gb.).

Rhopalopus macropus Germ. Quanzendorf (Gb.)

Stenostola ferrea Schrank. Schweinsdorf, von einer Linde. Schweinsdorf (Gb.).

Pachnephorus pilosus Rossi. Neisse (Gb.).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zeitschrift für Entomologie Breslau

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: NF_26

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1900 und Bemerkungen 6-14