

Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1904.

Von **J. Gerhardt** — Liegnitz.

Finder: Gabriel, Generalmajor — Neisse (Gb.), Gerhardt (G.), Kolbe, Rektor — Liegnitz (K.), Sokolowsky, Rentner — Liegnitz (S.), Schubert, Dr. med. — Hirschberg (Sch.), Schreiber, Lehrer — Neusalz (Schr.), Scholz, Lehrer — Liegnitz (Sz.), v. Varendorff, Amtsrichter — Guhrau (V.), Zacher, Studiosus — Breslau (Z.).

Blethisa multipunctata L. Neusalz (Schr.).

Amara famelica Lim. Kr. Lüben: Krummlindener Forst, in einem Fangloch 1 Stck. (Sz.); *A. infima* Dft. Kl.-Reichen (Sz.).

Pterostichus interstinctus St. Kr. Nimptsch: Quanzendorf (Gb.); *P. negligens* St. Auf dem Zobten. Interessantes Vorkommen; außer vom Riesengebirge nur noch von der Tatra bekannt (Z.).

Pedius inaequalis Marsh. Kl.-Reichen (Sz.).

Europhilus scitulus Dej. Guhrau (V.).

Dromius marginellus F. Neusalz (Schr.).

Hydroporus dorsalis F. Neusalz (Schr.).

Dyticus punctulatus F. Neusalz (Schr.).

Cercyon crenatum Pz. Schweinsdorf, Kr. Neustadt (Gb.)

Euryusa sinuata Er. Neusalz (Schr.); *E. laticollis* Kr. Guhrau (V.).

Ischnoglossa corticina Er. Waldenburg am Altvater (Gb.)

Microglossa marginalis Gyl. Wölfelsgrund (Gb.).

- Atemeles emarginatus* Grav. Neusalz (Schr.).
Ocalea rivularis Mill. Wölfelufer (Gb.).
Aleuonota macella Er. Kottwitz, unter Waldlaub (Gb.).
Calodera riparia Er. ibid.
Gnypeta coerulea Sahlb. ibid.
Homalota valida Kr. Melzergrund (Gb.); *H. contristata* Kr. Neisse, wahrscheinlich 1903 angeschwemmt (Gb.); *H. oblita* Er. Quanzendorf, Neisse (Gb.); *H. cadaverina* Bris. Neisse (Gb.); *H. livida* Rey. Quanzendorf (Gb.); *H. mortuorum* Thoms. Neisse, in einem Pilze (Gb.); *H. validiuscula* Kr. Rabengeb. (G.).
Oxypoda funebris Kr. Riesengeb.: Heinrichsbaude (Gb.).
Conosoma immaculatus Steph. Kottwitz (Gb.).
Bolitobius trinitatus Er. Wölfelsgrund, unter faulem Heu (Gb.).
Mycetoporus lepidus Gr. Neusalz (Schr.); *M. niger* Fairm. Wölfelsgrund (Gb.).
Heterothops praevia Er. Quanzendorf, im Keller unter faulem Stroh (Gb.).
Staphylinus edentulus Block. Neusalz (Schr.).
Philonthus exiguus Nordm. Waldenburger Geb. (G.).
Stenus fornicatus Steph. Kottwitz (Gb.); *S. picipennis* Er. Neisse, aus Reisig am Teichufer (Gb.).
Homalium monilicorne Gyll. Beskiden (V.).
Euplectus brunneus Grimmer. Wölfelsgrund, aus einem trockenen Holzbündel (Gb.).
Scydmaenus pusillus Müll. Quanzendorf, unter faulem Stroh in einem Keller (Gb.).
Choleva intermedia Kr. Neisse (Gb.); *Ch. angustata* Er. Guhrau (V.).
Ptomaphagus alpinus Gyl. Beskiden (V.).
Colon serripes Sahlb. Guhrau (V.).
Liodes parvula Sahlb. Quanzendorf (Gb.).
Ptenidium laevigatum Gillm. dto. (Gb.).
Trichopteryx thoracia Waltl. dto. (Gb.).
Cryptophagus setulosus St. Wölfelsgrund, unter Heu in einem Wildschuppen (Gb.). *C. Milleri* Reitt. Quanzendorf, unter faulendem Stroh in einem Keller (Gb.). *C. labilis* Er.

Mit Vorigem (Gb.). *C. ruficornis* Steph. Hirschberg, in der Nähe eines Heubodens (Sch.). Ebendasselbst *C. scutellatus* Newm. (Sch.), Quanzendorf (Gb.). *C. dorsalis* Sahlb. Quanzendorf (Gb.).

Atomaria umbrina Gyl. Beskiden (V.). *A. pulchra* Er. Altvater, Hochwald b. Brieg, Glatzer Geb. (Gb.). *A. prolixa* Er. Glatzer Geb., Riesengeb., Altvater (Gb.). *A. procerula* Er. Wölfelsgrund, aus trockenen Holzbündeln, Glatzer und Riesengeb. (Gb.). *A. pumila* Rtt. Neisse, Schweinsdorf (Gb.). *A. nigripennis* Payk. In Gesellschaft mit *A. munda* unter faulendem Stroh in einem Keller zu Quanzendorf (Gb.). *A. tumulorum* Villa. Liegnitz, an den Planken der Lübener Bahn 4 (G.).

Corticaria umbilicata Beck. Quanzendorf, unter faulendem Stroh (Gb.). *C. linearis* Payk. Altvater, Wölfelsgrund (Gb.), Guhrau (V.).

Melanophthalma distinguenda Comolli Kottwitz, aus Eichenmoos (Gb.).

Epuraea longula Er. Beskiden (V.). *E. angustula* Er. Riesengeb. (Sch.). *E. abietina* J. Sahlb. Beskiden (V.), *Meligethes brunnicornis* St. Beskiden (V.).

Aulonium trisulcum Fourc. Guhrau, an einer Linde (V.). *Laemophloeus bimaculatus* Payk. Guhrau, unter Birkenrinde mehrfach (V.).

Carimus murinus F. Neusalz, im Oderwalde mehrfach (Schr.). *Syncalyptra paleata* Er. Wölfelsgrund (Gb.).

Hister ventralis Mars. Glatzer Geb. (Gb.).

Hetaerius ferrugineus Oliv. Neusalz (Schr.).

Saprinus immundus Gyl. Neusalz, in Kot (Schr.). *S. metallicus* Hbst. Neusalz, in Fanggräben (Schr.).

Buprestis haemorrhoidalis Hbst. und *flavoguttata* L. Neusalz (Schr.).

Anthaxia manca F. Neusalz, an Bretterzäunen (Schr.). *A. morio* F. Neusalz (Schr.).

Dromaeolus barnabita Villa. Neusalz, von einem Eichenast (Schr.).

Elater praeustus F. Neusalz (Schr.).

- Malthinus balteatus* Suffr. Guhrau (V.); *M. frontalis* Marsh. Quanzendorf (Gb.).
Malthodes mysticus Ksw. Guhrau (V.); *M. spathifer* Ksw. Riesengeb. (Gb.).
Bruchus (*Ptinus*) *dubius* St. Guhrau (V.).
Episernus striatellus Bris. Beskiden (V.).
Scaphidema metallicum F. Groß-Krichen Kr. Lüben, unter Erlenrinde (Schr.).
Tenebrio picipes Hbst. Neusalz (Schr.).
Melandrya caraboides L. Bobernig bei Neusalz (Schr.).
Euglenes nigrinus Germ. Neusalz (Schr.).
Mordella bisignata Rdtb. Primkenauer Park, an einer Eiche (Schr.).
Mordellistena lateralis Oliv. Groß-Krichen (Schr.).
Salpingus castaneus Panz. Neusalz (Schr.).
Barypithes mollicomus Ahr, Guhrau (V.).
Trachodes hispidus L. Kottwitz, aus Laub im Walde (Gb.).
Acalles lemur Germ. Neisse (Gb.).
Tychius flavicollis Steph. Liegnitz, an der Katzbach (Sz.).
Mecinus janthinus Germ. Neusalz (Schr.).
Eubrychius velatus Beik. Neusalz (Schr.).
Ceutorrhynchus inaeffectatus Gyll. Guhrau, zahlreich auf *Hesperis matronalis* (V.); *E. euphorbiae* Bris. Guhrau (V.); *C. scapularis* Gyll. Kottwitz (Gb.).
Brachytemnus porcatus Germ. Neusalz, an Eichenholz zahlreich (Schr.).
Rhynchites pubescens F. Neusalz (Schr.).
Tropideres sepicola F. dto.
Mylabris marginalis F. dto.
Glyptoderes binodulus Ratzeb. Guhrau (V.).
Pityographus micrographus L. Hermsdorf bei Goldberg, am Quirl einer kleinen Fichte zahlreich (S.).
Dryocoetes coryli Perris. Guhrau (V.).
Axinopalpus gracilis Kryn. Neusalz, von einer Eiche geklopft (Schr.) 7.
Tetropium fuscum F. Neusalz (Schr.).
Clytus tropicus Pz. Neusalz, im Oderwalde (Schr.).

Hoplosia fennica Payk. Neusalz, im Oderwalde, an dürren Lindenästen zahlreich, 5. 6. (Schr.).

Menesia bipunctata Loubk. Obernigk, von einer Eiche (Z.).

Phytoecia pustulata Schrnk. Carolath (Schr.).

Sermyla halensis L. Lissa, 1 ♂, 2 ♀ (Z.).

Aphthona pallida Bach. Neisse (Gb.).

Longitarsus curtus var. *monticola* Kutsch. Raben- gebirge (G.) 1. *L. atricillus* Gyll. Lähn (G.).

Bemerkungen

Nach Ganglbauer ist *Tachys sexstriatus* Dft. nebst dem synonymen *angustus* nicht zu *quadrisignatus* Dft. gehörig, demnach in unserem Verzeichnis zu streichen.

Hydraena emarginata Rey soll nach Ganglb. nur Var. von *gracilis* sein. (?)

Limnebius crinifer Rey hat die Priorität und ist dem *L. nitidus* unseres Verzeichnisses voranzustellen.

Der 1899 publizierte *Ernobius Mulsanti* Ksw. ist zu streichen.

An einem Ex. meiner *Dorcatoma serra* Panz. hatten sich alle Deckenhaare aufgerichtet, so daß sie den Eindruck einer andern Art machte.

Gymnetron spilotum Germ. hat die Priorität und muß dem *bipustulatum* Bedel vorangestellt werden.

Weise zweifelt als schlesisch an: *Psylliodes latifrons* Ws., *Aphthona nigriceps* Rdtb., *lacertosa* Rdtb.; *Longitarsus minusculus* Fourcr., *pectoralis* Foudr., *canescens* Foudr., *cervinus* Foudr., *nanus* Foudr., *brevicollis* Kutsch. und *monticola* Kutsch. Letztere Art ist als Var. zu *curtus* All. zu stellen und bleibt schlesisch.

Die Nomenclatur von *Sphaeroderma* muß nach Weise folgendermaßen geändert werden. Statt *testaceum* F. muß gesetzt werden *rubidum* Graells und statt *cardui* Gyll. = *testaceum* F.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [NF_30](#)

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: [Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1904 1-5](#)