

# Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefundenen Hymenopteren.

---

## II. Chalastogastra.

---

Von **R. Dittrich.**

---

Zu den im Vorworte meines Verzeichnisses der schlesischen Apiden aufgeführten Orten Schlesiens, aus denen mir Hymenopteren bekannt geworden, sind in der letzten Zeit Beuthen und Königshütte O.S. hinzugereten; von dort haben die Herren Gerichtskassen-Sekretär Wolf und Lehrer H. Scholz mir eine Anzahl Arten geschickt, wofür ich sehr dankbar bin, da mir bisher aus Oberschlesien nur sehr wenig Material zu Gebote stand. Die Litteratur über Blatt- und Holzwespen bot verschiedene wertvolle Angaben über in Schlesien vorkommende Arten, insbesondere aus älterer Zeit durch die Verbindung, in welcher der rühmlichst bekannte Lehrer Köhler (Schmiedeberg) mit Klug stand. Im Verzeichnisse zitiere ich folgende Werke:

Brischke & Zaddach: Beobachtungen über die Arten der Blatt- und Holzwespen. 1) Cimbicidae, Hylotomidae, Lydidae. 1862. 2) Gattung Nematus. Königsberg 1875.  
Hieronymus: Beiträge zur Kenntnis der europäischen Zoocecidien und der Verbreitung derselben. Breslau 1890.

Hopf: Bemerkungen über Raupenfraß auf dem in der Ständeherrschaft Muscau in der Oberlausitz gelegenen Forstrevier Mulkewitz v. J. 1818—1827. (Behlens Zeitschr. f. d. Forst- und Jagdwesen N. F. Bd. 2 H. 4. Bamberg u. Aschaffenburg.)

Klug: Gesammelte Aufsätze über Blattwespen. Herausgegeben von Dr. Josef Kriechbaumer. Friedländer & Sohn. Berlin 1884.

Konow: 1) Revision der Nematiden-Gatt. Pontania. Zeitschr. f. syst. Hym. u. Dipt. I.

2) Revision der Nematiden-Gatt. Pteronus. Zeitschr. f. syst. Hym. u. Dipt. III, IV.

3) Revision der Nematiden - Gatt. Pachynematus. Zeitschr. f. syst. Hym. u. Dipt. III, IV.

4) Catalogus Tenthredinidarum Europae. Deutsche ent. Zeitschr. 1890 H. 2.

5) Bemerkungen über Blattwespen. Deutsche ent. Zeitschr. XVIII. 1884.

Scholz: Schlesiens Blattwespen (Dolerus) Arb. Schles. Ges. f. vat. Kultur 1847.

Schwab: Über die Verheerungen der Kieferblattwespe (*Tenthredo pini et pratensis*) in der Umgebung von Schwarzwasser und Skotschau in Schlesien. Sitzgber. zool.-bot. Ver. Wien X p. 31/32.

Treviranus (u. Schilling): Über den Fraß von Lyda erythrocephala. Verhdl. des preuß. Gartenbauvereins Bd. V H. 2. Berlin p. 426 Taf. 3.

Verschiedene interessante schlesische Arten bot mir auch die entomologische Sammlung des hiesigen Kgl. zoologischen Universitätsmuseums und zwar wurden nur solche Arten in das Verzeichnis aufgenommen, die in der Sammlung als schlesisch, wenn auch immer ohne genauen Fundort, bezeichnet waren, besonders, wenn sie den Namen des Sammlers aufwiesen. Unter diesen sind namentlich zu erwähnen der frühere Konservator Rotermund, der praktische Arzt Scholz und der bekannte schles. Entomologe Schummel. Zu den im Verzeichnisse der Apiden gebrauchten Abkürzungen treten

hinzu: Z. M. (Zool. Museum der Universität Breslau); o. g. F. (ohne genauen Fundort); D. (R. Dittrich); Schn. (Dr. Wilh. Schneider); Schum. (Schummel); Wo. (Dr. M. F. Wocke); Wtz. (Partikulier Wutzdorf); Z. (stud. rer. nat. Zacher).

Für die Bestimmung der schwierigeren Gattungen habe ich an dieser Stelle dem verstorbenen Hauptlehrer Brischke in Langfuhr bei Danzig, in neuerer Zeit aber ausschließlich Herrn Pastor Konow in Teschendorf bei Stargard (Mecklenburg) den herzlichsten Dank auszusprechen; letzterer hatte auch die große Güte, das Manuskript dieses Verzeichnisses bezüglich der Nomenklatur zu verbessern.

Breslau, im September 1905.

**R. Dittrich.**

# Chalastogastra.

## I. Familie. **Lydidae** Knw.

### i. Subfamilie **Lydini** Knw.

#### **Megalodontes** Latr. (*Tarpa* F.).

- 1) *spissicornis* Klg. 6. sehr selten. Liegnitz (B.); (Br. u. Zadd. 1 p. 193).
- 2) *plagiocephalus* F. 6. Ransern (Bautze) 1 ♀ auf Dolden.

#### **Lyda** F.

- 1) *erythrocephala* L. 4. meist selten. Mirkau (D.), Oswitz (D.); (Z. M.: Rot.); trat 1828 im botanischen Garten zu Breslau als Schädling auf.
- 2) *flaviceps* Retz. Skarsine (Schum.: Schles. Ges. 1831); Liegnitz (B.).
- 3) *hieroglyphica* Christ. (Br. u. Zdd. 1. p. 125).
- 4) *stellata* Christ. Beuthen O/S. (Wolf); o. g. F. (Scholz), Schwarzwasser und Skotschau (Schwab); Mulkewitz O.-L. (Hcpf), Schädling der Kiefer.

#### **Cephaleia** Jur.

- 1) *abietis* L. 7. zeitweise häufig und schädlich. Tost und Neudeck O/S. (Wolf), Kraika (Tsch.), Breslau (D., Z.), Obernigk (D.), Striegau (D.), Moisdorf (D.), Ramsau (Nagel), Wölfelsgrund (D.), Langenau (W.), Wartha (D.), Charlottenbrunn (Langner), Heidelgebirge (D.), Salzgrund (Wo.), Querseiffen (D.).
- 2) *signata* F. Br. u. Zdd. 1 p. 136 o. g. F.
- 3) *alpina* Klg. Charlottenbrunn (Schum. u. Rot. Schles. Ges. 1831), Schmiedeberg (Köhler, Klug. p. 21).
- 4) *reticulata* L. 5, 6 sehr selten auf Kiefer. Namslau (D., W.), Schleiertal (Fein), Krummhübel (Ansorge).

#### **Neurotoma** Knw.

- 1) *nemoralis* L. 5 auf *Prunus spinosa* 1888 häufig. Weidedamm bei Schebitz (D.).
- 2) *flaviventris* Retz. 5, 6. Gräfenberg (Schippang), Liegnitz (B.), Nickrisch (Sommer); ♀ var. Pyri Schrnk. (= *clypeata* Klg.), Reimswaldau (Wutzdorf).

#### **Pamphilius** Latr.

- 1) *hortorum* Klg. 5. Bruschewitz (D.), Wartha (D.).

- 2) *depressus* Schrank. 5, 8 auf Erle. Bruschewitz (D.), Mettkau (D.), Nimkau (D.), Moisdorf (D.), Charlottenbrunn (D.).
- 3) *marginatus* Lep. 5. Königshütte O/S. (E. Scholz), Schottwitz 1 ♂ an *Populus tremula* (D.).
- 4) *betulae* L. 5, 6 auf Erle. Breslau (Rudel, W. Z.), Kraika (Tsch.), Reimswaldau (Wtz.), Moisdorf (D.).
- 5) *inanitus* Vill. 5. Schebitz (D.), Liegnitz (B.); o. g. F. (Schum.). (Schles. Ges. 1836).
- 6) *silvaticus* L. 4—6. Wildschütz (D.), Breslau (botanischer Garten auf *Cotoneaster*) (D., Sokol.), Charlottenbrunn (Langner).

## 2. Subfamilie **Cephini** Knw.

### **Macrocephus** Schlechtd.

- 1) *satyrus* Panz. 5. Leerbeutel (D.).
- 2) *xanthostomus* Ev. 6 auf Dolden. Ransern (D.).

### **Janus** Steph.

*cynosbati* L. 5. 6. auf Dolden. Oswitz (W.), Ransern (D.), Nimkau (D.).

### **Calameuta** Knw.

*filiformis* Eversm. 5. 6. Skarsine (D.), Bischwitz (D.), Ottwitz (D.), Breslau (D., W.), Schebitz (D.).

### **Astatus** Panz.

*niger* Harr. 7. Hohenwiese (D.) 1 ♀.

### **Cephus** Latr.

- 1) *nigrinus* C. G. Thom. s. 5. 6. nicht selten. Namslau (D.), Strachate (D.), Carlowitz (D.), Schebitz (D.), Lissa (D.), Neuhof (D.).
- 2) *pygmaeus* L. 5. 6. gemein und Schädling in der Ebene und im Gebirge.
- 3) *pallipes* Klg. 5. Wartha (D.), Schebitz (D.), Moisdorf (D.).
- 4) *haemorrhoidalis* F. 5. Pohlanowitz (D.), Leerbeutel (D.), Schebitz (D.).

## 3. Subfamilie **Xyelini** Knw.

### **Xyela** Dalm.

Julii Breb. o. g. F. (Zool. Mus.).

## II. Familie. **Siricidae** Knw.

### I. Subfamilie **Xiphydriini** Knw.

#### **Xiphydria** Latr.

- 1) *longicollis* Geoffr. (= *annulata* Jur.). 9, 10. selten an Holzklaftern. Morgenau (Schn.).

- 2) *prolongata* Geoffr. (= *dromedarius* F.). 6. 9. sehr selten  
Morgenau (Schn.).

## 2) Subfamilie **Siricini.**

### **Sirex** L.

- 1) *gigas* L. 7. 8. verbreitet und stellenweise häufig an Holzkläftern und in Wohnungen aus den Dielen auskommend. Königshütte (E. Scholz), Ziegenhals (Wo.), Breslau (Junge, Schn., Wtz.), Zobten (Sok.), Striegau (D.), Moisdorf (Sok.), Liegnitz (B.), Gräfenberg (Schippang), Wölfelsgrund (W.), Lomnitz (Schlegel), Seiffenau (D.), Schreiberhau (Kletke).
- 2) *augur* Klg. Breslau (Schn.), Hartlieb (Rot.), (Z. M.).
- 3) *phantoma* F. o. b. F. Schum. (Schles. Ges. 1834), Z. M. (meine Sammlung).

### **Paururus** Knw.

- 1) *noctilio* F. Königshütte O/S. (E. Scholz), Breslau, Lissa (Junge), Liegnitz (B.).
- 2) *juvencus* L. 7. stellenweise häufig. Königshütte (E. Scholz), Glatzer Schneeberg (W.), Frankenstein (Wo.), Kraika (Tsch.).

### **Tremex** Jur.

- 1) *magus* F. o. g. F. 1 ♀ (eigene Sammlung).
- 2) *fuscicornis* F. 9. Oswitz, Liegnitz (B.); o. g. F. (Rot., Zool. Mus.).

### **Xeris** A. Costa.

- spectrum* L. 7. 8. stellenweise häufig. Pleß, Kattowitz O/S. (E. Scholz), Breslau (Rudel, Schn.), Zobten (Sok.), Glatzer Schneeberg (W.), Wartha (D.), Charlottenbrunn (D.), Krummhübel (Ansorge).

## 3) Subfamilie **Oryssini** Knw.

### **Oryssus** Latr.

- abietinus* Scop. sehr selten. Holzplätze bei Breslau (Schles. Ges. 1835), ebenda Letzner, Rot. (Zool. Mus.).

## III. Familie. **Tenthredinidae** Knw.

### 1. Subfamilie **Cimbicini** Knw.

#### **Cimbex** Ol.

- 1) *lutea* L. 5. 7. nicht häufig Breslau (D., Junge), Striegau (D.), Militsch (Gärtner).
- 2) *femorata* L. 6—8 ziemlich häufig, gezogen mit Birkenlaub. Breslau, Obernick (Junge), Liegnitz (B.), Görlitz (Sommer), Gräfenberg (Schippang), Langenau (W.), Johannesbad (Kletke).
- 3) *fagi* Zdd. 5. 6. häufig. Heinrichau (Herrmann), Breslau, Obernick

(Rudel), Striegau (D.), Liegnitz (B.), Gräfenberg (Schippang), Eulengebirge (Hartmann), Lehmwasser (Schube).

- 4) **connata Schrk.** 5. 8. einzeln, auf Erle. Namslau (D.), Breslau (Diel, Junge), Koberwitz (Schneider), Salzgrund (Wo.), Fischbach (Goetschmann), Petersdorf (D.).

### **Trichiosoma Leach.**

- 1) **lucorum L.** 5—7. Puppe auf Prunus Padus. Beuthen O/S. (Wolf), Tarnowitz O/S. (E. Scholz), Breslau (D., Junge, Standfuß), Kunzendorf (Nagel), Petzer (D.).
- 2) **vitellinae L.** 5—7. Breslau (D., Thorwarth, W.), Nimkau (D.), kleiner Teich, Riesengeb. (Wo.).
- 3) **sorbi Htg.** 6. 7. Liegnitz (B.), Heidelgebirge (D.), Jannowitz (D.), Warmbrunn (D.).
- 4) **tibialis Steph.** 5. Carlowitz (D. gez.), Ransern (W.), Johannesbad (Czaya); o. g. F. (Rot.), Zool. Mus.

### **Clavellaria Leach.**

**amerinae L.** 5. 6. in manchen Jahren häufig auf Schwarzpappel. Oberschlesien (Cutler), Breslau (D., Schneider, Sok.), Stephansdorf (Sok.), Liegnitz (B.), Glatzer Schneeberg (Diel), Salzgrund (Wo.).

### **Abia Leach.**

- 1) **fasciata L.** 7. 8. sehr selten im Gebirge auf Dolden. Altvater (D.), Langenbielau (Rot.) (Schles. Ges. 1835 u. Zool. Mus.), Schilling (Schles. Ges. 1829/30).
- 2) **mutica Thms.** Wölfelsgrund (B.) 1 Stück.
- 3) **loniceræ L.** von Breslau als Cimbex aenea Klg. von Schummel angegeben (Schles. Ges. 1830), Glatzer Schneeberg (Rendschmidt u. Rot.), (Schles. Ges. 1835, Z. M.).
- 4) **candens Knw.** Beuthen (Wolf) 1 ♂.
- 5) **sericea L.** 5—8. einzeln auf Dolden und Erle. Öst.-Schlesien (Br. u. Zdd. 1 p. 273), Proskau (Sontag), Krittern (Bautze), Bruschewitz (D.), Schwoitsch (D.), Zedlitz (Sontag), Lissa (Wo.), Liegnitz (B.), Salzbrunn (D.), Hirschberger Tal an verschiedenen Orten (D.).
- 6) **fulgens Zadd.** 7. auf Erle 1885 häufig bei Seiffenau, die ♀♀ auf den Blättern sitzend, die zahlreicheren ♂♂ in lebhaftem Fluge die Büsche umschwärmend. (D.)
- 7) **nitens L.** 8. sehr selten auf Pastinaca. Obernigk (D.), o. g. F. (Standfuß).

### **Amasis Leach.**

- 1) **amoena Klg.** 6. selten. Leerbeutel (D.), Pöpelwitz (D.).
- 2) **obscura F.** 5. 6. zeitweise häufig. Kranst (Rudel), Breslau (D.), am

Schwarzwasser 1903 sehr häufig auf den Blüten von *Ranunculus* (Z.), Schebitz (D.), Wartha (D.), im Riesengeb. nach Schilling sehr selten (Schles. Ges. 1829/30).

## 2. Subfamilie **Argini** Knw.

### **Arge** Schrank = *Hylotoma* Latr.

- 1) *coeruleipennis* Retz. 5—8. einzeln auf Dolden. Morgenau (Schn.), Zobten (D.), Gl. Schneeberg (W.), Wartha (D.), Hermsdorf u. K. (D.).
- 2) *Berberidis* Klug. 4—8. ziemlich häufig auf Dolden. Oswitz (W.), Moisdorf (D.), Seiffenau (D.), Liegnitz (B.), Beskiden (Dietl), Landeck (D.), Wartha (D.), Heidelgebirge (D.), Salzbrunn (D.), Hirschberger Tal (D.), Schwarzbach (Z.).
- 3) *enodis* L. 5—8. häufig auf *Salix*, Dolden. Neuhof (D.), Mirkau (D.), Morgenau (D.), Moisdorf (D.), Seiffenau (D.), Gl. Schneeberg (W.), Landeck (D.), Wartha (D.), Heidelgebirge (D.), Hermsdorf u. K. (D.).
- 4) *coerulescens* Geoffr. (= *cyanella* Klug.). 7. selten. Liegnitz (B.), Wartha (D.), Charlottenbrunn (D.), Hermsdorf u. K. (D.), Schwarzbach (Z.).
- 5) *fuscipes* Fall. 5. auf *Euphorbia cyparissias*. Domatschine (D.), Moisdorf (D.), Wölfelsgrund (B.), o. g. F. (Klug p. 55); (Rot., Zool. Mus.).
- 6) *ciliaris* L. 5. 7. nicht häufig. Namslau (D.), Ramsau (Nagel), Hirschberger Tal (D.), o. g. F. (Klug p. 55, als *Hyl. coerulea* Klug.).
- 7) *ustulata* L. 5—7. sehr häufig auf Dolden in der Ebene wie im Gebirge vom Altvater bis zum Riesengebirge.
- 8) *atrata* Först. 5. selten. Wartha (D.).
- 9) *segmentaria* Pz. 7. Oswitz (Schn.).
- 10) *dimidiata* Fall. 7. Seiffenau (D.), Jannowitz (D.).
- 11) *fuscipennis* H. Sch. 5. Fürstenstein (D.).
- 12) *paganula* Pz. 5—7. häufig auf *Prunus spinosa*, Rosa. Proskau (Sontag), Breslau (D.), Schebitz (D.), Moisdorf (D.), Liegnitz (B.), Seiffenau (D., Wolf), Wölfelsgrund (D.), Wartha (D.), Salzbrunn (D.), Hirschberger Tal (D.).
- 13) *melanochroa* Gmel. 5—7. häufig auf Dolden, *Crataegus*. Laskowitz (Halisch), Rothsürben (D.), Breslau (D., W.), Mettkau (D.), Gl. Schneeberg (W.), Charlottenbrunn (Langner), Jannowitz (D.).
- 14) *cyaneocrocea* Först. 6. 7. nicht häufig auf Dolden. Ottwitz (D.), Breslau (D.), Schebitz (D.), Liegnitz (B.), Seiffenau (D.); Ramsau (Nagel), Jannowitz (D.).
- 15) *rosae* L. 4. 6—8. häufig auf Dolden. Mirkau (D.), Breslau (D., Z.), Zobten (D.), Neukirch (D.), Obernigk (D.), Moisdorf (D.), Seiffenau (D.), Wartha (D.), Hirschberger Tal (D.).

**Schizoceros Lep.**

- 1) *furcatus* Vill. 7. selten auf Dolden. Carlowitz (D.), o. g. F. (Schummel: Schles. Ges. 1832).
- 2) *geminatus* Gmel. Schmiedeberg (Köhler), (Klug p. 71).

**Aprosthomia Knw.**

*melanura* Klg. 5—7. selten auf Dolden. Proskau (Sonntag), Carlowitz (D.), Ransern (D.), Schebitz (D.), Wartha (D.), Fischbach (Goetschmann).

**3. Subfamilie Lophyrini Knw.****Monoctenus Dhlb.**

*juniperi* L. o. g. F. (Rot., Scholtz: Z. M.).

**Lophyrus Ltr.**

- 1) *nemorum* F. 5. Tarnowitz O/S. (E. Scholz), Obernigk (D.).
- 2) *laricis* Jur. 4. Oswitz (D.), o. g. F. (Scholtz: Z. M.).
- 3) *virens* Klg. 4—7. Tarnowitz O/S. (E. Scholz), Brieg (Wo.), Morgenau (Schn.), Obernigk (D.), Salzbrunn (D.), Heidelgebirge (D.), Niesky (Br.).
- 4) *pallidus* Klg. 5. Ornontowitz O/S. (E. Scholtz), Breslau (Wtz.), Obernigk (D.).
- 5) *hercyniae* Htg. 5. 7. Puppe auf Alnus und Pinus. Carlsruhe O/S., Breslau (Wo.), Obernigk (D.), Ketschdorf (D.), Jannowitz (D.).
- 6) *polytomus* Htg. 7. Beuthen O/S. (Wolf), Obernigk (Nagel), Lomnitz (Goetschm.), Ketschdorf (D.).
- 7) *frutetorum* F. (= *variegatus* Htg.). 5. 7. Breslau (Bautze, Rot. (Z. M.), Wtz.), Lissa (Wo.), Schneeberg (W.), Charlottenbrunn (Langner).
- 8) *pini* L. 4. 5. 7. häufig und zeitweise schädlich an *Pinus silvestris* und *pumilio*.\* Ornontowitz O/S. (E. Scholz), Brieg (Wo.), Mirbau (D.), Morgenau (Schn.), Obernigk (Goetschm.), Liegnitz (B.), Charlottenbrunn (Langner, Graf Matuschka), Riesenkamm (D., Ansorge).
- 9) *socius* Klg. o. g. F. (Z. M.).
- 10) *sertifer* Geoffr. (= *rufus* Retz.). Königshütte O/S. (E. Scholz), Breslau (Gerth, Rudel, Sontag).
- 11) *dorsatus* F. (= *pallipes* Fall.). 5. Wartha (D.).

**4. Subfamilie Tenthredinini Knw.****Cladius Ill.**

- 1) *crassicornis* Stephens. 8. Carlowitz, Leerbeutel (D.), Salzbrunn (D.).

---

\*) Im Jahre 1904 besonders in den Forstrevieren: Görlitz, Grudschütz, Kosel, Paruschowitz und Ratibor — Schles. Zeit. 5/7. 05 Bogen II.

- 2) *pectinicornis* Geoffr. 6. 8. Schwarzwasser, Carlowitz (D.), Schebitz (D.), Neuhof (D.), Seiffenau (D.), Wartha (D.), Ketschdorf (D.), Wernersdorf (D.).
- 3) *diformis* Pz. 5. 6. 8. auf Salix. Langenbrück (D.), Breslau (D.), Obernigk (D.), Hermsdorf u. K. (D.).

### **Trichiocampus Htg.**

- 1) *viminalis* Fall. 5. 6. 8. Proskau (Sontag), Breslau (D., Schn.), Obernigk (D.), Liegnitz (B.), Jannowitz (D.).
- 2) *ulmi* L. 5. Oswitz (D.), Liegnitz (B.), Neuhof (D.).
- 3) *eradiatus* Htg. 4. Morgenau (Schn.) 1 ♀.

### **Priphorus Dahlb.**

- 1) *padi* L. 4. 5. 8. Breslau (D., Schn., Wo.), Obernigk (D.), Moisdorf (D.), Goldberg (Wolf).
- 2) *tener* Zdd. 5. Schebitz (D.).
- 3) *tristis* Zadd. 6. 8. Breslau (D.), Obernigk (D.), Liegnitz (B.).

### **Leptocerus Thoms.**

- luridiventris* Fall. 5. Langenbrück (D.), Mettkau (D.).

### **Hemichroa Steph.**

- alni* L. 7. selten auf Espe. Obernigk (Z.), Jannowitz (D.), Schwarzbach (Z.).

### **Dineura Dlb.**

- 1) *nigricans* Christ. 5. Langenbrück (D.).
- 2) *stilata* Klg. 5. 7. Breslau (D.).
- 3) *testaceipes* Klg. 3. Auf Sorbus aucuparia. Gl. Schneeberg.

### **Cryptocampus Htg.**

- 1) *medullarius* Htg. 4. 5. Obernigk (D.). Die Gallen auf Salix pentandra L. im Hirschberger Tale, bei Freistadt und Grünberg (cfr. Hiero. p. 208) und auf Salix purpurea bei Neumarkt (Schube).
- 2) *populi* Htg. 7. Gabel (D.) 1 ♀.
- 3) *testaceipes* Zadd. Galle auf Salix fragilis L. bei Carlowitz. (Hiero. p. 204).
- 4) *saliceti* Fall. 6. 7. Rothsürben (D.), Reimswaldau (D.).
- 5) *ater* Jur. 5. Raake (D.), Pohlanowitz (D.), Breslau (D., Schn.), Obernigk (D.).
- 6) *venustus* Zdd. Die Gallen (verdickte Blattstiele) an Salix aurita bei Grünberg (Hiero. p. 202) und Hohenwiese (D.).

### **Pontania Costa**

- 1) *bipartita* Lep. 7. 8. auf Salix. Breslau (Carlowitz, Pirschan) (D.).

- 2) *leucosticta* Htg. 6. Neuhof (D.), Liegnitz (B.).
- 3) *viminalis* Htg. (= *ischnocerus* Thoms.). 5. Obernigk (D.).  
var. *nigrifrons* Knw. 5. Carlowitz (D.), Nimkau (D.).  
Die Gallen (lose umgerollter, nicht verfärbter Blattrand) an *Salix cinerea* und *cinerea* × *purpurea* Jannowitz (D.).
- 4) *puella* Thoms. 5. 7. Schafgotschgarten (D.), Seiffenau (D.).
- 5) *vesicator* Bremi. 5—8. Ransern (D.), Schebitz (D.), Mettkau (D.), Seiffenau (D.), Jannowitz (D.), Hermsdorf u. K. (D.). Die Gallen überall verbreitet und häufig auf *Salix purpurea* L. (Hiero. p. 209/210.)
- 6) *collactanea* Förster. 4. auf *Salix*. Carlowitz (D.).
- 7) *salicis* Christ. (= *gallarum* Htg.) 3. 5. Breslau (D.). Die Gallen auf *Salix purpurea* L. häufig bei Breslau, Grünberg, Görlitz (Hiero. p. 209/210).
- 8) *bella* André. o. g. F. (Konow. I p. 129).
- 9) *pedunculi* Htg. 5. an *Salix*. Mirkau (D.). Gallen an *Salix aurita*, *caprea*, *cinerea* häufig bei Kohlfut, Görlitz etc., besonders auch im Riesengebirge (Hiero. p. 202 ff.).
- 10) *proxima* Lep. (= *Vallisnieri* Htg.) 4—6. an *Salix*. Mirkau (D.), Breslau (D., Schn.), Schebitz (D.), Liegnitz (B.). Altvater (Kolenati Br. und Zadd. 2 N. 153). Die Gallen an *Salix alba*, *amygdalina*, *caprea*, *cinerea*, *fragilis*, *pentandra*, *silesiaca* verbreitet und häufig. (Hiero. p. 201 ff.)

### Pteronus Jur.

- 1) *salicis* L. 6—8. Waldmühl (D.), Breslau (D., Schn.), o. g. F. (Zadd. 2 N. 61).
- 2) *dimidiatus* Lep. 6. 9. Mirkau (D.), Morgenau (Schn.).
- 3) *ribesii* Scop. 6. Breslau (D.), Liegnitz (B.), o. g. F. (Zadd. 2 N. 60).
- 4) *leucotrochus* Htg. o. g. F. (Zadd. 2 N. 24).  
var. *multiplex* Zadd. o. g. F. (Zadd. 2 N. 84).
- 5) *pavidus* Lep. 6. Jaunowitz (D.).
- 6) *nigricornis* Lep. 5. 9. Mirkau (D.), Morgenau (W.).
- 7) *notabilis* Knw. Breslau (Konow 2 p. 370, Fundort laut Brief).
- 8) *myosotidis* F. 5—8. sehr häufig an Dolden (*Pastinaca*) Kritschen (D.), Mirkau (D.), Breslau (D.), Obernigk (D.), Moisdorf (D.), Liegnitz (B.); Landeck (D.), Reimswaldau (D.), Jannowitz (D.), o. g. F. (Zadd. 2 N. 73).  
var. *ambiguus* Först. 5, 7, 8. Mirkau (D.), Masselwitz (D.), Hermsdorf u. K. (D.), o. g. F. (Zadd. N. 77).
- 9) *segmentarius* Först. 6. Liegnitz (B.), Jannowitz (D.).
- 10) *hortensis* Htg. 5, 6. Morgenau (Schn.), Carlowitz (D.), Niesky (Br.).
- 11) *virescens* Htg. 5, 10. Kleinburg (Schn.), Nimkau (D.).

- 12) *melanaspis* Htg. 4—8. an Salix. Mirkau (D.), Breslau (D., Schn.); Wartha (D.), Reimswaldau (D.).
- 13) *curtispinis* Thoms. 6—8. an Salix. Kritschen (D.), Mirkau (D.), Breslau (D., Schn., W.), Liegnitz (B.).
- 14) *oligospilus* Först. 5. 7. Nimkau (D.), Jannowitz (D.) 1 ♀.
- 15) *hypoxanthus* Först. o. g. F. (Zadd. 2 N. 142).
- 16) *dilutus* Brischke. 5. 7. an Salix. Morgenau (D., Schn.).
- 17) *polyspilus* Först. 7. Jannowitz (D.) 1 ♂, Proskau (Sonntag) 1 ♀.
- 18) *brevivalvis* Thoms. 5—7. 9. an Betula, Salix (Larve mit Birke gez. (Wo.). Mirkau (D.), Breslau (D., Wo.), Jannowitz (D.).
- 19) *capreae* L. 7. an Dolden. Carlowitz (D.), Liegnitz (B.).
- 20) *miliaris* Pz. 5—8. an Salix. Mirkau (D.), Pirschan und Morgenau (D., Schn.), o. g. F. (Zadd. 2 N. 140).
- 21) *notabilis* Knw. 5. Nimkau (D.).

### **Amauronematus** Knw.

- 1) *histrio* Lep. 5. Obernigk (D.), Liegnitz (B.), o. g. F. (Zadd. 2 N. 15).
- 2) *fallax* Lep. 5. Morgenau (Schn.), o. g. F. (Zadd. 2 N. 17).
- 3) *viduatus* Zett. 4. Scheitnig (D.), Liegnitz (B.), o. g. F. (als Nem. vagus Zadd. 2 N. 81).
- 4) *leptocephalus* Thms. Liegnitz (B.).
- 5) *vittatus* Lep. o. g. F. (Zadd. 2 N. 34).
- 6) *humeralis* Lep. 4. Breslau (W.).

### **Croesus** Leach.

- 1) *septentrionalis* L. 7. 8. meist selten. Larve an Birke. Breslau (Kosel) (D.); Ramsau (Nagel), Jannowitz (D.), Agnetendorf (D.).
- 2) *varus* Vill. 5. 6. Breslau (D.), Moisdorf (D.); Jannowitz (D.), o. g. F. (Zadd. 2 N. 8).

### **Holcocneme** Knw.

- 1) *insignis* Htg. o. g. F. (Zadd. 2 N. 13).
- 2) *princeps* Zadd. o. g. F. (Ratzeburg: Zadd. 2 N. 14).
- 3) *coeruleicarpa* Htg. Liegnitz (B.).
- 4) *crassa* Fall. 5. 7. 8. Carlowitz (D.), Pirschan (Schn.), Schebitz (D.); Hohenwiese (D.), Wernersdorf (D.), o. g. F. (Zadd. 2 N. 94).
- 5) *lucida* Pz. 4. 8. Leerbeutel (D.), Oswitz (D.).

### **Nematus** Jur.

- 1) *abdominalis* Pz. 5. 6. an Carex, Alnus. Neuhof (D.), Breslau (D.), Mettkau (D.), Moisdorf (D.), Liegnitz (B.), o. g. F. (Zadd. 2 N. 1).

- 2) *luteus* Pz. 5. 7. an Alnus. Langenbrück (D.), Raake (D.), Hundsfeld (D.), Gräbschen (Bautze), Lissa (D.), Obernigk (D.), Mettkau (D.), Nimkau (D.), Moisdorf (D.), Liegnitz (B.), Seiffenau (D.), Probsthain (D.); Salzgrund (Wo.), Jannowitz (D.), Hermsdorf u. K. (D.); o. g. F. (Zadd. 2 N. 2).
- 3) *bilineatus* Kl. 5. Nimkau (D.), o. g. F. (Zadd. 2 N. 3).

### **Pachynematus Knw.**

- 1) *Zaddachi* Knw. 7. 8. Carlowitz (D.), Obernigk (D.).
- 2) *turgidus* Zadd. 5. 7. Mirkau (D.), Schottwitz (D.), Breslau (D.), Schebitz (D.); Wartha (D.), Hermsdorf u. K. (D.).
- 3) *flaviventris* Htg. 5—7. 9. Mirkau (D.), Breslau (W., Z.), Liegnitz (B.), Hermsdorf u. K. (D.).
- 4) *trisignatus* Först. 5—7. Schafgotschgarten (D.), Leerbeutel (D.), Obernigk (D.), Liegnitz (B.); Wartha (D.), Reimswaldau (D.), Wernersdorf (D.).
- 5) *clitellatus* Lep. 5. am Schwarzwasser (Breslau) (D.) 1 ♀. Zobten (D.).
- 6) *Lichtwardti* Knw. Altvater (Lichtwardt Knw. 3 p. 31).
- 7) *xanthocarpus* Htg. 4. 5. Mirkau (D.), Breslau (D.), Schebitz (D.), Lissa (D.).
- 8) *pleuralis* Thoms. Liegnitz (B.).
- 9) *vagus* F. 7. Strachate (D.); Grunwald (D.), Jannowitz (D.), o. g. F. (als leucogaster Htg.: Zadd. 2 N. 134).
- 10) *obductus* Htg. o. g. F. (Zadd. 2 N. 135).  
var. *conductus* Ruthe. Liegnitz (B.).
- 11) *Gehrzi* Knw. 7. Spindelmühl (D.).
- 12) *laevigatus* Zadd. o. g. F. (Knw. 3 p. 150).
- 13) *imperfectus* Zadd. o. g. F. (Zadd. 2 N. 21).
- 14) *nigriceps* Htg. 5. 6. Namslau (D.), Liegnitz (B.), Hornschloß (D.).
- 15) *albibennis* Htg. 4—8. Mirkau (D.), Raake (D.), Wildschütz (D.), Rennplatz, Schwarzwasser (Breslau) (D.), Lissa (D.), Schebitz (D.); Wartha (D.).
- 16) *ruminicis* Fall. 5—8. häufig an Dolden, Rumex. Rothsürben (D.), Schottwitz (D.), Morgenau (Schn.), Klettendorf (D.); Wartha (D.), Jannowitz (D.), Wernersdorf (D.).
- 17) *pallescens* Htg. 5. Obernigk (D.).
- 18) *scutellatus* Htg. 6. Charlottenbrunn (Langner), Heidelgebirge (D.), o. g. F. (Zadd. 2 N. 147).

### **Lygaeonematus Knw.**

- 1) *saxeseni* Htg. 6. 7. Ramsau (Nagel), Heidelgebirge (D.), o. g. F. (Zadd. 2 N. 27).
- 2) *compressus* Htg. 5—7. Rothsürben (D.), Pirscham (D.), Obernigk (D.).

- 3) *ambiguus* Fall. 5. 6. Obernigk (D.); Heidelgebirge (D.).
- 4) *laricis* Htg. 4. 6. Bischwitz (D.), Obernigk (D.).
- 5) *mollis* Htg. 4. Brieg (Wo.).

**Pristiphora Ltr.**

- 1) *geniculata* Htg. 5. Langenbrück (D.); o. g. F. (Zadd. 2 N. 127).
- 2) *crassicornis* Htg. 7. Oswitz (D.); Hermsdorf u. K. (D.), Wernersdorf (D.).
- 3) *ruficornis* Ol. 5—7. Breslau (D.); Hermsdorf u. K. (D.), Wernersdorf (D.).
- 4) *pallipes* Lep. 6. Breslau (D., Schn.).
- 5) *fulvipes* Fall. 5. 6. 8. Breslau (D.), Obernigk (D.); Görbersdorf (D.); o. g. F. (Zadd. 2 N. 112).
- 6) *punctifrons* Thoms. Liegnitz (B.).
- 7) *pallidiventris* Fall. 4, 5, 7, 8. Rothsürben (D.), Bischwitz (D.), Oswitz (D.), Obernigk (D.); Laßgenau (W.).
- 8) *subbifida* Thoms. 4. Carlowitz (D.).
- 9) *conjugata* Dlb. 5—7. an Almus, Salix. Breslau (D., Schn., Wo.); Nimkau (D.); Salzbrunn (D.), Heidelgebirge (D.).

**Micronematus Fall.**

- abbreviatus* Htg. 5. Morgenau (Schn.).

**Phyllotoma Fall.**

- 1) *microcephala* Klbg. 5, 8. am Schwarzwasser (Breslau) (D.), Morgenau (Schn.).
- 2) *vagans* Fall. 5, 7. an Salix. Proskau (Sonntag), Bischwitz (D.), Breslau (D.), Nimkau (D.); o. g. F. (Letzner: Schles. Ges. 1875).
- 3) *leucomelaena* Klbg. Schmiedeberg? (Köhler: Klug p. 206).

**Eriocampoides Knw.**

- 1) *aethiops* F. 5—8. Namslau (D.), Rothsürben (D.), Breslau (Kosel) (D.), Obernigk (D.), Liegnitz (B.); Heidelgebirge (D.), Hermsdorf u. K. (D.).
- 2) *cinxia* Klbg. 6. Weidenhof (D.), o. g. F. (W.) (meine Sammlung).
- 3) *varipes* Klbg. 5. 6. Bischwitz (D.), Ransern u. Masselwitz (D.), Lissa (D.).
- 4) *annulipes* Klbg. 5. 7. an Salix. Groß-Wartenberg (D.), Bischwitz (D.), Breslau (D.), Schebitz (D.), Liegnitz (B.); Spindelmühl (D.).
- 5) *limacina* Retz. (= *adumbrata* Klbg.) 9. Mirkau (D.); die Larve trat im Sommer 1893 verheerend an Kirschbäumen bei Münsterberg, besonders an der Straße nach Frömsdorf auf (Schles. Zeit. Juli 1893).

**Hoplocampa Htg.**

- 1) *rutilicornis* Klbg. 5. Obernigk und Schebitz (D.).

2) *crataegi* Klug. 5. Scheitnig (Z.).

3) *testudinea* Kl. Niesky (Br.) 1 ♀.

### **Paraeophora** Knw.

*nigripes* Klug. 5. Schebitz und Obernick (D.).

### **Ardis** Knw.

*bipunctata* Klug. 6. Heidelgebirge (D.).

### **Phymatoceros** Dlrbm.

*aterrimus* Klug. Breslau (Wo.), Liegnitz (B.); Schmiedeberg? (Köhler: Klug. p. 126).

### **Tomostethus** Knw.

1) *nigritus* F. 5. 6. Bischwitz (D.), Pohlanowitz (D.), Breslau (D.), Liegnitz (B.).

2) *fuliginosus* Schrnk. 5—8. häufig an Alnus, Salix. Langenbrück (D.), Namslau (D.), Breslau (D.), Obernick (D.), Lissa (D.), Mettkau (D.), Kraika (Tsch.), Jauer (D.), Liegnitz (B.), Seiffenau (D.); Wartha (D.), Jannowitz (D.), Hermsdorf u. K. (D.).

3) *gagathinus* Klug. 5. 7. an Prunus padus. Namslau (D.), Skarsine (D.), Breslau (D.), Schebitz (D.); Hohenwiese (D.), Hermsdorf u. K. (D.).

4) *dubius* Gmel. (= *ephippium* Pz.) 5—7. häufig an Erle. Langenbrück (D.), Sibyllenort (D.), Ottwitz (Z.), Breslau (D., W.), Obernick (D.), Lissa (D.), Jauer und Moisdorf (D.), Liegnitz (B.), Seiffenau (D.); Wartha (D.), Charlottenbrunn (D.), Görbersdorf (D.), Jannowitz (D.), Agnetendorf (D.).

5) *luteiventris* Klug. (= *fuscipennis* Fall.) 5—7. Kritschen (D.), Breslau (D., Wo.), Obernick (D.), Lissa (D.), Zobten (Z.), Liegnitz (B.); Reimswaldau (D.), Charlottenbrunn (D.), Jannowitz (D.).

### **Blennocampa** Htg.

1) *affinis* Fall. 5. 7. an Alnus. Leerbeutel (D.), Gräbschen (Bautze), Schebitz (D.), Mettkau (D.), Moisdorf (D.), Liegnitz (B.), Seiffenau (D.); Wartha (D.).

2) *pusilla* Klug. 5. 6. häufig an Rosa. Breslau (D.), Liegnitz (B.). Die Galle vielfach an verschiedenen Rosa-Arten (Hiero. p. 200) bei Zobten, Ingamsdorf, Grünberg, Freystadt.

3) *alternipes* Klug. 5. 6. Schafgotschgarten (D.); Heidelgebirge (D.).

4) *subcana* Zadd. 5. 6. Bischwitz (D.), Obernick (D.); Jannowitz (D.).

5) *tenuicornis* Klug. 5. Obernick (D.) 1 ♂, Liegnitz (B.).

6) *geniculata* Steph. 4. 5. Namslau (D.), Mirkau (D.), Carlowitz und Rennplatz bei Breslau (D.), Liegnitz (B.).

### **Scolioneura** Knw.

1) *betuleti* Klug. 5. 7. Langenbrück (D.); Großer Teich im Riesengebirge an Knieholz (D.).

- 2) *nana* Klg. 5. 6. Neuhof (D.), Obernigk (D.).
- 3) *tenella* Klg. Liegnitz (B.) 1 ♀ 1 ♂.
- 4) *vicina* Knw. Liegnitz (B.) 1 ♀.
- 5) *nigricans* Klug. 5. 8. Rothkretscham und Pirscham (D., Schn.).

### **Entodecta** Knw.

- pumilus* Klg. Ransern (D.), Liegnitz (B.).

### **Monophadnus** Htg.

- 1) *geniculatus* Htg. 5. Namslau (D.), Obernigk (D.), Nimkau (D.).
- 2) *ruficornis* Brull. 5. Obernigk (D.); 2 ♂, 1 ♀.
- 3) *elongatus* Klg. 6. Heidelgebirge (D.).
- 4) *monticola* Htg. 5. 6. Kosel bei Breslau (D.), Schebitz (D.); Heidelgebirge (D.).
- 5) *albipes* Gmel. 4. 5. auf Dolden. Mirkau (D.), Schottwitz und Rennplatz (D.), Raake (D.), Obernigk (D.), Liegnitz (B.); Landeck (D.), Wartha (D.).

### **Pseudodineura** Knw.

- parvula* Klg. 5. 6. Schebitz (D.); Heidelgebirge (D.).

### **Caliosysphinga** Tischb.

- dohrni* Tischb. 7. Jannowitz (D.).

### **Fenella** Westw.

- intercus* Villers (= *nigrita* Westw.) 5. Rothkretscham (D.).

### **Athalia** Leach.

- 1) *colibri* Christ. (= *spinarum* F.) 5—9. häufig auf Dolden und überall verbreitet in der Ebene und im Gebirge, vom Altvater bis zum Riesengebirge.
- 2) *lineolata* Lep. (= *rosae* aut.) 5—9. ebenfalls häufig, auf Dolden, Spiraea etc. und ebenso verbreitet, wie *spinarum*.  
*var. cordata* Lep. 5. 9. Mirkau (D.), Mettkau (D.).
- 3) *lugens* Klg. 6—8. Mirkau (D.), Morgenau (Schn.), Schebitz (D.), Liegnitz (B.), Seiffenau (D.); Wartha (D.), Charlottenbrunn (D.), Hirschberger Tal (D.).
- 4) *annulata* F. 5. Groß-Wartenberg (D.), Waldmühl (D.). Schebitz (D.), Mettkau (D.), Moisdorf (D.), Liegnitz (B.); Landeck (D.), Jannowitz (D.).

### **Selandria** Klg.

- 1) *flavens* Klg. 5. 6. Breslau (D.), Obernigk (D.).
- 2) *serva* F. 5—9. häufig an Dolden, auch Salix. Öls (D.), Mirkau (D.), Breslau (D., Z.), Lissa (D.), Obernigk (D.), Kraika (Tsch.), Zobten (D.), Moisdorf (D.), Liegnitz (B.); Landeck (D.), Wartha (D.), Hirschberger Tal (D.).

- var. *mascula* Fall. 6. Neuhofer (D.).  
 „ *interstitialis* Knw. 5. 6. Langenbrück (D.), Neuhofer (D.).  
 3) *coronata* Klug. Schmiedeberg (Köhler: Klug. p. 208).  
 4) *stramineipes* Klug. 6. Lissa (D.), Obernigk (D.), Liegnitz (B.)  
 5) *cinereipes* Klug. (*aperta* Htg.). 6. 7. Mirkau (D.), Bischwitz (D.), Carlowitz und Leerbeutel (D.), Obernigk (D.), Zobten (Sok.); Gl. Schneeburg (W.), Jannowitz (D.), Wernersdorf (D.).  
 6) *morio* F. 5—8. häufig auf Alnus und Dolden. Langenbrück (D.), Namslau (D.), Mirkau (D.), Breslau (D., Schn.), Obernigk (D.), Mettkau (D.), Neuhofer (D.), Nimkau (D.), Jauer (D.), Liegnitz (B.); Landeck (D.), Wartha (D.), Reimswaldan (D.), Jannowitz (D.), Querseiffen (D.), Wernersdorf (D.).

### **Thrinax** Knw.

- 1) *mixta* Klug. o. g. F. (Rot.: Zool. Mus.).  
 2) *macula* Klug. 6. Heidelgebirge (D.) 1 ♂; o. g. F. (Schles. Ges. 1832).

### **Stromboceros** Knw.

- delicatus* Fall. o. g. F. (Rot.: Zool. Mus.).

### **Strongylogaster** Dlb.

- cingulatus* F. 7. sehr selten an niederen Pflanzen. Königshütte O/S.  
 — (E. Scholz), Jannowitz (D.) 1 ♀; o. g. F. (Rot.: Zool. Mus.).

### **Eriocampa** Htg.

- 1) *ovata* L. 5—8. nicht selten an Alnus. Proskau (Sontag), Breslau (D., Schn., W.), Mettkau (D.), Neuhofer (D.), Moisdorf (D.), Liegnitz (B.), Seiffenau (D.); Charlottenbrunn (D.), Hirschberger Tal (D.).  
 2) *umbratica* Klug. 5. auf Alnus. Bruschewitz (D.), Domatschine (D.), Bischwitz (D.), Moisdorf (D.), Liegnitz (B.), Niesky (Br.).

### **Poecilosoma** Thoms.

- 1) *pulverata* Retz. 6. Breslau (D.), Obernigk (D.); Jannowitz (D.).  
 2) *abdominalis* F. 8. Mirkau (D.).  
 3) *candidata* Fall. 4. 5. an Kiefer. Mirkau (D.), Carlowitz (D.), Obernigk (D.).  
 4) *immersa* Klug. 5. Carlowitz (D.).  
 5) *liturata* Gmel. (= *guttata* Fall.) 4. 6. Ohlau (D.), Skarsine (D.), Schottwitz (D.), Oswitz (D.), Schebitz (D.), Liegnitz (B.); Heidelgebirge und Görbersdorf (D.); o. g. F. (Rot.: Zool. Mus.), und (Klug. p. 113).  
 6) *undulata* Knw. Altvater (Konow 4 p. 250).  
 7) *Klugi* Steph. 5. an Alnus. Domatschine (D.), Skarsine (D.), Raake (D.), Bruschewitz (D.), Bischwitz (D.), Leerbeutel (D.), Liegnitz (B.).  
 8) *longicornis* Thoms. 7. Jannowitz (D.).

- 9) *excisa* Thms. Liegnitz (B.).  
 10) *tridens* Knw. 5. Nimkau (D.), Liegnitz (B.).

### **Empythus Klg.**

- 1) *viennensis* Schrk. 7. Hohenwiese (D.) 1 ♀.  
 2) *togatus* Panz. (= *succinctus* Klg.) 5—7. an *Populus nigra* und *Alnus*. Strehlen (Junge), Wildschütz (D.), Breslau (D., Schlegel, W.), Lissa (Junge), Nimkau (D.), Stephansdorf (Cutler), Liegnitz (B.); Reimswaldau (D.), Jannowitz (D.).  
 3) *cinctus* L. 5—8. an Rosa. Mirkau (D.), Breslau (D., Wo.); Wernersdorf (D.).  
 4) *cingulatus* Scop. (= *togatus* F.) Breslau (Wo.).  
 5) *basalis* Klg. 7. Querseiffen (D.) 1 ♂.  
 6) *truncatus* Klg. 7. an Eiche. Wernersdorf (D.), Hermsdorf u. K. (D.), Schmiedeberg (Köhler: Klug. p. 213).  
 7) *cingillum* Klg. 5. Nimkau (D.) 1 ♂.  
 8) *melanarius* Klg. 5. Breslau (Wo.).  
 9) *rufocinctus* Retz. 5. Schafgotschgarten (D.); o. g. F. (Klug. p. 210).  
 10) *coxalis* Klg. 4—9. Mirkau (D.), Bischwitz (D.), Breslau (D., W.), Nimkau (D.); Jannowitz (D.), Hermsdorf u. K. (D.).  
 11) *calceatus* Klg. 5. Mirkau (D.), Bischwitz (D.), Breslau (D., W.), Nimkau (D.), Hermsdorf u. K. (D.).  
 12) *braccatus* Gmel. (= *tibialis* Pz.) Oswitz (Schlegel) 1 ♀.  
 13) *serotinus* Müller (= *filiformis* Klg.) 9. Schmiedeberg (Köhler: Klug. p. 217). Lohsa O/L. (Br.).  
 14) *grossulariae* Klg. 5. 6. 8. Ohlau (D.), Mirkau (D.), Leerbeutel (D.), Janer (D.); Reimswaldau (D.).  
 15) *carpini* Htg. 6. 7. Seiffenau (D.); Heidelgebirge (D.).  
 16) *tener* Fall. 5—9. häufig an *Alnus*. Mirkau (D.), Schwoitsch (D.), Breslau (D.), Raake (D.), Obernigk (D.), Lissa (D.), Moisdorf (D.), Liegnitz (B.), Seiffenau (D.); Wartha (D.), Reimswaldau (D.), Salzbrunn (D.), Jannowitz (D.), Hermsdorf u. K. (D.).

### **Taxonus Htg.**

- 1) *glabratus* Fall. 5. 7. 8. Schwoitsch (D.), Breslau (D., Schn.), Obernigk (D.), Liegnitz (B.).  
 2) *equiseti* Fall. 5—9. Mirkau (D.), Schwoitsch (D.), Breslau (D., Schn.), Obernigk (D.), Raake (D.), Lissa (D.), Liegnitz (B.); Seiffenau (D.); Reimswaldau (D.), Görbersdorf (D.), Jannowitz (D.), Wernersdorf (D.), Agnetendorf (D.).  
 3) *agrorum* Fall. 5. 6. an Dolden. Bischwitz (D.), Breslau (D., Schn., W.), Schebitz (D.), Lissa (D.), Liegnitz (B.); Wartha (D.); o. g. F. (Gravenhorst: Klug. p. 203).

**Dolerus Jur.**

- 1) **pratensis** Linné. 5—8. sehr häufig im ganzen Gebiete auf Dolden, Gräsern an feuchteren Stellen.
- 2) **aericeps** Thoms. 5—9. häufig auf Dolden, Gräsern. Mirkau (D.), Bischwitz (D.), Breslau (D., Schn., W.), Ransern (D.), Kraika (Tsch.), Seiffenau (D.), Wartha (D.), Hermsdorf u. K. (D.).
- 3) **paluster** Klgl. 9. Mirkau (D.), Warmbrunn (Luchs: Schles. Ges. 1847, im Frühjahr auf blühenden Weiden gemein).
  - var. **saxatilis** Htg. Breslau, auf Weiden (Scholz 1847).
- 4) **tremulus** Klgl. (= **triplicatus** Htg.) 4, 5. Gandau (Wo.), Oltaschin (Scholz) nicht selten in nassen Vertiefungen; Schmiedeberg (Köhler: Klug, p. 231).
- 5) **uliginosus** Klgl. o. g. F. (Scholz, im Frühjahre nicht selten auf feuchten Wiesen, an Grabenrändern).
- 6) **madidus** Klgl. o. g. F. (Scholz, im Frühjahre an feuchten Orten).
- 7) **anticus** Klgl. 5—7. Barteln (D.), Carlowitz (D.), Obernick (D.); o. g. F. (Scholz, nicht gerade selten im Frühjahre).
- 8) **bimaculatus** Geoffr. (= **tristis** F.) 6. Liegnitz (B.); Jannowitz (D.) 1 ♀; o. g. F. (Rot.: Schles. Ges. 1847).
- 9) **dubius** Klgl. 5. häufig im Röhricht. Strachate (D.), Obernick (D.), o. g. F. (Scholz, nicht gemein).
  - var. **timidus** Klgl. 5. Breslau (Wo.), Liegnitz (B.), Niesky (Br.); o. g. F. (Scholz, nicht gemein).
- 10) **gessneri** André. 5. Breslau (Z.) 1 ♂.
- 11) **liogaster** Thoms. 4. Carlowitz (D.) 1 ♂.
- 12) **gonager** F. 4, 5. gemein im ganzen Gebiete auf Weiden.
  - var. **puncticollis** Thoms. Obernick (D.).
- 13) **picipes** Klgl. 4—7. gemein an Weiden. Namslau (D.), Mirkau (D.), Bischwitz (D.), Breslau (D., Wo.), Bruschewitz, Obernick (D.), Lissa (D.), Nimkau (D.), Wartha (D.), Jannowitz (D.).
- 14) **nigratus** Müller. (= **fissus** Htg. = **cenchris** Htg.) 4, 5. gemein. Mirkau (D.), Breslau (D., Scholz), Neukirch (D.), Obernick (D.), Rummelsberg (Z.), Mettkau (D.), Moisdorf (D.), Liegnitz (B.); Reimswaldau (D.).
- 15) **fumosus** Zadd. 3—6. Domatschine (D.), Breslau (D.); Charlottenbrunn (D.).
- 16) **rugulosus** D. T. 4, 5. an Salix. Bischwitz (D.), Breslau (D., Sok.).
- 17) **asper** Zadd. o. g. F. (Brauns 1 ♂: Konow 5 p. 345 Fußnote).
- 18) **coruscans** Knw. 3, 4. Breslau (D.), Liegnitz (B.), Görlitz (Sommer).
- 19) **gibbosus** Htg. Morgenau (Scholz) 3 Stck. (Die Bestimmung geschah durch Hartig.)

- 20) *niger* L. 4. 5. selten an Dolden. Hundsfeld (D.), Breslau (Z.), Obernigk (D.), Neuhof (D.); Wartha (D.); o. g. F. (Scholz).
- 21) *thoracicus* Klg. 4. 5. sehr selten. Carlowitz (D.), Gräbschen (Sonntag); o. g. F. Schummel und Scholz (nach Scholz nicht gemein auf Blüten von *Salix caprea* und *cinerea*).
- 22) *haematodes* Schrnk. 3—6. nicht häufig. Pohlanowitz (D.), Breslau (D., Schn., Wo.), Obernigk (D.), Neuhof (D.), Liegnitz (B.); Heidelgebirge (D.); o. g. F. (Scholz: auf feuchten Wiesen und Grabenrändern, doch auch auf Weidenblüten).
- 23) *sanguinicollis* K. var. *rarus* Zadd. 5—7. Bischwitz (D.), Breslau (D.), Weidenhof (D.), Lissa (D.), Liegnitz (B.), Seiffenau (D.); Charlottenbrunn (Langner).
- 24) *aeneus* Htg. 5—7. Obernigk (D.), Liegnitz (B.), Goldberg (D., Wolf); Ramsau (Nagel), Wartha (D.).
- 25) *nitens* Zadd. 4. selten. Breslau (D.), Liegnitz (B.).
- 26) *anthracinus* Klg. 3—5. 7. häufig. Breslau (D., Scholz), Liegnitz (B.).
- 27) *coracinus* Klg. ( $\sigma$  = *coeruleuscens* Htg.) Morgenau (Scholz: im zeitigen Frühjahr nicht grade selten). (Die Bestimmung röhrt von Hartig her.)

### **Loderus Knw.**

- 1) *palmatus* Klg. 4—6. häufig. Breslau (D., Scholz, Z.), Obernigk (D.); Wartha (D.), Görbersdorf (D.).
- 2) *vestigialis* Klg. 4—6. gemein auf Weide, blühendem Acer in der Ebene von Langenbrück bis Goldberg; Gl. Schneeberg (W.), Görbersdorf (D.).
- 3) *pratorum* Fall. 5. selten. Skarsine (D.), Breslau (D.); Scholz: bei Carlowitz an *Equisetum arvense* im Frühjahr oft in zahlloser Menge), Obernigk (D.), Pitschenberg bei Ingramsdorf (Scholz); Wartha (D.).

### **Sciopteryx Steph. (= Eniscia Thoms.).**

- 1) *consobrina* Klg. 5. 6. Strachate (D.), Breslau (D., Sok.), am Schwarzwasser 1894 nicht selten (D.); Heidelgebirge (D.).
- 2) *costalis* Fabricius. 4. 5. Breslau (D., Kletke, Schn., Thorwarth, W.), Obernigk (D.), Liegnitz (B.).

### **Rhogogastera Knw.**

- 1) *picta* Klg. 5. 6. selten. Breslau (Wiz.), Obernigk (D.), Lissa (D.), Neuhof (D.), Moisdorf (D.).
- 2) *viridis* L. 5—7. sehr häufig an *Salix*, *Alnus* in der Ebene wie im Gebirge.
- 3) *punctulata* Klg. 6—8. auf Dolden meist selten. Breslau (D.), Neuhof (D.), Charlottenbrunn (Rot.: Schles. Ges. 1831); Riesengebirge (Letzner: Schädling der *Salix limosa* an den Rändern des großen Teiches: Schles. Ges. 1831), Schwarzbach (Z.).

- 4) *fulvipes* Scop. (= *lateralis* F.) 5. nicht häufig. Langenbrück (D.), Strachate (D.), Breslau (D.), Obernigk (D.), Lissa (D.), Nimkau (D.), Moisdorf (D.), Liegnitz (B.); Wartha (D.), Heidelgebirge (D.).
- 5) *aucupariae* Klg. 4—7. z. T. häufig an *Prunus Padus*. Langenbrück (D.), Breslau (D., W., Wo.), Obernigk (D.), Kraika (Tsch.), Liegnitz (B.); Heidelgebirge (D.).

### **Tenthredopsis Costa.**

- 1) *litterata* Geoffr. 5. an Eiche und Schlehe nicht häufig. Breslau (D., Schnabel, Schn.), Moisdorf (D.); Gl. Schneeberg (Diel), Charlottenbrunn (D.), Jannowitz (D.).
- var. *cerasi* L. 6. Lissa (Junge).
- „ *cordata* Geoffr. 7. Ramsau (Nagel).
- „ *varia* Gmel. (= *dimidiata* F.) 5. 6. Breslau (D., Dietl), Neuhof (D.); Niesky (Br.), Gl. Schneeberg (W.).
- 2) *tiliae* Panz. (= *raddatzi* Knw.) 5. 6. Neuhof (D.), Lissa (Junge), Nimkau (D.), Nickrisch (Sommer), Niesky (Br.).
- 3) *dorsalis* Lep. (♂, *tirolensis* Knw. = ♀). 5. 6. Strachate (D.), Breslau (W., Wutzdorf), Schebitz (D.), Nickrisch (Sommer); Charlottenbrunn (Langner).
- 4) *pallida* Knw. 5. Nickrisch (Sommer) 2 ♀.
- 5) *sordida* Klg. 5. 6. meist vereinzelt an *Prunus spinosa*. Bischwitz (D.), Breslau (D., Wtz.), Schebitz (D.), Lissa (D.), Zobten (D.), Moisdorf (D.); Charlottenbrunn (D.).
- 6) *pavida* F. 5—7. an Eiche. Breslau (D., W.), Kraika (Tsch.), Schebitz (D.), Lissa (D.), Liegnitz (B.); Wartha (D.).
- 7) *elegans* Knw. 6. Lissa (Junge) 1 ♀.
- 8) *gibberosa* Knw. 6. Carlowitz (D.), Breslau (Bautze), Kraika (Tsch.).
- 9) *spreta* Lep. (= *obscura* Knw.). Nickrisch (Sommer) 1 ♀.
- 10) *fenestrata* Knw. 5—7. auf Dolden. Neuhof (D.); Ramsau (Nagel), Wartha (D.).
- 11) *campestris* L. 5. 7. Breslau (D.), Strehlen (Junge), Liegnitz (B.); Altvater (Diel, D.), Wartha (D.), Charlottenbrunn (Langner), Jannowitz (D.).
- 12) *coqueberti* Klg. 5. 6. Langenbrück (D.), Breslau (D.), Nimkau (D.), Moisdorf (D.), Liegnitz (B.); Wartha (D.), Reimswaldau (D.), Charlottenbrunn (D.).
- 13) *tischbeini* Mocs. 7. auf Dolden Altvater (D.).
- 14) *tarsata* F. 5. 6. Charlottenbrunn (D.), Nickrisch (Sommer).
- 15) *stigma* F. 5. 6. auf Dolden. Obernigk (D., Z.), Kraika (Tsch.), Strehlen (Junge), Moisdorf (D., Sok.).
- 16) *excisa* Thms. 5. Moisdorf (D.) 1 ♀.

- 17) *tesselata* Klg. 5. 6. auf Dolden, *Euphorbia cyparissias* z. T. häufig Lissa (D.), Nimkau (D.); Wartha (D.), Charlottenbrunn (D.).  
*var. alboplagiata* Knw. 5. 6. häufig ebenda und bei Breslau (D.), Obernigk (D.), Neuhof (D.).
- 18) *lactiflua* Klg. 5. selten. Rosen (D.), Skarsine (D.).
- 19) *hungarica* Klg. 5. 6. auf *Euphorbia cyparissias*. Namslau (D.), Kranst (Lehmann), Breslau (D., W.), Obernigk (D.), Lissa (D.), Liegnitz (B.); Charlottenbrunn (D.).

**Perineura** Htg.

rubi Pz. Liegnitz (B.).

**Pachyprotasis** Htg.

- 1) *variegata* Fall. Heinrichau (Herrmann); o. g. F. (Klug p. 149), Schummel (Schles. Ges. 1833).  
2) *antennata* Klg. 6. Neuhof (D.).  
3) *rapae* L. 5—8. gemein auf Dolden, Erle in der Ebene wie im Gebirge von Ramsau (Nagel) bis zum Hirschberger Tale.

**Macrophya** Dhlbm.

- 1) *rustica* L. 5—7. häufig auf Dolden. Moisdorf (D.), Liegnitz (B.); Wartha (D.), Reimswaldau (Wtz.), Jannowitz (D.).  
2) *rufipes* L. 6. Schebitz (D.).  
3) *quadrimaculata* F. 5—7. auf Dolden. Strachate (D.), Breslau (D., Junge), Obernigk (D., Lehmann), Liegnitz (B.), Seiffenau (D.); Wartha (D.), Heidelgebirge (D.).  
4) *punctum album* L. 5. auf *Ligustrum*. Namslau (D.), Breslau (D., Cutler).  
5) *ribis* Schrnk. im Frühjahr und 6—8. Breslau, in den Vorstädten im Jahre 1830 als Schädlings von Stachelbeersträuchern (Schummel, Schles. Ges. 1830), Liegnitz (B.); Charlottenbrunn (D.), Salzbrunn (D.), Schwarzbach (Z.).  
6) *parvula* Knw. Liegnitz (B.) 1 ♀.  
7) *albicincta* Schrnk. 5. 6. Strachate (D.), Canth (W.), Kraika (Tsch.), Liegnitz (B.) (hier offenbar häufig), Niesky (Br.).  
8) *duodecimpunctata* L. 5—7. an Eiche, Linde. Beuthen O/S. (Wolf), Kranst (Lehmann), Strachate (D.), Breslau (D.), Obernigk (D., Schn.), Lissa (D., Junge), Nimkau (D.), Liegnitz (B.); Wartha (D.), Jannowitz (D.), Hermsdorf u. K. (D.).  
9) *blanda* F. 6. Oswitz (Junge) 1 ♀.  
10) *annulata* Geoffr. (= *neglecta* Klg.) 5—7. auf Carex, Dolden, Linde, *Prunus Padus*. Strachate (D.), Breslau (D., Junge), Schebitz (D.), Lissa (D.), Zobten (Z.), Moisdorf (D.), Liegnitz (B.); Wartha (D.), Charlottenbrunn (D.), Jannowitz (D.).

**Encarsioneura** Knw.

**Sturmi** Klg. Ratibor (Kelch: Schles. Ges. 1832), Masselwitz (Sok.) 1 ♀; Silberberg (Rot.: Schles. Ges. 1835).

**Allantus** Jur.

- 1) **vespiformis** Schrnk. (= *pallicornis* F.) 5. selten auf Dolden. Wartha (D.), Schmiedeberg (Köhler: Klug p. 173).
- 2) **maculatus** Geoffr. 5. Langenbrück (D.), Krehlau (E. Scholz).
- 3) **temulus** Scop. (= *bicinctus* L.) 5—7. nicht häufig auf Dolden. Breslau (D., Kletke, Schlegel, Z.), Hünern (D., Müller), Mettkau (D.), Liegnitz (B.); Gräfenberg (Schippang), Ramsau (Nagel), Gl. Schneeberg (W.), Wartha (D.), Charlottenbrunn (D., Langner), Hirschberger Tal (D.).
- 4) **trabeatus** Klug. (= *palustris* Klg.) Schmiedeberg (Köhler: Klug. p. 189).
- 5) **albicornis** F. 7. nicht selten auf Dolden, besonders im Gebirge. Liegnitz (B.), Seiffenau (D.); Gl. Schneeberg (W.), Landeck (D.), Grunwald (D.), Charlottenbrunn (D.), Hohenwiese und Quersciffen (D.); Riesengebirge (Schummel: Schles. Ges. 1843).
- 6) **rossii** Pz. (= *bifasciatus* Klg.) 5—7. nicht selten, besonders im Gebirge. Kritschen (D.), Schebitz (D.), Moisdorf (D.); Altvater (D., Schippang), Gl. Schneeberg (D., W.), Landeck (D.), Wartha (D.), Reimswaldau (Wutzdorf), Hohenwiese (D.).  
var. **obesus** Mocs. 6. 7. Schebitz (D.), Moisdorf (D.); Ramsau (Nagel), Wölfelsgrund (D.).
- 7) **vespa** Retz. 7. 8. auf Dolden nicht häufig. Mirkau (D.), Breslau (D., Schn.); Liegnitz (B.); Gabel (D.), Gl. Schneeberg (W.), Grunwald (D.), Wartha (D.), Hirschberger Tal (D.).
- 8) **scrophulariae** L. 6—9. nicht häufig auf Dolden. Proskau (Sontag), Mirkau (D.), Breslau (D., Z.), Obernigk (D.), Lissa (D.), Striegau (D.), Liegnitz (B.), Seiffenau (D.); Reimswaldau (Wo., Wtz.), Hermsdorf u. K. (D.).
- 9) **zona** Klg. o. g. F. (Klug. p. 156).
- 10) **marginellus** F. 8. Osvitz (Bautze, Wo.), Lissa (D.).
- 11) **omissus** Först. 7—9. häufig auf Dolden, besonders Pastinaca. Mirkau (D.), Wildschütz (D.), Breslau (D.), Obernigk (D.), Liegnitz (B.); Wölfelsgrund (D.), Wartha (D.), Eulengebirge (Hartmann), Hohenwiese (D.).
- 12) **amoenus** Grav. (= *cingulum* Klg.) 7—8. Obernigk (D.), Neukirch (D.), Lissa (D.), Langenbielau (Wo.), Moisdorf (Sok.), Liegnitz (B.), Seiffenau (D.); Hirschberger Tal (D., Köhler: Klug. p. 155).
- 13) **fasciatus** Scop. (= *zonula* Klg.) 5—7. nicht selten auf Dolden. Waldmühl (D.), Skarsine (D.), Breslau (D.), Obernigk (D.), Lissa (D.), Striegau (D.), Moisdorf (Sok.), Liegnitz (B.), Goldberg (Wolf); Gl. Schneeberg (W.), Wartha (D.), Sattelwald (D.), Jannowitz (D.), Fischbach (Götschm.).

- 14) **Köhleri** Klg. 7. 8. sehr selten. Liegnitz (B.); Gabel (D.), Langenau (W.), Charlottenbrunn (Langner), Schmiedeberg (Köhler: Klug. p. 163).
- 15) **Schaefferi** Klg. 7. Wölfelsgrund (D.), Schmiedeberg (Köhler: Klug. p. 159).
- 16) **arcuatus** Först. (= *nothus* Klg.) 7—9. sehr gemein auf Dolden im ganzen Gebiete in der Ebene und im Gebirge vom Gl. Schneeberg bis zum Hirschberger Tal.  
var. **nitidior** Knw. Liegnitz (B.).
- 17) **flavipes** Geoffroy. 5. sehr selten auf Euphorbia palustris. Schottwitz und Schafgotschgarten (D.), Lissa (D.); Wartha (D.).

### Tenthredo L.

- 1) **ferruginea** Schrnk. 7. Wölfelsgrund (D.).  
var. **laticincta** Steph. Jannowitz (D.).  
„ **rufipennis** F. (= *rufiventris* Pz.) 5. 7. an Alnus selten. Oswitz (Sok.), Mettkau (D.); Gl. Schneeberg (W.), Charlottenbrunn (Langner), Jannowitz (D.), Schwarzbach (Z.).
- 2) **balteata** Klg. 7. Goldberg (Wolf); Ramsau (Nagel), Habelschwerdt (E. Scholz), Grunwald (D.), Charlottenbrunn (Langner), Spindelmühl (D.), Schwarzbach (Z.).
- 3) **solitaria** Scop. (= *coryli* Pz., ♂ = *intermedia* Klg.) 5. selten. Strachate (Nagel), Schafgotschgarten (D.), Zobten (Z.), Moisdorf (D.); Schmiedeberg (Köhler: Klug. p. 167 und 178).
- 4) **velox** F. 7. auf Dolden. Niesky (Br.); Altvater (D.), Gl. Schneeberg (W.), Charlottenbrunn (Langner), Schmiedeberg (Köhler: Klug. p. 170).
- 5) **moniliata** Klg. (= *Lachlaniana* Cam.) Charlottenbrunn (Langner) 1 ♀.
- 6) **rufipes** Klg. 7. Wölfelsgrund (D.), Wartha (D.).
- 7) **atra** L. 5—7. ziemlich häufig an Alnus. Beuthen (Wolf), Strehlen (Junge), Bischwitz (D.), Strachate (D.), Breslau (D., Schn.), Lissa (Junge), Canth (W.), Nimkau (D.), Moisdorf (D.), Liegnitz (B.), Goldberg (Wolf); Habelschwerdt (E. Scholz), Gräfenberg (Schippang), Gl. Schneeberg (W.), Charlottenbrunn (Langner), Reimswalda (Wtz.), Hirschberger Tal (D.).  
trans. var. **dispar** Klg. Wölfelsgrund (D.), Brückenberg (D.).  
var. **ignobilis** Klg. Schmiedeberg (Köhler: Klug. p. 190).
- 8) **obscura** Pz. (= *colon* Klg.) 6—8. Carlowitz (D.); Ramsau (Nagel), Gl. Schneeberg (D., W.), Heidelgebirge (D.), Schmiedeberg (Köhler: Klug. p. 167).
- 9) **livida** L. 5—8. auf Dolden. Bischwitz (D.), Leibnitz (D.), Lissa (D.), Liegnitz (B.); Gräfenberg (Schippang), Ramsau (Nagel), Wölfelsgrund (D.), Wartha (D.), Charlottenbrunn (D., Langner), Hirschberger Tal (D.).

- 10) *fagi* Pz. Strehlen (Junge), Liegnitz (B.).
- 11) *bipunctula* Klug. Jannowitz (D.), Schmiedeberg (Köhler: Klug. p. 170).
- 12) *mandibularis* F. 7. Reinerz (Lehmann).
- 13) *procera* Klug. Liegnitz (B.) 1 ♀.
- 14) *mesomelaena* L. 5—7. nicht selten auf Dolden. Ohlau (Dietl), Waldmühl (D.), Bischwitz (D.), Breslau (D., Junge, Thorwarth), Schebitz (D.), Moisdorf (D.), Liegnitz (B.); Altvater (D., Nagel), Glatzer Gebirge (D., W.), Reimswaldau (Wtz.), Hirschberger Tal (D.), Schwarzbach (Z.).  
var. *obsoleta* Klug. (= *arctica* Thms.) 7. im Gebirge. Altvater (D.), Grafschaft Glatz (D., W.), Eulengebirge Hartmann), Hirschberger Tal (D.).
- 15) *olivacea* Klug. 7. 8. auf Dolden. Breslau (Gravenhorst: Zool. Mus.), Altvater (D.), Langenau (W.), Grunwald (D.), Charlottenbrunn (Langner), Schmiedeberg (Köhler: Klug. p. 179), Agnetendorf (D.).
- 16) *flava* Poda. 6. 7. z. T. häufig auf Dolden, Eiche im ganzen Gebiete, in der Ebene wie im Gebirge vom Altvater bis zum Isergebirge.
- 17) *limbata* Klug. 7. Altvater (D.), Reimswaldau (Wtz.).



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [NF\\_30](#)

Autor(en)/Author(s): Dittrich R.

Artikel/Article: [Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefundenen  
Hymenopteren. II. Chalastogastra 23-47](#)