

Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1906.

Von **J. Gerhardt** — Liegnitz.

G. = Gerhardt. Gb. = Gabriel. Rtt. = Reitter.

1. *Trechus marginalis* Schh., Beskiden (Rtt.).
2. *Chlaenius quadrisulcatus* Ill. Oderwald bei Neusalz.
8. 5. 06. Lehrer Schreiber.
3. *Stenolophus luteatus* Dft., *exiguus* v. *lucidus* Dej.
Kohlfurt 1 Stck. (G.).
4. *Deronectes depressus* F. Guhrau, in einem Sandgrubentümpel (von Varendorff), Paskau (Rtt.).
Agabus nitidus v. *nigricollis* Loubk. Bremberger Höhen Kr. Jauer, mit der Stammform (G.).
5. *Rhantus latitans* Sharp. Breslau, Ohlau, Steinau, Glogau, Neusalz, Lähn, Kottwitz.
6. *Rhantus suturellis* Harris, *bistriatus* Er. Liegnitz (G.).
7. *Helophorus croaticus* Kuw. Kohlfurt (Letzner), Canth (E. Schwarz), Kottwitz (Gb.).
Hydrobius fuscipes v. *subrotundatus* Steph. Mit der Stammform z. s.
8. *Aleuonota gracilentata* Er. Beskiden (Gb.).
9. *A. Mulsanti* Ganglb., *pallens* Muls. Paskau (Rtt.).
10. *Atheta aegra* Heer, Glatzer Gebirge, 6. (Gb.).
11. *A. Gabrieli* Gerh. n. sp. Beskiden (Kolbe), Glatzer Schneeberg (Gb.), Rabengeb. (G.), Wasserforst b. Kaltwasser Kr. Lüben, hier unter Moos an alten Stümpfen (Kossmann, G.).
A. parva v. *muscorum* Bris. Quanzendorf, Glatzer- und Altvatergeb. (Gb.).
12. *Gyrophæna gentilis* Er. Schweinsdorf b. Neustadt i. O/S. (Gb.).

13. *Oligota pumilio* Ksw. Neisse, unter altem Heu (Gb.).
14. *Tachyporus fascipennis* Rtr. Neisse (Marx). Bisher nur aus der Gegend von Tiflis bekannt. (s. Luze, Revision d. Tachyporen, p. 171).
15. *Quedius brevicornis* Gyll. Rodeland Kr. Ohlau, im Mulm einer Rotbuche (Lehrer Tischler).
16. *Quedius Scribae* Ganglb. Beskiden (Reitter).
Philonthus tenuis v. *nigricollis* Gerh. Mit der Stammform ss. Liegnitz v. mir, u. Rodeland v. Tischler gef. Das Halsschild ist schwarz.
17. *Stenus Rogeri* Kr. Nach Ganglbauer gute Art. In Schlesien nach Letzner selten. Fundorte sind nicht angegeben.
18. *Bledius Baudi* Heer., ♀ *agricultor* Heer. An der Ostrawitza (Reitter).
19. *Homalium sulculum* Steph. Glatzer Geb. (Gabriel. 9).
20. *Protinus ovalis* Steph. Beskiden (Reitter).
21. *Cephennium carnicum* Rtt. *ibid.*
22. *Nossidium pilosellum* Rtt. *ibid.*
23. *Alexia carpathica* Rtt. *ibid.*
24. *Olibrus bimaculatus* Küst. Liegnitz, mehrfach von mir. Grafsch. Glatz (Gb.).
Cryptophagus pilosus var. *punctipennis* Bris. Quanzendorf (Gabr.).
25. *Atomaria bescidica* Rtr. Beskiden (Rtr.).
26. *Meligethes Kunzei* Er. Glatzer Geb. (Gabr.).
27. *Entomotrogus megatomoides* Rtt. Paskau (Rtt.) Insektensammlungen gefährlich; aus Mexiko. (Ganglb. Dermestoid. pag. 33.)
28. *Hister stigmosus* Mars. Riesengeb. (Klettesche Samml.).
29. *Adrastus lacertosus* Er. An der Ostrawitza (Gabr.).
30. *Cis oblongus* Mell. Liegnitz 2 Ex. (Gerh.).
31. *Pityogenes bistridentatus* Eichh. Kamm des Riesengebirges (Gabr.).

Der Numerus der Käferarten Schlesiens beträgt z. Z.

4273.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [NF_32](#)

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: [Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1906 9-10](#)