Beiträge zur schlesischen Käferfauna.

Von **W. Kolbe.**

Larinus carlinae Ol.

Den Mitteilungen des Herrn Prof. Dittrich (Jahresheft 1906, VIII) über die Lebensweise einiger Larinenlarven nach Fabre, Souvenirs entomologiques VII, will ich meine Beobachtungen von 1902 über *Larinus carlinae* hinzufügen. Sie zeigen, daß die Larinen bei ihrer Brutpflege recht verschieden verfahren.

Der genannte häufige Rübler tritt alljährlich im Peist bei Panten (Kreis Liegnitz) auf. Am 4. 7. 02 fand ich ihn wieder zahlreich auf seiner Lieblingspflanze *Cirsium arvense*. Die Käfer weiden von der Ober- und Unterseite der Blätter kleine, rundliche Pläne ab, wobei sie in der Regel die gegenüberstehende Epidermis unversehrt lassen. Die Begattung erfolgt oft, wohl nach jeder Eiablage; denn ich sah fortgesetzt kopulierte Pärchen. Einige Weibchen beobachtete ich bei der Brutpflege. Sie nagten an der Außenseite eines noch nicht erschlossenen Blütenkopfes ein zylindrisches Loch bis auf den Blütenboden, beförderten ein Ei hinein und verschlossen die Öffnung mit Nagespänen und Mundschleim. Da der Verschuß bald schwarz wird, so ist die belegte Stelle leicht zu erkennen. Das Ei ist kurz oval, fast kugelig, ziemlich glänzend, auf der Oberfläche fein chagriniert und mit ziemlich weitläufig gestellten Pünktchen besetzt. Ein abgesondertes Ei zeitigte in 6 Tagen die Larve. Sie ist gedrunken, stark einwärts gekrümmt, weiß, in

der ersten Jugend auf dem Rücken gelblich schimmernd; Kopf gelb, Mund bräunlich, Mandibelspitzen pechschwarz. Die Larve miniert auf dem Blütenboden hart an den Hüllblättern hin. Dabei verkümmern die beschädigten Blütenköpfe allmählich an der angebohrten Seite.

Erwähnen will ich noch, daß stark abgeriebene Käfer in der Gefangenschaft bei hinreichender Ernährung ihr graugrünes Duftkleid wiedererlangen.

Atheta orbata Er.

Ihre spezifischen Charaktere sind bereits von Herrn Oberl. Gerhardt (Jahresheft 1906, 13) auf Grund von mir gesammelten Materials besprochen worden. Ich beobachte sie in dem Forst Rehberg bei Panten (Kreis Liegnitz) schon mehrere Jahre hindurch; besondere Aufmerksamkeit widmete ich ihr in den Jahren 1904 und 05. Sie hält sich ausschließlich auf trockenem Sandboden auf. Ich siebte sie vom Frühjahr bis in den Spätherbst hinein besonders zahlreich aus den dünnen Moospolstern eines älteren Kiefernbestandes, strich sie auch dort vereinzelt von höheren Gräsern; ferner fand sie sich in einer benachbarten Sandgrube unter aufgehäufter Kartoffelkraute in geringer Anzahl. In humusreicheren Laubgebüsch, die etwa $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunde von dem Beobachtungsgebiete entfernt sind, fehlt sie gänzlich; hier tritt dagegen *A. fungi* Gr. ganz in ihre Rechte, während sie sich in dem Gebiete der *orbata* stets in der Minderzahl, höchstens bis zu 20%, mit dieser vereinigt. Es war mir bald klar, daß ich *orbata* Er. vor mir hatte. Sie ist eine ausgesprochene Sandbewohnerin, die gewiß auch Erichson von märkischem Sande erhalten hat und sicherlich bei uns unter ähnlichen Verhältnissen bald weiter gefunden werden wird.

Es ist noch hervorzuheben, daß auch bei uns *A. fungi* zuweilen mit ganz dunklen Fühlern (einschließlich des Wurzelgliedes) wie bei *orbata* vorkommt. Ich siebte solche Exemplare im April vor. Jahres aus einem Laubhaufen meines Hausgartens. Außer in der pechbraunen Fühlerfarbe stimmen die Stücke in Größe, Habitus und Grundskulptur mit normalen *fungi*-Stücken überein; ich bezeichne sie als ab. *fuscicornis*.

Atheta nitidicollis Fairm. und pilicornis Thoms.

Auf *Atheta crassicornis* Fbr. = *sericans* Gr. findet Darwins Satz Anwendung, daß weit und sehr verbreitete und gemeine Arten am meisten variieren. Es ist darum nicht immer ganz leicht, sie von ihren nächsten Verwandten zu trennen. Als solche sind obige beiden Arten zu bezeichnen.

A. nitidicollis Fairm. an faulenden Pilzen und an Aas. Liegnitz: Panten (verlorenes Wasser und Peist), Försterei Rehberg (10/06), Riesengebirge: Kiesewald (7/06). Die ♂♂ sondern sich von den dunkelsten *crassicornis*-Stücken schwer ab; die ♀♀ sind an dem länger bewimperten schwachen Ausschnitte des 6. Ventralsegments leichter zu erkennen.

A. pilicornis Thoms. an ausfließendem Baumsafte, schimmelnden Pflanzenresten, Pilzen und Baumschwämmen. Liegnitz: Kaltwasser, Lähn (7/92), Wölfelsgrund (10/00), Kiesewald i. R. (7/06). Von den hellsten *crassicornis*-Stücken durch die flacheren, weitläufiger punktierten Flügeldecken und die länger bewimperten Fühler zunächst zu unterscheiden. Das 6. Dorsalsegment des ♂ ist sehr schwach krenuliert und springt an den verdickten Seiten kaum vor. Das 6. Ventralsegment des ♀ ist wie bei *crassicornis* v. *fulvipennis* Muls. breit ausgerandet; die Ecken des kaum ausgebuchteten 6. Dorsalsegments springen als langer, dornförmiger, etwas nach außen gerichteter Zahn vor.

Ptiliolum Flach.

Diese von *Ptilium* Er. abgezweigte Gattung enthält nunmehr 5 schlesische Arten, von denen nur *Kunzei* Heer, die kleinste Art, häufig und weit verbreitet ist. Sie leben von faulenden Stoffen, besonders Aas.

Pt. fuscum Er. Liegnitz: Vorderheide (5/89). Wird in unserem Verzeichnis noch als Abart von *Spencei* All. geführt, ist aber schon durch die Skulptur des Halsschildes als distinkte Art gekennzeichnet. Während letzteres bei *Spencei* dicht und deutlich punktiert ist, erscheint es bei *fuscum* unter starker Lupenvergrößerung matt und äußerst fein punktiert; unter dem Mikroskope ist es feiner und weitläufiger punktiert und dazwischen deutlicher und dichter genetzt als bei *Spencei*.

Pt. Schwarzl Flach (neu für Schlesien! von Ganglbauer nur für Mecklenburg und den Kaukasus verzeichnet) mit Spencei und Kunzei, beide zahlreich, an ausgelegtem Aase kleinerer Tiere. Liegnitz: Forst Rehberg (5, 6/06), häufig; Riesengebirge: Kiewewald (7/06), einzeln.

Pt. Sahlbergi Flach (neu für Schlesien! von Ganglbauer für Schweden, Finnland, Monte Baldo und Vallarsa angegeben), s. Kiewewald i. R. (7/06). Unter starker mikroskopischer Vergrößerung zeigt sich außer der dichten und feinkörnigen Grundskulptur die von Flach festgestellte äußerst kurze, in Reihen geordnete zweite Behaarung.

Ganglbauers Vermutung (Band III, 8): »Die Scydmaeniden scheinen sich wie die Pselaphiden von Milben zu ernähren«, findet darin eine Stütze, daß ich am 3. 10. 06 ein Scydmaenus scutellaris-♀ mit einer Milbe zwischen den Kiefern beobachtete.

Bei dem Entleeren von Staarkästen (Liegnitz: Hausgarten, 5/06) fanden sich in den vorjährigen Nestern Gnathoncus punctulatus Thoms. und Megatoma undata L. (letztere mit den durch schwarze Seitenflecke der 3 Brustsegmente augenfällig ausgezeichneten Larven) in Mehrzahl vor. Ersterer gehört wohl dem Formenkreise von G. rotundatus Kugl. an, da die von den Autoren aufgeführten spezifischen Charaktere nicht konstant genug sind.

Ein von Lasius brunneus besiedelter weißfauler Eichenstumpf (Liegnitz: Peist bei Panten, 5/06) barg außer einigen verbreiteteren Arten folgende Seltenheiten: Euryusa sinuata Er., Quedius microps Kiesw., Xantholinus glaber Nord., Batrisus Delaporti Aub. (ziemlich zahlr.), venustus Reichb., Euplectus nanus Reichb., Saulcyella Schmidt Märk. (s. nachst. Übersicht), Eumicrus Perrisi Rtr. (zahlr.), Euconnus nanus Schaum, Ptomaphagus colonoides Kr., Rhizophagus cribratus Gyll., Abracus parvulus Aub. (zahlr.), Elater elongatulus Schh., Cis castaneus Mell.

Saulciella Schmidt Märk.

Die Art wurde von Dieckhoff und Schmidt in 1 Exem-
plare auf der Insel Wollin bei Formica rufa entdeckt und von

Maerkel 1844 in Germars Zeitschrift für Entomologie, Bd. V, 259, als *Euplectus Schmidtii* beschrieben. Hierauf erbeutete sie Dr. J. Roger bei Rauden in Oberschlesien; sein »Verzeichnis der bisher in Oberschlesien aufgefundenen Käfer« von 1856 enthält hierüber folgende Angaben: »*Trimium Schmidtii* Mrkl. Raud. im Juni in einer Kolonie v. Form. *congerens*, s. selten.« Nachdem mit Beginn ds. Jahrh., also nach einer etwa 50jährigen Zwischenpause, auch das Tier für Mähren (Braunsberg) und Südrußland (Kiew) festgestellt worden war, glückte es mir, das Tier unter den vorstehend erwähnten Verhältnissen in 3 Exemplaren aufzufinden. Es ist in seiner Lebensweise myrmekophil.

Seine generische Stellung blieb lange zweifelhaft; es wanderte in der Pselaphidengruppe *Euplectines* von *Euplectus* Leach. zu *Trimium* Aub. und *Philus* Aub. = *Aphiliops* Rtrr. und wurde schließlich (1901) von Reitter mit Fug und Recht zu der selbständigen neuen Gattung *Saulcyella* erhoben. (Wiener Entom. Zeitung, XX. Jahrg., 229.)

In der folgenden Übersicht mögen die drei einander nahestehenden Gattungen *Trimium*, *Philus**) und *Saulcyella* verglichen werden.

Körper mehr gestreckt und schmal *Trim.*, *Phil.*

„ weniger „ „ „ *Saulc.*

Kopf u. Hlssch. im Verhältn. zum Hinterkörper klein *Saulc.*

„ „ „ „ „ „ „ weniger „ *Trim.*, *Phil.*

Kopf so breit oder fast so breit als Hlssch. *Trim.*

„ schmaler „ „ *Phil.*, *Saulc.*

Scheitel an d. Einschnürung grubchenart. eingedrückt *Trim.*, *Phil.*

„ „ „ „ nicht „ „ *Saulc.*

Augen zieml. klein und gerundet, Schläfen lang *Trim.* *Phil.*

„ „ groß und länglich, „ kurz *Saulc.*

Stirn mit 2 mit d. Vorderfurche verbund. Grübchen *Trim.*

„ „ 2 „ „ „ unverbund. „ *Phil.*, *Saulc.*

Fühler ziemlich lang *Phil.*, *Saulc.*

„ kurz *Trim.*

*) *Philus* Aubei Rtrr. (Corsica) überließ mir Herr k. Rat Ed. Reitter freundlichst in 1 Stück.

- Fühler von einander entfernt, mit großem ovalen Endgl.
Trim., Phil.
- „ einander genähert, mit großem abgestutztem Endgl.
Saulc.
- Mund lang und dicht bärtig Phil., Saulc.
- „ kurz „ dünn „ Trim.
- Hlssch. a. d. Basis mit 3 verbundenen rundlichen Grübchen
Trim., Phil.
- „ „ „ „ „ einem winkligen Mitteleindr. u. einem
damit verbundenen längl. Seitenein-
druck Saulc.
- Flügeld. mit deutlicher Schulter Saulc.
- „ nur b. d. ♂ mit deutl. Schulter Trim., Phil. (?)
- Epipleuren d. Flügeld. bis in die Schulternähe abgesetzt Trim.
- „ „ „ nur in den hinteren $\frac{2}{3}$ „ Phil., Saulc.
- Erstes freiliegendes Rückensegment wenig verlängert Saulc.
- „ „ „ stärker „ Trim., Phil.
- „ „ „ mit Längskielchen Trim.,
Saulc.
- „ „ „ ohne Längskielchen Phil.
- Erstes Bauchsegment mit gelben Haarfransen Trim., Phil.
- „ „ ohne „ „ Saulc.
- Hinterhüften stark genähert Trim.
- „ erheblich entfernt Phil., Saulc.

Pterostichus aterrimus Payk. wählt sowohl trockene als feuchte Orte zum Aufenhalte. Liegnitz: Forst Würtsch (5/01), Bahnausstiche b. Arnsdorf, Ostufer des Jakobsdorfer Sees (4/05). *Agonum gracilis* Dej. auch hier auf trockenem Heideboden. Liegnitz: Forst Rehberg unter Reischtbündeln (8/. 9/05), nicht selten.

Ischnoglossa proluxa Gr. an abgehauenen Fichtenzweigen. Altvatergebirge: Kol. Gabel, Karlsbrunn (7/05). *Microglossa saturalis* Mnnh. unter den bekannten Verhältnissen. Liegnitz: Elbrandtshöhe b. Dohnau (4/93), Riesengebirge: Wiesenbaude (9/95). *Aleochara cuniculorum* Kr. an einem Hasenaas. Liegnitz: Sophienthal (5/00). *M. nidicola* Fairm. unter Anspülicht und Laub. Liegnitz: Jakobsdorfer See (4/05), Oberf. Panten (4/06).

Atheta longicollis Muls. unter feuchtem Laube. Liegnitz: Weißenroder Damm (6/05), 1 ♂. Unter meinen zahlreichen languidus-Stücken findet sich kein ähnliches zierliches Exemplar. *A. incognita* Sharp. an abgehauenen Fichtenzweigen und Wildfutter. Altvatergebirge: Kol. Gabel, Karlsbrunn (7/05), hfg., Riesengebirge: Kiesewald (7/06), hfg. *A. pagana* Er. an abgehauenen Fichtenzweigen und in einem Misthaufen. Altvatergebirge: Kol. Gabel, Karlsbrunn, Schäferei (7/05). *A. xanthopus* Thoms. an Pilzen und in Laubhaufen. Liegnitz: Oberf. Panten (9/02), Peist b. Panten (9/03), Hausgarten (9/06). *A. liliputana* Bris. an Vogelaas und unter Kartoffelkraut. Liegnitz: Forst Rehberg (6/06) und Pantener Höhen (11/06), mehrf. *A. mortuorum* Thoms. unter Kartoffelkraut und an Aas. Liegnitz: Pantener Höhen (11/05), Forst Rehberg (5/06). *A. cribrata* Kr. an einer gefallenen Fichte und Vogelaas. Liegnitz: Peist b. Panten (5/05), Forst Rehberg (6/06).

Oxyopoda rufescens Kr. an abgehauenen Fichtenzweigen. Altvatergebirge: Kol. Gabel, Karlsbrunn (7/05). *O. atricapilla* Märk. unter der Rinde alter Baumstümpfe. Matzdorf b. Lähn (7/92), Isergebirge (7/05), Altvatergebirge: Schäferei (7/04, 7/05), Riesengebirge: Kiesewald (7/06). *O. sericea* Heer von Pflanzen gestrichen. Liegnitz: Peist b. Panten (6/05). *O. spectabilis* Märk. unter Laub. Liegnitz: Försterei Rehberg (10/06).

Mycetoporus Brucki Pand. an gleichem Orte (5, 6, 10/06).

Quedius obliteratus Er. desgl. (6/06). Seidlitz führt ihn als *suturalis* Kiesw. auf; das von ihm erwähnte Borstenpaar ist dem 6. und 7. Segment eigentümlich. *Qu. microps* Gr. in faulenden Baumstümpfen. Liegnitz: Peist b. Panten (5/06), Altvatergebirge: Karlsbrunn (7/05). *Qu. fulvicollis* Steph. an feuchten Orten im Anspülicht, Heu usw. Riesengebirge: Wiesenbaude (6/04), Altvatergebirge: Oppa b. Karlsbrunn und unterhalb der Schäferei (7/04, 7/05). Die rote Seitenfärbung verdunkelt bei älteren Stücken stark; entscheidend für die Art ist in erster Linie der breite Kopf mit den stark gewölbten Augen.

Sunius pulchellus Heer unter Laub. Liegnitz: Bremberg, Weißenrode (6/05), Hausgarten (6,06). *Trogophloeus impressus* Lac. unter feuchtem Laube. Liegnitz: an vielen Orten (4—8),

nicht selten. Altvatergebirge (7/04). Waldenburger Gebirge: Neuhaus (7/93). *Omalium oxyacanthae* Gr. an einer gefallenen Fichte und Aas. Liegnitz: Peist b. Panten (5/05) und Forst Rehberg (5/05, 6/06).

Euplectus nubigenus Rtrr. Liegnitz: Kaltwasser (5/88, 6/93), Heßberge (9/94). *E. Duponti* Aub. Liegnitz: Kaltwasser (5/90), Katzbachufer (5/96), Riesengebirge: Kieweswald (7/06). Beide in modernden Baumstubben.

Ptomaphagus coracinus Kell. unter Laub und an Aas. Liegnitz: Panten (verlor. Wasser, 10/06), Peist (5/00, 10/06), Johnsdorfer Park (9/89), Moisdorf (10/91).

Clambus punctulum Gyll., viellach als kleine Form von *minutus* Strm. genommen, scheint das Bergland vorzuziehen. Brechelshof (9/87), Lähn (7/92), Kieweswald (7/06).

Atomaria diluta Er. unter faulenden Pflanzenstoffen. Liegnitz: Weißenrode (8/05), Riesengebirge: Kieweswald (7/06). *A. contaminata* Er. desgleichen. Liegnitz: Peist b. Panten (5/06), Riesengebirge: Kieweswald (7/06).

Anommatus 12-striatus Müll. (neu für Schlesien!) unter faulendem Stroh. Liegnitz: Weißenrode (6/05), 1 Stück. *Lathridius rugicollis* Ol. Liegnitz: Kaltwasser (7/00), Peist b. Panten (7/04), Heßberge (7/03), Riesengebirge: Kieweswald (7/06). *Corticaria longicollis* Zett. in den Nestern der *Formica rufa* z. t. in frisch entwickeltem Zustande. Liegnitz: Heßberge (10/05), zahlreich.

Epurae Deubeli Rtrr. (neu für Schlesien! bisher nur für Siebenbürgen festgestellt) von Fichten geklopft. Liegnitz: Heßberge (7/03), 1 Stück. Bestimmung von Herrn Dir. Ganglbauer freundlichst bestätigt. *Rhizophagus cribrata* Gyll. unter der Borke von Baumstümpfen. Liegnitz: Vorderheide (6/88), Johnsdorfer Park (10/89), Riesengebirge: Kieweswald (7/06).

Attagenus pantherinus Ahr. auf blühender *Euphorbia cyparissias*. Liegnitz: Pantener Höhen (5/06).

Aphodius nemoralis Er. Liegnitz: Kaltwasser (5/98); Jannowitz (5/02), Kieweswald (7/06). *A. tristis* Pz. Liegnitz: Forst Rehberg (6/06). *Amoecius corvinus* Er. Liegnitz: Lindenbusch, Peist b. Panten (9/04, 6/05), Riesengebirge: Kieweswald (7/06).

Cardiophorus equiseti Hbst. auf blühender *Euphorbia cyparissias*. Liegnitz: Panten (5/06), z. hfg.

Sphindus dubius Gyll. an dem *Polyporus* eines Eichenstumpfes. Liegnitz: Peist b. Panten (8/05). *Cis striatulus* Mell. in Baumschwämmen. Liegnitz: Peist b. Panten (6/06).

Salpingus matilatus Beck. an abgehauenen Fichtenzweigen. Altvatergebirge: Kol. Gabel (7/05). *Mycterus curculionoides* Fbr. auf blühendem Liguster. Liegnitz: Panten (6/06).

Ceuthorrhynchidius nigrinus Mrsh. Liegnitz: Panten (8/03, 5/06), Weißenrode (8/05). *Ceuthorrhynchus chrysanthemi* Germ. Liegnitz: Pantener Höhen (5/06), Elbrandtshöhe b. Dohnau (6/95).

Kiesewald im Riesengebirge.

Mein vorjähriger Sommeraufenthalt in dem oberhalb der Station Petersdorf in 650 m Seehöhe still und freundlich gelegenen Orte bot mir Gelegenheit, mich mit der dortigen Käferwelt einigermaßen vertraut zu machen. Die nähere Umgebung, auf die ich mich bei meiner Sammeltätigkeit beschränkte, bietet für koleopterologische Zwecke nicht allzuviel Abwechslung. Die Bergelehnen sind trocken und ziemlich einförmig mit Fichten und wenigen eingestreuten Laubbäumen bestanden. Es fehlt an feuchten, laubreichen Gründen und Schluchten. Moorboden ist nur an einer entfernteren Stelle vorhanden und noch dazu mit Hochwald bestanden und durch Abzugsgräben nahezu trocken gelegt. Die wenigen Bäche sind schmal und fließen durch Wiesen und Waldgebiete rasch zu Tal. Den Verhältnissen mich anpassend, beschränkte ich mich fast ausschließlich auf die Verwendung des Siebes. Besondere Aufmerksamkeit schenkte ich hierbei den faulenden Pilzen (Holzberg) und den schimmelnden Futterresten in und bei den Wildhütten (Buchhübel, Breiter Berg, Matzler). Eine solche Hütte oberhalb des Leiterweges wies aufgehäuftes welkendes und leicht schimmelndes Himbeerreisicht auf, das ich mit Erfolg ausschüttelte.

Da an diesem Punkte unseres Gebirges von schlesischen Koleopterologen noch nicht gesammelt worden ist, so dürfte die

Veröffentlichung meiner Ausbeute mit Ausschluß der fast überall auftretenden Arten der Kenntnis über die örtliche Verbreitung unserer heimischen Käfer zu gute kommen.

Auf Moorboden unter Laub und Anspülicht: *Trechus amplifollis* Fairm., *palpalis* Dej., *striatulus* Putz. und *pulchellus* Putz. (letzter auch oft unter anderen Verhältnissen). Desgl. *Harpalus laevicollis* Dft.

In stagnierendem Wasser zwischen Lemna: *Haliphus lineatocollis* Mrsh., zahlr. In Moorgräben: *Hydroporus Kraatzi* Schaum, *ferrugineus* Steph. und *planus* Fbr., *Dianous coerulescens* Gyll., *Lesteva longelytratra* Goez., *pubescens* Mannh. und *punctata* Er.

Auf feuchtem Grunde zu streichen: *Stenus 2-foveolata* Gyll.

Unter feuchtem Laube: *Atheta livida* Rey, *microptera* Thoms. (auch an Wildfutter), *granigera* Kiesw., *oblonga* Kr. (auch an Wildfutter), *Myllaena brevicornis* Mth., *Mycetoporus Mulsanti* Ganglb., *Quedius maurorufus* Grav., *limbatus* Heer, *humeralis* Steph. und *umbrinus* Er., *Othius myrmecophilus* Kr., *Domene scabricollis* Er.

An Aas und Pilzen: *Quedius lucidulus* Er., hfg.

Unter faulendem Heu: *Atheta indubia* Sharp., *subsinuata* Er., *Leucoparyphus silphoides* L., *Megarthrus denticollis* Beck. Unter modernem Stroh: *Atheta valida* Kr., *Oxypoda filiformis* Redtb. In Straßenmist: *Atheta picipennis* Mannh., *laevana* Rey, *sordidula* Er., *celata* Er. und *inquilina* Er., *Cercyon lateralis* Mannh.

An abgehauenen Fichtenzweigen und Wildfutter: *Atheta incognita* Sharp. und *myrmecobia* Kr., beide hfg. An Baumschwämmen und in Futterhütten: *Bolitochara Mulsanti* Sharp. und *Atheta pilicornis* Thoms. An Baumschwämmen: *Atheta pallidicornis* Thoms.

In Baumstümpfen und Futterhütten: *Leptusa analis* Gyll., *haemorrhoidalis* Heer, *Ocyusa incrassata* Rey. Unter der Borke alter Stümpfe: *Oxypoda atricapilla* Maerk., *Philonthus splendidulus* Gr., *Acrulia inflata* Gyll. Unter Kiefernrinde: *Atheta picipes* Thoms. (auch in Futterhütten), *Thectura cuspidata* Er., *Phloeocharis subtilissima* Kr.

An Wildfutter: *Atheta trinotata* Kr., *sodalis* Er., *angusticollis* Thoms., *nigricornis* Thoms., *Megacronus rufus* Er., *Myctoporus niger* Fairm., *Maerkeli* Kr. und *punctus* Gyll., *Omalius concinnum* Mrsh.

An Pilzen: *Aleochara lygea* Kr. und *mycetophaga* Kr., *Atheta nitidicollis* Fairm., *monticola* Thoms., *cadaverina* Bris., *Megarthus depressus* Payk., *hemipterus* Ill., *Proteinus atomarius* Er.

An allerhand faulenden Stoffen: *Atheta subtilis* Scrib. und *amicula* Steph., *Oxypoda umbrata* Gyll. und *Megarthus sinuatocollis* Lac., alle hfg.

In Baumstöcken: *Bythinus validus* Aub., *Euplectus Duponti* Aub., *Fischeri* Aub., *Anisotoma orbicularis* Hbst., *Agathidium anisotoma* Hbst.

An Rehaas: *Ptomaphagus Kirby* Spenc., hfg.; an verschiedenen Orten: *Ptom. nigricans* Spenc.

An Wildfutter, Pilzen und Rehaas: *Ptiliolum Sahlbergi* Flach (neu für Schlesien!) mit *Pt. Schwarzii* Flach, *Spencei* All. und *Kunzei* Heer, nicht ganz selten.

An Wildfutter: *Clambus punctulum* Gyll., selten, *Calypotomerus alpestris* Redtb. und *Orthoperus atomus* Gyll., beide hfg.

Fichtenzweige: *Cryptophagus subdepressus* Gyll. und *setulosus* Strm. Wildfutter: *Crypt. silesiacus* Gglb. und *pilosus* Gyll. In angespültem Fichtenreisicht: *Caenoscelis ferruginea* Sahlb.

Wildfutter: *Atomaria diluta* Er., *pulchra* Er., *pusilla* Payk., *fuscata* Schh., *contaminata* Er. (zahlr.), *turgida* Er. und *apicalis* Er. Abgehauene Fichtenzweige und Wildfutter: *Lathridius rugicollis* Ol., *Cononimus constrictus* Gyll. und *nodifer* West., hfg., *Enicmus anthracinus* Mannh. und *Cartodere elongata* Curt., zahlr. Baumschwämme: *Enicmus rugosus* Hbst. Heu: *Corticaria umbilicata* Beck.

Abgeh. Fichtenzweige und Wildfutter: *Epuraea nana* Rtrr. und *boreella* Zett. Wildfutter: *Ep. variegata* Hbst., *pygmaea* Gyll. und *angustula* Er. Baumstöcke und Wildfutter: *Rhizophagus cribratus* Gyll. und *dispar* Payk. Wildfutter: *Silvanus similis* Er.

Hister succicola Thoms. (Mist und Pilze), *Aphodius nemoralis* Er. (Rehkot), *Amoecius corvinus* Er. (Reh- und Pferdemit).

Pryopterus affinis Payk., *Malthodes mysticus* Kiesw., *Cleroides rufipes* Brahm., *Bruchus subpilosus* Strm., *Ernobius abietinus* Gyll., *Cis nitidus* Hbst., *Ennearthron affine* Gyll., *Anthicus floralis* Fbr.

Trachodes hispidus L. (Futterhütte), *Dorytomus salicis* Walt., *Acalles pyrenaicus* Boh. (Futterhütte), *Magdalis violaceus* L., *duplicatus* Germ. und *carbonarius* L. (alle auf Birken), *Sibinia potentillae* Germ., *Coeliodes rubicundus* Payk., *Ceuthorrhynchus contractus* Marsh., *Apion sabulatum* Kirb., *ervi* Kirb., *Spencei* Kirby.

Crypturgus pusillus Gyll., *Tomicus amitinus* Eichh. (unter Kiefernrinde).

Tetropium fuscum Fbr., *Pogonochaerus fasciculatus* Deg., *Cryptocephalus saliceti* Zeb.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [NF_32](#)

Autor(en)/Author(s): Kolbe Wilhelm

Artikel/Article: [Beiträge zur schlesischen Käferfauna 14-25](#)