

Zeitschrift für Malakozoologie.

Herausgegeben
von

Karl Theodor Menke, M. D.
und
Dr. Louis Pfeiffer.

1846.

(Es erscheint monatlich ein Bogen.)

Juli.

Diagnoses Testaceorum quorundam novorum.

Auctore R. A. Philippi.

1. *Rissoa decorata Ph.*

R. testa turrita, undato-costata, sulcis profundis, transversis, regularibus exarata, alba, interstitiis costarum striga fusca exaratis; anfractibus convexiusculis; apertura vix dimidiata spiram aequante, ovata; peristomate continuo; labro incrassato. Alt. 3"; diam. 1 $\frac{1}{4}$ ".

In insula Lesina Dalmatiae detexit orn. Botteri.

2. *Rissoa ornata Ph.*

R. testa ovata, acuta, plicata, hyalina, punctis rufis regulariter dispositis ornata; apertura ovata, spiram subaequante; peristomate continuo, nigricante; labro extus limbato. Alt. 2 $\frac{1}{4}$ "; diam. 1 $\frac{1}{3}$ ".

In insula Lesina Dalmatiae detexit orn. Botteri; specimen in Ponto Euxino lecta cl. de Middendorff dehco.

3. *Auricula Botteriana Ph.*

A. testa oblonga-fusiformi, tenui, pellucida, albida; anfractibus 7 $\frac{1}{2}$, marginatis; apertura spiram vix superante; columella quadriplicata; labro intus quinqueplicato. Alt. 2 $\frac{3}{4}$ "; diam 1 $\frac{1}{4}$ ".

In insula Lesina Dalmatiae detexit orn. Botteri, cui hanc speciem dicatam esse volo.

4. *Auricula striata Ph.*

A. testa ovata, solida, exquisite transversim sulcata, fusca; spira conica, mammillata, aperturam subaequante; columella triplicata; labro intus incrassato, bidentato dentibus albis in faucibus fuscis. Alt. 3"; diam. 2".

Laemodonta striata Adams (ubi?). Sub hoc nomine misit cl. Bronn hanc speciem ex insulis Sandwich oriundam.

5. *Auricula Bronnii Ph.*

A. testa ovata, solidiuscula, transversim conferte striata; spira conica, aperturam haud aequante, pallida; anfractu ultimo fasciis duabus latis, fuscis cincto; columella triplicata; labro acuto, intus linea transversa elevata in fauces diducta. Alt. 4"; diam. 2 $\frac{3}{4}$ ".

Incolit insulas Sandwich; communicavit cl. Bronn.

6. *Turbo Grunerii Ph.*

T. testa impersonata, orbiculato-conoidea, apice acuta, pallide carnea, maculis intense rufis pieta; anfractibus convexis; cingulis elevatis, transversis, subgranosis, alternantibus cum scriebus granulorum moniliformibus; apertura circulari; columella aliquantulum dilatata, extus cingulo lato, calloso, circumdata. Alt. 14"; diam. 15".

E colonia Adelaida Novae Hollandiae accepit cl. Gruner.

7. *Turbo lamellosus Ph.*

T. testa ovata, elongata, umbilicata, cingulis transversis paucis, octo in anfractu ultimo, lamellisque incrementi foliaceis, incumbentibus sculpta, virescente, fusco-flaminulata; anfractibus rotundatis, sutura profunda divisus; apertura basi non producta. Alt. 13"; latit. 12".

E Nova Hollandia provenientem nactus est cl. Koch.

8. *Turbo intercostalis Menke in literis.*

T. testa ovata, elongata, umbilicata, pallide carnea, flaminis maculisque ferrugineis pieta; cingulis transversis

elevatis, inaequalibus, circa 24 in anfr. ultimo, maximo *angulum distinctum*, in anfr. supp. medianum, formante, minoribus partem medium anfr. ultimi occupantibus; interstitiis striis incrementi lamellaribus, regularibus pulchre sculptis; apertura ovata, basi producta; labro intus crenato. Alt. 28"; lat. 23". Minus bene cl. Menke in Moll. Nov. Holl. spec. p. 13. Nr. 46 hanc speciem cum *T. pulchro* Reeve conjunxit, qui colore, cingulis serratis aliisque notis satis differe mihi videtur.

Specimina e Nova Hollandia occidentali a Preissio allato cl. Dunker et ipse servamus.

9. *Turbo moluccensis* Ph.

T. testa *globosa-conoidea*, umbilicata, viridi et rufo marmorata; anfr. rotundatis, supremis rubentibus; costis transversis *parum elevatis*, inaequalibus, interstitiis *angustis* divisis, obsolete crenulatis; apertura *subcirculari*; labro intus viridi limbato, obsolete crenulato. Alt. 17"; diam. 17".

Specimen ex insula Amboina exstat in collectione Dunkeri.

10. *Turbo concinnus* Ph.

T. testa *ovata*, umbilicata, pallide viridi, flammulis maculisque castaneis picta; anfr. rotundatis; costis transversis *parum elevatis*, interstitiis profundioribus divisis; striis incrementi *tenuissimis*, *confertissimis*; apertura subcirculari, labro intus viridi limbato, margine crenulato. Alt. 22 $\frac{1}{2}$ "; diam. 19".

In collectione cl. Dunker adest specimen incertae originis.

11. *Monodonta ringens* Ph.

M. testa depresso-conica, umbilicata, cingulis granorum (5 in anfr. penultimo) ornata, alba, maculis roseis adpersa; anfr. ultimo angulato; basi alba; umbilico mar-

gine crenato; columella basi dente valido terminata; labro intus dentato, dente supremo maximo. Alt. $5\frac{1}{4}''$; diam. $7\frac{1}{4}''$.

An *Trochus carneus* Gm. p. 3574. Chemn. V. p. 116. tab. 161. fig. 1682? figura et descriptio insufficientes; de structura labri in specie nostra valde peculiariter altum silentium.

Patria . . . Specimina e collectionibus Pfeifferiana et Gruneriana contuli.

12. *Monodonta Kraussii Ph.*

M. testa elevato-conoidea, umbilicata, cingulis transversis granosis sculpta, albida, purpureo-flammulata; anfr. parum convexis; suturis parum profundis; umbilici margine crenulato; columella superne soluta, subreflexa, nodulis aliquot munita; labro intus crenulato. Alt. $5\frac{1}{3}''$; diam $5\frac{1}{2}''$.

Opportunitatem hanc speciem, in museo Regio Stuttgartensi asservataam, incertae patriae, describendi cl. Krauss debo.

13. *Monodonta punicea Ph.*

M. testa conica, umbilicata, cingulis granorum confertis, (circa octo in anfr. penultimo) ornata, coccinea; cingulo mediano et insimo anfr. superiorum nigro-punctatis; margine umbilici dentato; columella superne soluta, basi dente plicato terminata; labro intus dentato. Alt. $8\frac{1}{2}''$; diam. $9\frac{1}{2}''$.

Habitat in Nova Zeelandia (?) haec testa in Musaeis obvia et cum M. Pharaonis immerito confusa.

14. *Monodonta margaritaria Ph.*

M. testa conica, umbilicata, cingulis granorum inaequalibus (circa septem in anfr. penultimo) ornata, fusca; cingulo secundo quartoque granis nigris, sexto et septimo vero granis fuscis, albis, nigris alternantibus ornatis;

margine umbilici dentato; columella superne soluta, basi dente plicato terminata; labro intus dentato. Alt. 6^{'''}; diam. 7^{'''}.

An *Trochus clangulus* Wood Suppl. tab. V. fig. 31
?? fig. modo 4^{'''} alta, parum clara et distincta.

Specimen patriae ignotae ad describendum misit cl.
Gruner.

15. *Monodonta villana* Ph.

M. testa conoidea, umbilicata, cingulis granorum distantium (circa 5 in anfractu penultimo) ornata, fusca; granulis nonnullis nigris; margine umbilici crenato; columella superne soluta, margine *granulis* notata; labro intus basi sulcato. Alt. 10^{'''}; diam. 11^{'''}.

Chemnitz V. p. 114. tab. 171. fig. 1678.

Chemnitzius Oram auream Guineae hanc speciem producere tradidit. Specimen in musaeolo meo conspicitur.

16. *Trochus ochraceus* Ph. = *Pachysoma gibbosum* Cher.

Tr. testa imperforata, depresso-conica, fusco-lutea; anfr. planis, margine undato-spinoso inferne prominentibus, in parte superiore costulis obliquis, in parte inferiore serie transversa duplice vel triplice granorum sculptis; basi planiuscula, cingulis 5 — 6 subgranosis sulcisque intermediis profundis sculpta; apertura depressa, subrhomboidalis. Alt. 13^{1/2}^{'''}; diam. 19^{1/2}^{'''}.

Patria mihi non innotuit. *California*

Specimen optime servatum in museo Regio Stuttgartiensi exhibetur.

17. *Trochus pulchellus* Ph.

Tr. testa conica, perforata, roseo-albida, flaminis atropurpureis picta; anfr. planis, infra marginatis, prominulis, lineis elevatis transversis sculptis; columella recta, basi truncata. Alt. 7^{'''}; diam. 7^{1/2}^{'''}.

Patria desideratur.

Speciem elegantem in Regio musaeo Stuttgartiensi invenies.

18. *Trochus Turris Ph.*

Tr. testa turrito-conica, acuta, cornea, rubro-flammulata; anfr. planis, superne striis transversis 5 — 6 subgranosis, inferne ad suturam tuberculis demum evanescenibus sculptis; ultimo ad peripheriam acute angulato, subnodoso; basi plano-concava, centri sovea umbilicum mentiente; columella contorta superne dentifera. Alt. 22"; diam. 20". Simillimus *Tr. acutangulo* Chemn. (*Tr. elato* Lam.), sed notis literis distantioribus expressis facile distinguendus.

Patriam ignoro.

19. *Trochus decoratus Ph.*

Tr. testa turrito-conica, imperforata, fusco-cinerea; anfractibus planiusculis, utrinque ad suturam cingulo elevato, subgranuloso, medio vero cingulis granulorum tribus instructis; granulis alternatis albis et nigris; basi convexiuscula, cingulis subgranosis circa 8 ornata; apertura tetragona; columella obliqua, basi subtruncata. Alt. 10"; lat. 7½".

Specimen ignotae patriae e collectione cl. Gruner vidi.

20. *Trochus ignobilis Ph.*

Tr. testa elevato-conica, albida, lineis radiantibus flexuosis rufis pietate; anfr. planiusculis, sulcis transversis quatuor exaratis; ultimo obtuse angulato; basi planiuscula, sulcis 6 — 7 exsculpta; centro excavato, umbilicum mentiente; columella superne soluta, nodulosa; apertura rhombea, lineis acutis, elevatis, transversis in faucibus instructa. Alt. 9"; diam. 8½".

Hanc speciem insulas Sandwich inhabitantem cl. Bronn deboeo.

21. *Trochus incarnatus Ph.*

Tr. testa elato-conica, pallide carnea, lineolis purpureis, ad apicem maculis purpureis picta; anfr. planis, transversim sulcatis, ad suturam nodulosis, inferne costatis: costis obliquis, subcrenatis, sulco profundo dimidiatis; lineis transversis omnibus nodulosis; basi plano-concava, cingulis concentricis circa 7 — 8, parum elevatis, subgranosis sculpta; cavitate contorta umbilicum inentiente; columella dentata; faucibus lineis transversis elevatis exaratis. Alt. $12\frac{1}{2}''$; diam. $12\frac{1}{2}$.

Patriam non novi; specimen Musaei Regii Stuttgartiensis examinavi.

22. *Trochus Saga Ph.*

Tr. testa conica, albida, rubro-radiata; anfr. planiusculis, penultimo basi prominente, lineis transversis elevatis, 8 — 9, granulatis, ultimo etiam costis frequentibus obsoletis sculpto; basi planiuscula, cingulis concentricis 6 — 7, parum prominentibus; cavitate contorta umbilicum simulante; columella integra. Alt. (obliqua) $8\frac{1}{2}''$; diam. $10''$.

E museo Regio Stuttgartiensi specimen absque indicatione patriae ad examinandum mihi benevole missum est.

23. *Trochus aspersus Koch in literis.*

Tr. testa ovato-conoidea, imperforata, carneo-albida, punctis rufis adspersa; cingulis transversis valde elevatis, granulatis, interstitia aequantibus; suturis profundis, subcanaliculatis; apertura semiorbiculari; columella plana, rectilinea, denticulo terminata; labro crasso, intus crenato-plicato. Alt. $5\frac{1}{2}''$; diam. $5\frac{3}{4}''$. Affinis *Turbini atrato* Gm. (*Monod. canaliculatae* Lamk.), sed colore et testa imperforata diversus.

Patria incerta; specimen majus communicavit cl. Koch, minus ipse possideo.

24. *Trochus guttatus* Koch in lit.

Tr. testa parva, depressa, sublenticulari, anguste umbilicata, nitidissima, licet lineis impressis transversis aliquot exarata, atra, guttis confertis albis picta et subtestellata; anfractu ultimo obtuse angulato; apertura rhombea; columella obliqua, tuberculo terminata. Alt. 2^{mm}; diam. 2²/₃^{mm}.

Patria E collectione cl. Koch.

25. *Trochus pictus* Ph.

Tr. testa parva, elevato-conica, anguste umbilicata, alba, lineis transversis rufis distantibus, maculisque subquadratis nigris per fascias longitudinales dispositis picta; anfr. parum convexis, lineis elevatis transversis sculptis, ultimo angulato; apertura quadrato-rotunda; columella obliqua, simplice. Alt. 2^{mm}; diam. 2¹/₃^{mm}.

Specimen in collectione mea servo, patriam ignoro.

26. *Trochus Pfeifferi* Ph.

Tr. testa conica, umbilica, castanea; anfr. planiusculis, plicis obliquis longitudinalibus, subobsoletis ornatis, ultimo acutangulo; basi plana, pallidiore, versus peripheriam concava, versus centrum convexa; linea elevata umbilicum cingente; apertura rhombea, margine columellari denticulo, et infra denticulum foveola terminato, superne vero in semiannulum, umbilicum cingentem producto. Alt. 10^{mm}; diam. 14^{mm}. Color omnino *Tr. rustici*, sed forma valde diversa.

In collectione cl. Pfeiffer adest; ubi habitat, non constat.

27. *Trochus indecorus* Ph.

Tr. testa depresso-conoidea, imperforata, laevi, griseofusca, zonis transversis, nigro-articulatis, obsoletis; anfr. parum convexis, ultimo subangulato; basi medio concava, callo albo umbilici locum occupante; apertura perobliqua,

subrhombica; columella arcuata, scindente. Alt. $8\frac{1}{2}''$; diam. $12''$.

Habitat . . . ; in collectione mea specimen inventur.

28. *Trochus zebrinus Ph.*

Tr. testa imperforata, conoidea, laevi, flava, strigis nigris, obliquis picta; anfr. planiusculis, ultimo obscure angulato; apertura rhombo-orbiculari; columellae regione planata, porcellanea, extus marginata; margine columellari fere rectilineo, medio tumido; labro intus laevissimo. Alt. $7''$; diam. $8''$.

Specimina duo servo, quorum patria mihi non innotuit.

29. *Trochus delicatulus Ph.*

Tr. testa depresso-conoidea, umbilicata, albida, fusco-articulata; anfr. planulatis, ad suturam angulatis, ideoque contabulatis, ultimo acutangulo, marginato; seriebus granularum moniliformibus, distantibus, 4 — 5, baseos consertis, septem; umbilico insundibuliformi, linea elevata cineto; apertura rhombica; columella superne soluta. Alt. $3''$; diam. $4\frac{1}{2}''$.

An Chemn. V. p. 108. tab. 171. fig. 1669?

Ex Oceano Pacifico accepit cl. Gruner, mihique visendum misit.

30. *Trochus concinnus Ph.*

Tr. testa conica, griseo-carnea, maculis purpureis fuscisve radiantibus picta; anfr. planiusculis, sulcis transversis, sulcisque obliquis nodoso-reticulatis, inferne oblique costatis, costis in spinas excurrentibus; basi convexa, striis granosis circa quatuordecim ornata; cavitate contorta umbilicum simulante; columella dentata; faucibus lineis elevatis transversis exaratis. Alt. $11''$; diam. cum spinis $15\frac{1}{2}''$.

Ubi habitat nescio; specimen pulcherrimum in Musaeo
Regio Stuttgartiensi inspicere potes.

Kritische Bemerkungen über die von Eschscholtz aufgestellten Arten von *Acmaea*.

Vom Dr. R. A. Philippi.

Als Herr Geh. Hofrath *Menke* im Jahr 1844 in dieser Zeitschrift den zoologischen Atlas von *Eschscholtz* anzeigen, und dem von diesem Natursucher aufgestellten Genus *Acmaea* die Priorität vor den Namen *Patelloidea* und *Lottia* vindicirte, bemerkte er sehr richtig, einige der von Eschscholtz aufgestellten Arten dürften unter andern Namen schon länger bekannt sein. Auch mir war schon seitdem ich das Werk von Eschscholtz angesehen, die ungemein grosse Ähnlichkeit mehrerer von ihm aufgestellter, von der Insel Sitcha stammender Arten mit chilenischen aufgefallen, und ich hätte dieselben unbedingt für identisch erklärt, wenn nicht alle bisherigen Erfahrungen dagegen gestritten hätten, dass dieselben Conchylienarten zugleich in Chili und in Neocalifornien oder gar noch nördlicher davon vorkommen.

Nachdem mir aber kürzlich durch die Güte des Herrn Dr. A. von Middendorff Gelegenheit wurde, die im Dorpater Museum aufbewahrten Eschscholtzschen Original-exemplare zu sehen, wurde meine Vermuthung zur Gewissheit. Es ist indess keinesweges der Fall, dass dieselben Arten auf der Insel Sitcha und in Chili vorkommen, sondern es ist bei einigen Arten das Vaterland falsch angegeben, was wohl darin seine Entschuldigung finden dürfte, dass Rathke, als er nach Eschscholtz's Tode die Bearbeitung der letzten Lieferung des zoologischen Atlas übernahm, die Gegenstände ohne Angabe des Fundortes vorfand.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Malakozoologie](#)

Jahr/Year: 1846

Band/Volume: [3_1846](#)

Autor(en)/Author(s): Philippi Rudolf Amandus

Artikel/Article: [Diagnoses Testaceorum quorundam novorum
97-106](#)