

Diagnosen neuer Heliceen.

Helix pallidula Pfr.

T. umbilicata, depressa, tenuis, pellucida, confertim striata, pallide cornea; anfr. $5\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus latior, depressus; apertura obliqua, late lunaris; perist. rectum, intus sublabiatum, margine columellari brevi, ad umbilicum angustum, in fundo coarctatum dilatato-reflexo. — Diam. 10, alt. 5 mill. — Patria?

Sehr ähnlich der *H. glabella* und einigen Formen der *H. rufescens*, soll aber von Chile stammen, und unterscheidet sich auch von beiden durch den engern Nabel, durch die Skulptur und von *glabella* durch die breit-mondförmige Mündung.

Helix pentodon Menke.

T. umbilicata, conoidea, solida, irregulariter striata, nitidula, albo corneoque variegata; spira conoidea, obtusa; anfr. 6 plani, ultimus acute carinatus, basi convexiusculus, circa umbilicum mediocrem, cylindricum angulatus; columella verticalis; apertura tetragona, dentibus 5 profundis, breviter lamelliformibus coarctata: dentibus 2 in ventre anfractus penultimi, 2 in margine basali, 1 in columellari; perist. simplex, acutum. — Diam. 9, alt. 7 mill.

Habitat . . . ?

Bulimus callosus Pfr.

T. perforata, ovato-conica, solidula, opaca, sordide albida, strigis irregularibus, pellucidis ornata; spira conica acutiuscula; anfr. 7 planiusculi, ultimus spiram paulo superans; columella breviter recedens; apertura acuminato-ovalis; perist. acutum, intus callo crasso, marginem non attingente, labiatum, margine columellari fornicatim reflexo. — Long. 21, diam. 11 mill.

Habitat . . . ? (Coll. v. d. Busch.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Malakozoologie](#)

Jahr/Year: 1846

Band/Volume: [3_1846](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Diagnosen einiger neuer Heliceen 128](#)