

quinis, ultimo spira duplo longiore; apertura oblongo-ovata; labro tenui; columella non plicata.

Testa parva, modo 4^{'''} longa et 2^{'''} lata. Quamvis striae vel lirae transversae et plicae columellares desint, tamen hanc speciem ad Tornatellas refero ob habitum suum generalem.

Diagnoses Buccinorum quorundam novorum.

Auctore Guil. Dunker.

1. *Buccinum albescens*, Dkr.

B. testa parva ovato-acuta, solidula, albescente, anfractibus quinis longitudinaliter denseque plicatis, transversim striatis, granuliferis, ultimo spira longiore; apertura subovata; columella plicis 2—3 parvulis signata, supera parte dente parvulo munita; labro intus striato. — Alt. 4—5^{'''}. Alt. : lat. = 100 : 60.

Patria Indiae occidentales.

2. *Buccinum splendidulum*, Dkr.

B. testa parva ovato-acuta, albida, subdiaphana, splendidula, plicis confertis longitudinalibus striisque transversis decussata, granulosa; anfractibus quinis sutura profunda sejunctis, ultimo spiram paullo superante; apertura ovata; labro incrassato intus multistriato; columella fere biplicata, supera parte dente distincto munita. — Alt. 5^{'''}. Alt. : lat. = 100 : 60.

Patria ignota.

Species Buccino marginulato Lam. simillima, sed unicolor et triplo vel quadruplo minor.

3. *Buccinum semigranosum*, Dkr.

B. testa parva, ovato-conica, nitida, alba, unicolore vel luteo variegata; anfractibus senis tenuissime transver-

simque striatis, prope suturas longitudinaliter plicatis, plicis bi-vel tri-tuberculatis; apertura ovata; labro dextro et columella subcallosa laevigatis. — Alt. 5^{'''}. Alt. : latit. = 100 : 50.

Patria ignota.

Haec species nondum descripta Buccinum monile Kieneri in mentem vocat, quod vero facile distinguitur forma multo majore, labro dextro intus striato aliisque characteribus.

4. *Buccinum Jonasii*, Dkr.

B. testa parva, ovata, albida, solidula, longitudinaliter plicata transversimque striata; anfractibus quinis, ultimo ceteris multo longiore, linea prope suturam subfusca seu livida signato; labro dextro crasso, intus non striato, sinistro calloso laevigato. Alt. 5^{'''}. Alt. : latit. = 100 : 62.

Patria ignota.

Differt a Buccino pauperato Lam. testa multo minore, anfractuum numero, labro dexto valde calloso, intus non striato et aliis notis.

5. *Buccinum scabrum*, Dkr.

B. testa ovato-globosa, acuta, crassa, albida luteoque variegata, transversim sulcata longitudinaliter plicata, plicis noduliferis asperis submuricatis, anfractibus senis, ultimo ceteris longiore; apertura subrotunda, labro dextro incrassato intus sulcato, labro sinistro calloso et granulato; columella arcuata uniplicata, supera parte unidentata. — Alt. 6^{'''}. Alt. : latit. = 100 : 70.

Patria ignota.

Species tum Buccino muricato Quoy et Gaim., tum B. tritoniformi Kien. affinis.

6. *Buccinum Gruneri*, Dkr.

B. testa crassa, ovato-acuta, albida, livido seu spadiceo trifasciata, plicis longitudinalibus nodiferis sulcisque

transversis decussata, aspera; anfractibus senis planiusculis margine superiore angulatis; labro dextro crasso intus sulcato; labro sinistro plicoso-granulato; columella uniplicata, supra parte dente crasso munita; apertura ovata. — Alt. $6\frac{1}{2}$ ''' . Alt. : lat. = 100 : 64.

Patria Insulae Philippinarum.

Buccino scabro et *B. marginulato* Lam. affine.

7. *Buccinum pictum*, Dkr.

B. testa ovato-conica, acuta, laevissima, nitidissima, luteo, albo et fusco variegata, fasciis duabus castaneo et albo maculatis lineisque 8 — 9 fuscis transversis elegantissime picta; anfractibus convexiusculis 7, supremis subtilissime plicatis; spira exserta; labro dextro intus tenerrime sulcato; columella arcuata, supra dente distincto munita infra fere uniplicata; apertura subrotunda; suprema faucis albae parte fascia nigro-castanea signata. — Alt. 8''' . Alt. : latit. = 100 : 54.

Patria Indiae orientales?

Buccino suturali Lam. affine, sed minus et nodulis prope suturam deficientibus aliisque characteribus satis diversum.

Diagnosen einiger neuen Binnen-Mollusken.

Von E. A. Rossmässler.

Helix arietina Rossm. Testa perforata, supra convexiuscula, subtus turgida, compresso-carinata, albida, ochraceo variegata vel fasciata, lineis spiralibus et striis transversalibus decussata; anfractibus plusminusve exsertis; apertura angulata, lunato-securiformi, peristomate recto, labiato. Alt. 5 — 6''' ; lat. 8 — 9''' ; anfr. 5.

Auf der Sierra de S. Cristoval zwischen Puerto de Sta. Maria und Jerez auf Quadersandsteinterrain gesam-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Malakozologie](#)

Jahr/Year: 1846

Band/Volume: [3_1846](#)

Autor(en)/Author(s): Dunker Wilhelm (Guilielmus) Bernhard

Artikel/Article: [Diagnoses Buccinorum quorundam novorum 170-172](#)