

transversis decussata, aspera; anfractibus senis planiusculis margine superiore angulatis; labro dextro crasso intus sulcato; labro sinistro plicoso-granulato; columella uniplicata, supra parte dente crasso munita; apertura ovata. — Alt. $6\frac{1}{2}$ ''' . Alt. : lat. = 100 : 64.

Patria Insulae Philippinarum.

Buccino scabro et *B. marginulato* Lam. affine.

7. *Buccinum pictum*, Dkr.

B. testa ovato-conica, acuta, laevis, nitidissima, luteo, albo et fusco variegata, fasciis duabus castaneo et albo maculatis lineisque 8 — 9 fuscis transversis elegantissime picta; anfractibus convexiusculis 7, supremis subtilissime plicatis; spira exserta; labro dextro intus tenerrime sulcato; columella arcuata, supra dente distincto munita infra fere uniplicata; apertura subrotunda; suprema faucis albae parte fascia nigro-castanea signata. — Alt. 8''' . Alt. : latit. = 100 : 54.

Patria Indiae orientales?

Buccino suturali Lam. affine, sed minus et nodulis prope suturam deficientibus aliisque characteribus satis diversum.

Diagnosen einiger neuen Binnen-Mollusken.

Von E. A. Rossmässler.

Helix arietina Rossm. Testa perforata, supra convexiuscula, subtus turgida, compresso-carinata, albida, ochraceo variegata vel fasciata, lineis spiralibus et striis transversalibus decussata; anfractibus plusminusve exsertis; apertura angulata, lunato-securiformi, peristomate recto, labiato. Alt. 5 — 6''' ; lat. 8 — 9''' ; anfr. 5.

Auf der Sierra de S. Cristoval zwischen Puerto de Sta. Maria und Jerez auf Quadersandsteinterrain gesam-

melt von Dr. Willkomm. Verhält sich zu *H. pisana*, deren Verwandte sie ist, wie *H. cariosa* zu *candidissima*.

Helix Dehnei Rossm. Testa imperforata, subdepresso-globosa, subtus turgida, albida, subtilissime decussata, diversimode fusco-fasciata; sutura cum margine exterioro demum deflexa; apertura parvula, oblique lato-lunata, depressa; peristomate recto, rufo-labiato; fauce rufa; margine columellari subhorizontali. Alt. 6''' ; latit. 8''' ; anfr. 5.

Von Herrn Dr. Dehne, einem der unermüdlichsten Naturforscher Sachsens, unter Gummi arabicum gefunden, also in Afrika einheimisch.

Durch den gänzlichen Mangel des Nabels, die gedrückte Mündung und den auffallend horizontalen Spindelrand von der verwandten *Hel. pisana* hinlänglich unterschieden.

Planorbis legatorum Rossm. Testa supra alte umbilicata, subtus subplana, albida, microscopice cinereo-adspersa subtilissime obsolete lineata; anfractu ultimo celerrime incremente; apertura rotunda, magna, perpendiculari. Alt. $3\frac{1}{8}$ ''' ; l. 7''' ; anfr. $4\frac{1}{2}$.

Auf der Alhambra bei Granada in Spanien, im Bassin des Saales der Ambassadeurs gesammelt von Dr. Willkomm.

Gehört in die Gruppe von *Pl. corneus* und ist von allen Arten leicht dadurch zu unterscheiden, dass der letzte Umfang an seinem Ende (die Mündung) über noch einmal so hoch ist als am Anfange.

Literatur.

1. Die neue Ausgabe des Martini-Chemnitz'schen Conchylien-Cabinets.

Vom Dr. L. Pfeiffer.

Dieses von dem thätigen Inhaber der alten berühmten Raspeschen Buchhandlung in Nürnberg, Herrn

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Malakozologie](#)

Jahr/Year: 1846

Band/Volume: [3_1846](#)

Autor(en)/Author(s): Rossmässler Emil Adolf

Artikel/Article: [diagnosen einiger neuen Binnen-Mollusken 172-173](#)